



5

TRATTATO  
DELL' ALGEBRA  
PROPORTIONALE.

Doue si mostrano le inuentioni de i primi Capitoli, ò Equationi d'essa.

Di Pietro Antonio Cataldi Bolognese.

ALL' ECC. CAVSIDICO  
IL SIGNORE DOMENICO  
ALBANI BOLOGNESE.




IN BOLOGNA,

Appresso gli Heredi di Giouanni Rossi MDCX.

Con licenza de' Superiori.

**Imprimatur F. Albertus Dielaitus, Ordinis Carmelitarum Bono-**  
**nienſis, pro Reuerendiſſimo Patre Inquiſitore.**  
**D. Marcellus Baldaſſinus Clericus Regularis S. Pauli, & Sacrae**  
**Penitentiariae Bononiensis Rector, pro Illuſtriſſi Archiep.**



ALL' ECC. CAUSIDICO  
SIGNOR MIO OSSERVANDISSIMO  
IL SIGNOR DOMENICO  
ALBANI.

1691. 1692. 1693.  
1694. 1695. 1696.



**I** molti fauori ch'io riceuo dall' officiosissima persona di V. S. oltre gl' altri buoni effetti, che partoriscono, mi liberano da molta perdita di tempo, che mi conuerria consumare in sbrigarmi da fastidiosi negotij, & mi concedono agio di spenderlo in migliore vso, come al presente nella compositione di questa Operetta, la quale per ciò, di ragione dipende da Lei, & è debita à Lei, se bene per altra causa più vnuerale è pure similmente da far si conoscere per sua, che essendo io suo deditissimo Seruitore suo anco è quello, che da me può derivare; Vn sol pensiero m'ha fatto stare alquanto sospeso à presentargliela, & è il vedere la debolezza della picciola Opera, ma ne sono stato inanimato dal considerare, che la magnanima bontà di V. S. è tale, che aggradiſce ancora le cose minime, che vengono da sincero cuore, come è questa che dall' animo mio deriva, onde per ciò sicuramente le viene à fare riuerenzia per me, supplicandola della continua sua benigna protezione, acciò insieme con me i posteri ancora le habbino obligo particolare, se per tal causa potrò impiegare il tempo in operar cose d' ornamento, ò profitto in alcuna ſeſenza; Et per fine baciandole humilmente le mani le deſidero da N. S. l' d'io continuiſſi augumenti di felicità.

Di V. S. Ecc.

Deuotifs. & obligatifs. ſeruiditore

Pietro Antonio Cataldi

# TAVOLA

## Delle cose occorrenti nel presente Trattato.

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>D</b> ELLA derivatione, ò nascimento dell' Algebra.                                                                                                                                                                                                                     | à facc. 1 |
| Delli Caratteri delle dignità Algebratice.                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |
| Diffinitione della proportione.                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |
| Diffinitione delle quantità proporzionali.                                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| Diffinitione delle quantità continue proporzionali.                                                                                                                                                                                                                        | 3         |
| Considerationi prime circa alle proprietà delle quantità continue proporzionali, & altre.                                                                                                                                                                                  | 3         |
| Regola all' Equatione di 2. & 1. eguali à numero.                                                                                                                                                                                                                          | 5         |
| Modo di trouare tre numeri quadrati, la somma de' quali sia numero quadrato.                                                                                                                                                                                               | 5         |
| Modo di trouare quanti numeri quadrati si vogliano, le somme de' quali siano numeri quadrati.                                                                                                                                                                              | 6         |
| Regola all' Equatione di 2. eguale à 1. & numero.                                                                                                                                                                                                                          | 10        |
| Regola all' Equatione di 2. & numero eguale à 1.                                                                                                                                                                                                                           | 13        |
| Altre considerationi circa alle inuentioni delle quantità continue proporzionali, & altre.                                                                                                                                                                                 | 16        |
| Regola all' Equatione di 2. & 2. eguali à numero.                                                                                                                                                                                                                          | 18        |
| Regola all' Equatione di 2. eguale à 2. & numero.                                                                                                                                                                                                                          | 20        |
| Regola all' Equatione di 2. & numero eguale à 2. in diuersi modi.                                                                                                                                                                                                          | 22        |
| Notifi, che à facciate 31. le tre Propositioni, che seguono fino à facciate 34. à righe 12. sono vna Parentelis. & doueriano esser fatto in lettera diuersa, come molte altre Parentelis anteceden-<br>ti, & seguenti fino à facciate 41.                                  | 22        |
| Operationi doue si pongono in usol' Equationi simplici dell' Algebra.                                                                                                                                                                                                      | 42        |
| Altre Operationi doue si praticano le Equationi composte dell' Algebra.                                                                                                                                                                                                    | 50        |
| Alcuni quesiti piaceuoli per recreatione, & diletto de gl'amoreuoli, & benigni Lettori.                                                                                                                                                                                    | 71        |
| ¶ Alla facciata 1. riga prima, dopo la parola cosa aggiungasi (Et è sci-<br>za di numeri, quale insegna dal falso estrarre il vero, & median-<br>te l' incognito render noto quello, che si domanda, Et per ciò il<br>fine d' essa è la cognitione della quantità ignota.) |           |

# DELLA DERIVATIONE, O' NASCIMENTO DELL' ALGEBRA.



**L**'ALGEBRA, che in nostra lingua si chiamerà Regola della Cosa, può hauere il suo nascimento dal naturale discorso, come io mostro in altra mia Opera (al modo, che dal medesimo natural discorso hò derivato l'Arithmetica) che chiamo Vniuersale, per essere ella necessaria à tutte le Scienze, Arts, & negotij, diuisa in quattro Parti, delle quali sono stampate la Prima, & Seconda, che l'altre due con molte Opere di numeri, & linee, & altre già composte, si stamparà no quando vi sia la commodità, & che occorra occasione à proposito. Et anco può hauere il fondamento dalle Dimostrazioni Geometriche; Et di più può deriuare dalle considerationi della Quantità in genere, mediante le proprietà delle quantità proportionali; Da questa consideratione hora della quantità in genere, & conuenienze, che fra loro auuengono nelle Quantità proportionali si fa nel presente Trattato deriuare essa Algebra, o Regola della Cosa, che perciò le dà nome di Algebra proportionale; Onde gli Studenti, che sapendo adoprare le quantità irrationali, & le Algebraiche, Sommando, Sottrando, Moltiplicando, & Partendo, poneranno diligente attentione nel leggerla, potranno ottimamente conoscere l'origine in questa maniera dell' Capitoli, & vogliamo dire Regole dell'Equationi principali dell' Algebra, & perciò imprimersele nella mente à bastanza, acquistando attitudine alle Speculationi, & Inventioni Mathematiche, & facendosi esperti nella cognitione di molt'altre cose, che discorrendo si vengono à mostrare con molta soddisfazione dell'intelletto il proprio cibo del quale è apunto la speculatione, & intelligenza della causa delle cose; oltre di ciò il beneficio, & vogliamo dire l'utilità, che risulta da questa Scienza Algebraica è mirabile, perche (oltre il risolverse con essa facilissimamente le domande, che nell'Arithmetica occorrono nelle Regole chiamate Di falsa positione semplice. Et falsa positione doppia, & molti altri Quesiti Arithmetici, & Geometrici) da essa come da miniera, & da fonte deriuano le inventioni di molte cose nella quantità, che senza essa ne anco i molto esperti Arithmetici, & Geometri ritrouariano; Et di più da esse Inventioni Algebraiche se ne possono estrarre le facili Regole numerali, & le lineali, & vogliamo dire Arithmetiche, & Geometriche da risolvere le istesse domande, che dall' Algebra si faranno risolte; Et in somma questa marauigliosa Scienza può seruire à tutte le Scienze, & Arts, & massime nelle loro speculationi difficili, & recondite, come si può vedere nelle mie Algebra applicata, Diffesa d' Archimede, & altre Opere; Perilche molta acutezza acquistano gl'intelletti, che in questa Dottrina si esercitano, & si fanno atti alla intelligenza vniuersale d'ogni sorte di Scienza, per potersi esercitare di continuo, & operare ad laudem Dei æterni omnipotentis, cui sit semper omnis honor, & gloria.

## *Delli Caratteri delle Dignità Algebraiche.*



**E** Dignità Algebraiche (che per ordine sono, Cosa, Censo, Cubo, Censo di censo, Primo relato, Censo cubo, Secondo relato, Censo di censo di censo, Cubo di cubo, Censo primo relato; Terzo relato, Censo censo cubo, Et così seguendo come conuiene alle compositioni loro, che sempre sono Censi, Cubi, & Relati, replicati quante volte bisogna) si fogliono nelle diuerse Prouincie, diuersamente seruere, & rappresentare da gli Scrittori loro, che in vn modo in Spagna, & gli Spagnuoli, in altro i Francesi, in altri gl'Italiani, in altro gli Alemanni, &c. gli seruono; & talmente diuersi fra loro, che è fatica à fare bastevole pratica in essi per conoscerli distintamente in ciascuno Autore, & Scrittore, oltre che conuiene à gli Stampatori nelle diuerse Prouincie, formare essi diuersi Characteri; che solo poi alle Opere d'Algebra (quali dirarò stampano) gli seruono; Onde io considerando à tronare qualche facilità in ciò, mi venne pensato molti anni sono, mentre scruiuo l'Opera d'Algebra, che molto commodamente possono seruire li numeri tagliati, cioè 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. &c. che si adoprano comunemente in tutte le Prouincie nel Partire à Galea, & si trouano in tutte le Stamparie, doue si fogliono stampare Opere d'Arithmetica, o doue occorrono numeri; per ilche fermatomi in questo, & esclusi di adoprare sempre tali numeri tagliati nell'Opera

nell'Opera

|      |    |                                       |
|------|----|---------------------------------------|
| 3    | 1  | Cosa                                  |
| 4    | 2  | Censo                                 |
| 8    | 3  | Cubo                                  |
| 16   | 4  | Censo di censo, ouero quadro quadrato |
| 32   | 5  | Primo relato                          |
| 64   | 6  | Censo cubo                            |
| 128  | 7  | Secondo relato                        |
| 256  | 8  | Censo censo censo                     |
| 512  | 9  | Cubo cubo                             |
| 1024 | 10 | Censo primo relato                    |
| 2048 | 11 | Terzo relato                          |
| 4096 | 12 | Censo censo cubo                      |

modifissimo il Moltiplicare & il Partire d'esse Dignità; Che quanto al Moltiplicare vna Dignità per vn'altra, il denominatore, ò segno Algebratico del prodotto viene sempre ad essere il numero tagliato, che è somma delli due numeri, tagliati rappresentanti le Dignità Algebratiche delle due quantità, che si moltiplicano insieme; Et facilissima cosa è sommare essi numeri tagliati insieme (ò Sottrarre il minore dal maggiore, quando accaderà) Onde à Moltiplicare 4 via 2, cioè Cose via Censi, perche 1. & 2. fa 3, il prodotto sarà 3, cioè Cubi; Et così 2 via 2, il prodotto sarà 4, cioè Censi di Censi; Et 3 via 2, cioè Cubi via Censi, perche 3. & 2. fa 5, il prodotto sarà 5, cioè Secondo relato; Et però 3 via 3, fa 6, Et così de gl'altri; Quale poi al Partire, Cauando il numero rappresentante la Dignità del Partitore dal numero rappresentante la Dignità della quantità partita, ò da partire, il restante sarà il numero rappresentante la Dignità dell'aumento; Che con 2, partendo poniamo 4, perche à cauare 2 da 4 resta 2, l'aumento sarà 2; Onde con 6, partendo 2048, l'aumento è 3, & con 12 partendo 512, l'aumento è 1, & con 12, Cubi partendo 15, Censi, censo, censo, l'aumento è 1, & con 32, partendo 128, l'aumento è 1, & è numero, censo libero da denominazione Algebrica, perche à cauare 6, rappresentante la dignità del partitore da 6 rappresentante la dignità della quantità, che si parte, resta niente; Et con 12 partendo 383, perche 4, rappresentante la dignità del partitore non si può cauare da 3 rappresentante la dignità della quantità, che si parte, l'aumento si scriuerà in forma di rotto, così  $\frac{783}{12}$ . Si potrà bene scilfare, ò abbreviare, partendo così il numeratore, come il denominatore, per 4, che entra nell'uno, & nell'altro, & si ridurrà à  $\frac{17}{3}$ . Et anco se non ci curiamo di cottielli numeri, potremo ridurre il numero del denominatore, ò partitore ad 1, partendo ciascun d'essi per 3; & habbiamo  $\frac{2}{1}$ . Che significa 2, efimo d'1. O vogliamo dire 2, ò da partire per 1; Et nel medesimo modo si potrà operare di continuo.

### Diffinitione prima.

**A** proporzione è la doue hienza, che hanno fra loro due quantità d'vna medesima natura, paragonata cioè la prima, che si chiama antecedente alla seconda, che si chiama conseguente; Et il denominatore d'essa proporzione, che ha l'antecedente al conseguente è il numero delle volte, che il conseguente è contenuto nell'antecedente, perche esso denominatore è l'aumento, che si troua partendo l'antecedente per il conseguente; Per esempio siano A 10, & D 4, due quantità d'vn medesimo genere, cioè di numeri, ò due linee, ò due superficie, ò due angoli, ò due corpi, ò due tempi, &c. & sia che si paragoni A 10, che si chiama Antecedente, à D 4, che si chiamerà Conseguente; In questo paragono la conuenienza, che ha A à D, si chiama la proporzione di A à D, & perche A, contiene D, volte 2½, (che 4 D, entrano in 10 A, volte 2½) si dirà, che la proporzione di A à D, è di 2½, (che si chiamerà dopla sesquialtera) & quello 2½, è il denominatore di detta proporzione, che ha A 10, à D 4. Ma se paragonassimo D 4, ad A 10, che così D 4, sarà antecedente, & A 10, conseguente, allhora perche esso D 4, antecedente contiene A 10, conseguente volte 2½, (che A 10, conseguente entra in D 4, antecedente volte 2½, ò vogliamo dire, che 4 partite D 4, antecedente per A 10, conseguente ne viene 2½) si dirà, che la proporzione di D ad A, è di 2½, (quale si chiamerà subdopla sesquialtera) da 1 La-

da i Latini, intorno a i quali nomi non mi dilatarò per breuità, essendo che a noi non importa tener conto d'essi, ma solo del numero astratto, che chiamiamo denominatore della proporzione) & questo  $\frac{3}{7}$  è il denominatore d'essa proporzione, che hà D 4. ad A 10.

### Diffinitione seconda.

**L**E quantità, che paragonate insieme a due, a due, cioè l'Antecedente al suo Conseguente hanno vna istessa proporzione, cioè, che i denominatori d'esse loro proporzioni sono vn istesso numero, ò quantità si chiamano proporzionali. Per esemplo, Delle 12. quantà A 14. B 45. C 15. D 51. E 21. F 73. G 3245. H 3255. I 182. K 62. L 24. m 3250. M 8. n 3210; paragonando A a B, C a D, E ad F, G ad H, I a K, & L ad M, perche il denominatore di ciascuna di queste proporzioni è 3, esse 12. quantà si dicono essere proporzionali, cioè, che dalla prima alla seconda è come dalla terza alla quarta, & dalla quinta alla sesta, & dalla settima alla ottaua, & dalla nona alla decima, & dalla vndecima alla duodecima.

### Diffinitione terza.

**L**E quantà si dicono essere continue proporzionali (cioè continuate in vn'istessa proporzione) quando essendo la prima semplice antecedente, & l'ultima semplice conseguente, ciascuna dell'altre intermedie, vna, ò più che vi si trouano; sarà, & conseguente rispetto alla sua prossima anteriore; & antecedente rispetto alla sua prossima seguente, ò posteriore; Per esemplo, Hauendo A 9. B 6. C 4. & intendendosi in esse paragonato A. a B. & B. istesso a C. & essendo la proporzione di A 9. a B 6. che hà per denominatore 12. eguale alla proporzione, ò vogliamo dire, essendo la istessa proporzione, che hà B. medesimo 6. a C 4. il denominatore della quale è l'istesso 12. detto perciò da questa continuata proporzione di esso 12. in dette quantà doue la media è conseguente alla prima estrema, & antecedente alla terza estrema, esse 3. quantà si chiamano continue proporzionali, & così in 9. sole quantà si considera contenersi due proporzioni. Similmente le seguenti 8. quantà A 4374. B 1458. C 486. D 162. E 54. F 18. G 6. H 2, si chiamano continue proporzionali, quando intendendosi in esse contenersi 7. proporzioni, cioè, che ciascuna delle 6. intermedie sia conseguente alla a lei prossima superiore; & antecedente alla a lei prossima seguente, ò inferiore, queste 7. proporzioni siano eguali fra loro, cioè habbino vn'istesso denominatore, che hora è 3; & però si dirà, che essendo da A. a B. come da B. a C. & come da C. a D. & come da D. ad F. & da E. ad F. & da F. a G. & da G. ad H. queste 8. quantà sono continue proporzionali & le 6. di mezzo, ò intermedie fra la prima, & ottaua estreme (semplice antecedente la prima, & semplice conseguente l'ultima) si dicono essere 6. medie continue proporzionali fra A. prima, & H. ottaua; Et quando le quantà proporzionali, che si considerano sono solamente 3. come A 4374. B 1458. C 486. Oport A 7. B 35. C 175, ò simili, allhora la B. media si chiama media proporzionale fra le due estreme A. & C.

## CONSIDERATIONI PRIME.

### Propositione prima.



**V**A 9. & tre quantà sono continue proporzionali, il duto della prima nella terza è sempre eguale al duto della seconda in se medesima, cioè al quadrato della media.

Siano A 9. B 6. C 4. tre quantà continue proporzionali, cioè tali che da A 9. a B 6. sia come da B 6. a C 4. che così tante volte contenga A 9. la B 6. che è volte 12. D. quante volte la B 6. contenga la C 4. che è medesimamente volte 12. D. Si dice, che il duto delle due estreme A 9. & C 4. (qual duto è 36) è eguale al duto della media B 6. in se stessa, cioè al quadrato della seconda B 6. (qual quadrato è medesimamente 36) Perché essendo che A 9. prima contiene B 6. seconda volte 12. B. ancora la B 6. seconda contenga C 4. terza le istesse volte 12. D. Onde la A 9. prima verrà a contenere la C 4. per volte 12. via volte 12. cioè per D. via D. che è volte 144. E, perche la moltiplicare A 9. via C 4. il prodotto sarà quanto a moltiplicare; 4. via vna quantà, che contenga

4

A B C

2-6-4

 $1\frac{1}{2}$   $1\frac{1}{2}$ 

D

E

4. via 9.

4. via 4. &amp; via E 2.

Cioè

4. via 4. via 1 $\frac{1}{2}$ . via 1 $\frac{1}{2}$ .


6. via 6.

4. via 1 $\frac{1}{2}$ . via 4. via 1 $\frac{1}{2}$ .

Cioè

4. via 4. via 1 $\frac{1}{2}$ . via 1 $\frac{1}{2}$ .

duto essere ancora eguale il duto della prima A 9, nella terza C 4, perche questo duto della prima A 9, nella terza C 4, si conosce essere eguale al quadrato della media B 6, come si voleva mostrare.



Quarto della media (poiche tanto è il duto di n o, in n a, quanto di n o, in a i, & in i n, che sono i, la istessa n o, & i n, la differenza di n o, ad a n.) Onde connessamente, quando si dirà il duto di n o, in n i, giunto al quadrato dell'istessa n o, fa quanto il quadrato di n s, si conoscerà che essa n s, è media proportionale fra n o, minore, & la somma di n o, & n i, cioè che tutta la i o, sarà la maggiore, n s, la media, & n o, la minore di tre rette continue proportionali.

Et dicendosi di tre rette continue proportionali, la media n s, è 6, & la differenza di n o, minore ad n a, maggiore, cioè n i, è 5, si domanda la minore n o. Se ponessimo ella essere 1, perche poi n o, fino al centro c, deve essere la metà di 5, differenza di n o, minore ad n a, maggiore, sapremo tutta c o, ouero c a, & però c s, semidiametri essere 1, & p 1 $\frac{1}{2}$ . Et perche il quadrato solo di c s, che è 1 x p 1 $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , è sempre eguale, nel triangolo rettangolo c n s, alla somma de' due quadrati di c n, che è 6 $\frac{1}{2}$ , & di n s, che è 36, & fanno 42 $\frac{1}{2}$ . (Sapremo che 1 x p 1 $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , è eguale a 42 $\frac{1}{2}$ . Onde alla Bz, di 42 $\frac{1}{2}$ , che è 6 $\frac{1}{2}$ , sarà eguale la Bz, di 1 x p 1 $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , qual Bz, si appiaccia essere 1 x p 1 $\frac{1}{2}$ . Et così vediamo, che tanto è 1 x p 1 $\frac{1}{2}$ , quanto 6 $\frac{1}{2}$ . Onde leuato 1 $\frac{1}{2}$ , da ciascuna parte, videremo, che solo 1, è eguale a solo 4, cioè che la 1, vale 4. Et questo 4, valore della 1, è la n o, minore posta 1, essendo la maggiore 5, di più, cioè 6.

Ouero quando habbiamo 1 x p 1 $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , eguale a 42 $\frac{1}{2}$ , leuando noi da ciascuna parte il 6 $\frac{1}{2}$ , (che è sempre il quadrato di 1 $\frac{1}{2}$ , metà di 3, numero delle 1, qual numero delle 1, è sempre il 5, differenza di n o, minore ad n a, maggiore) haueremo 1 x p 1, eguale a 36, (che il 36, è sempre il quadrato di 6, n s, media) & perche a giungere il quadrato di n o, metà del 5, n i, cioè metà di 5, numero delle 1, con 36, quadrato di n s, & fa 42 $\frac{1}{2}$ , questa somma deve essere eguale al quadrato di c s, semidiametro, & però di c o, sapremo, che c o, è la Bz, di 42 $\frac{1}{2}$ , cioè 6 $\frac{1}{2}$ , ma perche la parte c o, di c o, non essere 1 $\frac{1}{2}$ , si farà nota la restante n o, cioè la 1, essere, & vale 1. Perche dunque, quando posta n o, 1, (che il suo quadrato è sempre 1, & 1, & giuntoli c, metà del 5, & il composto 1 x p 1 $\frac{1}{2}$ , moltiplicato in se stesso, produce sempre 1, & 5, & 6 $\frac{1}{2}$ , del qual prodotto il numero de' 2, è sempre 1, quadrato di 1, (numero delle 1, della posizione) & il numero delle 1, è sempre il duto di 1, & 1, via 1 $\frac{1}{2}$ , cioè di 1, via 1 $\frac{1}{2}$ , cioè è il doppio di 1 $\frac{1}{2}$ , & per ciò è il 5, istesso n i, detto; Et il 6 $\frac{1}{2}$ , è sempre il quadrato del 2 $\frac{1}{2}$ , metà d'ello 5, che cauato dalla somma de' quadrati di c n, & n s, resta, sempre il solo quadrato di n o, cioè 36, da una banda, & dall'altra resta solo l'1 x p 1, v. vediamo, che quando sia tanto 1 x p 1, quanto 36, cioè quando si habbi 1 x p 1, eguale a 36, se noi al 36, giungeremo il quadrato di 1 $\frac{1}{2}$ , metà del 5, numero delle 1,

effo 4. volte 2 $\frac{1}{2}$ , cioè quanto a moltiplicare 4, via 2 $\frac{1}{2}$ , volte 2 $\frac{1}{2}$ , & se follo uendo il 2 $\frac{1}{2}$ , nelli suoi due produttori 1 $\frac{1}{2}$ , via 1 $\frac{1}{2}$ , farà quanto a moltiplicare 4, via 4, via 1 $\frac{1}{2}$ , via 1 $\frac{1}{2}$ . Cioè tanto è il duto di A 9, prima in C 4, terza, quanto il duto di quelle quattro quantità 4, 4, 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{1}{2}$ , fra loro. Ancora, Perche B 6, media, è seconda delle tre quantità continue proportionali, contiene la C 4, terza le volte 1 $\frac{1}{2}$ . D, & interessa vn'altra B 6, ella conterrà la istessa C 4, le istesse volte 1 $\frac{1}{2}$ . D. Onde la B 6, si produrrà dalla C 4, moltiplicata via la D 1 $\frac{1}{2}$ . Et l'altra B 6, si produrrà medesimamente da C 4, moltiplicata via D 1 $\frac{1}{2}$ , perche che il duto dell'vna B 6, via l'altra B 6, cioè il quadrato della B 6, media verrà a prodursi da queste quattro quantità 4, 1 $\frac{1}{2}$ , 4, 1 $\frac{1}{2}$ , moltiplicate fra loro, cioè il quadrato della media, & seconda quantità C 6, è eguale al duto fra loro di quelle quattro quantità 4, via 4, via 1 $\frac{1}{2}$ , via 1 $\frac{1}{2}$ . Ma al medesimo duto d'esse quattro quantità fra loro, si è veduto essere ancora eguale il duto della prima A 9, nella terza C 4, perche questo duto della

Questo inteso, perche quando tre quantità di numeri, & linee, poniamo le tre linee rette a n o, n s, n o, 4, siano continue proportionali (come si vede nella costruzione che nel mezzo cerchio a s o, la n s, perpendicolarmente al diametro a o, è media proportionale fra le due parti a n, n o, d'esso diametro) allhora il duto della prima nella terza è eguale al quadrato della media, ne segue, che anco il duto della minore, che è vna delle due estreme, in se stessa giunto al duto della medesima minore nella differenza, che è da essa all'altra estrema maggiore, sia eguale al qua-

delle  $x$ , che fà  $4\frac{1}{2}$ , & di questo pigliaremo la  $3x$ , che è  $6\frac{1}{2}$ , & da essa ne ceneremo il  $2\frac{1}{2}$ , mità di  $5$ , numero delle  $x$ , il restante  $4$  sarà il valore della  $x$ , poiche così virtualmente si viene a giungere il  $6\frac{1}{2}$ , a ciascuna parte, & si forma  $1x + 5x + 6\frac{1}{2}$ . Et  $4\frac{1}{2}$ , che pure sono eguali, & perciò la  $3x$ , d'  $1x + 5x + 6\frac{1}{2}$ , che sappiamo essere sempre  $1x + 2\frac{1}{2}$ , (per esser la quantità  $1x + 5x + 6\frac{1}{2}$  sempre quadrata) cioè la  $3x$  d'  $1x$ , che è  $1x$ . Et di più vn numero, che è sempre la mità di  $5$ , numero delle  $x$ , viene ad essere eguale alla  $3x$ , del composto  $4\frac{1}{2}$ , qual  $3x$  è  $6\frac{1}{2}$ . Onde dalla  $3x$ , detta levato il  $2\frac{1}{2}$ , che sono quantità d'vn medesimo genere, cioè libere da dignità Algebrica, resterà solo l'  $1x$ , eguale a detto restante, perche esso restante sarà il valore della  $x$ . Di qui dunque vediamo poterli derivare la Regola del Capitolo, o Equatione d'  $1x$ , &  $4$ , eguali a numero, dicēdo: Quando  $1x$ , &  $4$ , sono eguali a numero; Al numero della Equatione si giunga il quadrato della mità del numero delle  $x$ , & dalla  $3x$  della somma si cavi la mità del numero delle  $x$ , che il restante sarà il valore della  $x$ .

Ancora, perche date due rette  $9$ , &  $4$ , se sopra alla maggiore come sopra a diametro formeremo vn mezzo cerchio, & da essa, cominciando da vn'estremo, segaremo la minore, & dal punto  $c$ , del segmento ergeremo la  $ca$ , perpendicolare al diametro, segnando il punto  $a$ , doue ella peruenie alla circonferenza, & da esso punto  $a$ , all'estremo  $r$ , commune al diametro, & linea



minore delle due date, timanderemo la retta  $a$ , questa  $a$   $r$   $6\frac{1}{2}$  sarà media proportionale fra le due date  $9$ , &  $4$ , (per la octaua del sesto d'Euclide) & noi di sopra nella figura superiore, habbiamo veduto, che al quadrato di questa  $6\frac{1}{2}$ , media  $sn$ , giunto il quadrato di  $2\frac{1}{2}$   $nc$ , mità di  $5$ , differenza, che è dalla  $4$   $on$ , minore alla  $9$   $na$ , maggiore, se ne compone il quadrato di  $c$   $s$ , semidiametro, & perciò di  $6\frac{1}{2}$   $cs$  linea composta dal  $4$ , minore, & dal  $2\frac{1}{2}$ , mità della differenza detta, che è dalla minore alla maggiore. Onde hora nella figura  $A$ , doue la maggiore è  $r$   $q$   $9$ , la minore  $c$   $q$   $4$ , la differenza loro  $c$   $q$   $5$ , la mità d'essa differenza  $c$   $p$   $2\frac{1}{2}$ , & la retta composta da essa  $2\frac{1}{2}$ , mità della differenza detta, & dalla minore  $c$   $q$   $4$ , è  $p$   $r$   $6\frac{1}{2}$ , essendo la media fra le  $9$ , &  $4$ , la  $a$   $r$   $6$ , veniamo a conoscere, che il  $4\frac{1}{2}$ , quadrato di  $p$   $r$ , è composto da  $36$ , quadrato di  $a$   $r$ , & dal  $6\frac{1}{2}$ , quadrato di  $c$   $q$ . Ma al  $36$ , quadrato di  $a$   $r$ , sono eguali il quadrato di  $c$   $a$ , (qual quadrato sarà  $10$ ), & il  $16$ , quadrato di  $c$   $r$ , onde in vece del quadrato di  $a$   $r$ , posti li due quadrati di  $c$   $a$ , &  $c$   $r$ , sapremo, che al solo quadrato di  $p$   $r$ , sono eguali li tre quadrati di  $c$   $a$ ,  $c$   $q$ , &  $c$   $r$ .

1. Hora, perche  $a$   $c$   $3x$   $10$ , è media proportionale fra  $c$   $r$   $4$ , &  $c$   $q$   $5$ , & che  $c$   $p$   $2\frac{1}{2}$ , è la mità d'essa  $c$   $q$   $5$ , vediamo, che il mezzo cerchio preso il punto  $c$ , sul diametro doue si vogli, & da esso eretta la  $ca$  perpendicolare  $c$   $a$ , perueniente alla circonferenza, & vna delle due parti del diametro diuisa per mezzo, & intesa vna d'esse mità giunta alla parte indiuisa, vediamo dico, che il quadrato del composto sarà eguale alli tre quadrati, che si fanno dalla parte indiuisa, & dalla mità della diuisa, & dalla perpendicolare al diametro nel punto delle diuisioni delle due parti, che arriva alla circonferenza.

Et presa la figura  $B$ , se posta  $c$   $q$   $4$ , &  $c$   $q$   $9$ , che il dutto loro è  $36$ , & però  $36$ , sarà il quadrato di  $a$   $c$ , media, cioè ella sarà  $6$ , & diuisa  $c$   $q$ , per mezzo in  $3$ , sapremo, che il quadrato di  $a$   $r$ , cioè il quadrato d'  $8\frac{1}{2}$ , che è  $72\frac{1}{2}$ , è eguale al quadrato di  $5$   $c$   $q$   $4\frac{1}{2}$ , di  $c$   $r$   $4$ , & di  $c$   $a$   $6$ . Et ben si vede, che  $10\frac{1}{2}$ , &  $36$ , compongono  $72\frac{1}{2}$ , (& perche essendo  $c$   $r$ , posta quanta ritale, cioè numero, & anco  $c$   $q$ , posta numero, la sua mità  $c$   $s$ , sarà numero, & però la somma di  $c$   $a$ , &  $c$   $r$  sarà pur numero; & anco il dutto di  $c$   $r$ , in  $c$   $q$ , sarà numero, & di più sarà numero quadrato, quando  $c$   $r$ , &  $c$   $q$ , habbino proportioni fra loro, come di numero quadrato a numero quadrato, per il che il quadrato di  $c$   $a$ , eguale al dutto di  $c$   $r$ , in  $c$   $q$ , sarà numero quadrato, cioè la  $c$   $a$ , istessa verrà ad essere numero; fappiamo ancora di più, che il quadrato di  $s$   $r$ , è eguale alli tre quadrati di  $c$   $r$ ,  $c$   $a$ , &  $c$   $q$ , vediamo, che si hanno tre numeri quadrati, cioè  $16$ ,  $36$ ,  $10\frac{1}{2}$ , la somma de quali è quadrata, cioè è  $72\frac{1}{2}$ , quadrato di  $s$   $r$ , Et che  $s$   $c$ , è la mità di quel  $9$ , che nasce a partire il  $36$ , quadrato di  $c$   $a$ , per  $c$   $q$ , & che perciò sempre, che il  $6$   $c$   $a$ , sia numero, & anco il  $c$   $r$ , numero, partendo il quadrato del  $6$   $c$   $a$ , che sarà pur numero, per  $c$   $r$ , ne verrà similmente numero per il  $c$   $q$ , la mità  $c$   $s$ , del quale sarà similmente numero. Onde di qui impariamo vn modo di trovare tre numeri, la somma de quali sia numero quadrato, & è, che Ponendo la  $3x$  &  $4$  del primo beneplacito, & sia  $4$ , & la  $3x$  del secondo  $c$   $a$ , beneplacito, & sia  $6$ , partendo il quadrato di  $6$ , cioè  $36$ ,

cioè 36. per il c r 4. che ne viene p. & di questo presa la metà. che è 18. effi 18. farà la Bz. dell'altro nu. quadrato, che gionto alli quadrati di 6. & di 4. farà somma quadrata. Et di più sappiamo, che la Bz. d'essa somma farà il composto di questo 42. & del 4. col quale si parte 16. quadrato del 6. Anzi se di questi tre quadrati 6. 36. 20. la somma del primo 16. & secondo 36. fusse quadrato, noi hauereffimo tre numeri quadrati tali, che è il primo. & secondo foli, & terzo si tre insieme farebbono somme quadrate; ma noi potiamo i primi numeri e r. a. ponerci tali, & potremo essere 3. & 4. Ouero 5. & 12. o altri, però hauereffimo l'intento. Che posto la Bz. del primo 7. & del secondo 4. partendo 16. quadrato del secondo, per 3. ne viene 5. che la metà è 2.5. per la Bz. del terzo numero, & la Bz. della somma di tutte 3. i quadrati che sommano 42. & 7. (X la somma è 3 2.5.) farà il 5. che è somma del 2.5. Bz. del terzo con 3. Bz. del primo. Et le vorremo trouare vn'altro quarto numero quadrato, che gionto alli tre p. 16. 7. quadrati facci somma quadrata, noi, mediante le cose dette, lo potremo fare, perche hauendo veduto, che dato c r, & c a, si troua c s, il quadrato del quale gionto alli due quadrati di c a, & c r, forma somma quadrata, volendo nò hora trouare vn numero c s, il quadrato del quale gionto a 3 2.5. facci somma quadrata, conueni supponere, che questo 3 2.5. sia la somma de' quadrati di c r, & c a, onde delli tre quadrati p. 16. 7. douendo ponere, che la Bz. d'vn d'essi sia la c r, il restante poi, che è dal quadrato di c r, fino al 3 2.5. verrà a pigliarsi per il quadrato di c a, (che verrà ad essere la somma de' gl'altri due quadrati dell'itre, cauatoe quello, di che si pone la c r, essere sua Bz.) onde se vorremo, che c r, sia 3. il quadrato di c r, da diuidere per il 3. farà 3 2.5. che resta a cauare il p. quadrato di 3. da 3 2.5. Et perche di questa partitione ne viene 7.2.5. che la metà è 3.6.2.5. questo 3.6.2.5. farà c s, il quadrato del quale gionto a 3 2.5. che è la somma delli tre primi quadrati, farà 46.5.2.5. numero quadrato, la Bz. del quale è 6.7.2.5. somma di c r. & c s 3.6.2.5. Et se ponessimo c r. Bz. del 16. allhora c s Bz. del quarto numero quadrato cercato farà 2.7.2.5. essendo il suo quadrato, è quarto numero 4.5.2.5. che con il 3 2.5. somma de' gl'altri tre quadrati, fa 3.7.2.5. numero quadrato, la Bz. del quale è 6.2.5. somma di 4 c r, & 2.7.2.5. c s; Che se ponessimo c r, essere 2.5. la c s, farà 4.1.2.5. & però il quarto numero quadrato farà 2.1.2.5. Onde non solo ueressimo ad hauer trouato vn numero quadrato, che gionto alli tre quadrati p. 16. 7. 3. formano somma quadrata, ma se hauereffimo trouati tre diuersi. Nel medesimo modo potressimo trouare vn quinto numero quadrato; anzi quattro numeri quadrati diuersi che gionto alli quattro quadrati trouati, componesse somma quadrata. Et anco poi vn sesto numero quadrato (anzi cinque numeri diuersi) che gionto alli cinque numeri quadrati, componesse somma quadrata. Et così seguire a trouarne quanti si uolesse.

Onde dicendosi. Trouinsi (poniamo) 10. numeri quadrati, che la somma del primo, & secondo, Et anco del primo, secondo, & terzo, Et anco del primo, secondo, & terzo, & quarto, Et anco del primo, secondo, & terzo, & quarto, & quinto, &c. per ordine fino a comprenderli tutti dieci sieno somme quadrate, noi potremo soluete il questo nell'istesso modo mostrau. Ma bellissima, & compitissima faria la regola del problema, che potesse dire (se è possibile) Reclamano trouare quante numeri quadrati si vogliono, tali; che la somma de' quali, & quanti di loro si vogliono, sia somma quadrata.

|   |    |     |          |            |            |
|---|----|-----|----------|------------|------------|
| 9 | 16 | 7.5 | cs 3.2.5 | cs 2.7.2.5 | cs 4.1.2.5 |
| 9 | 16 | 7.5 | 104      | 104        | 104        |
| 9 | 16 | 7.5 | 108      | 108        | 108        |
| 9 | 16 | 7.5 | 112      | 112        | 112        |
| 9 | 16 | 7.5 | 116      | 116        | 116        |
| 9 | 16 | 7.5 | 120      | 120        | 120        |
| 9 | 16 | 7.5 | 124      | 124        | 124        |
| 9 | 16 | 7.5 | 128      | 128        | 128        |
| 9 | 16 | 7.5 | 132      | 132        | 132        |
| 9 | 16 | 7.5 | 136      | 136        | 136        |
| 9 | 16 | 7.5 | 140      | 140        | 140        |
| 9 | 16 | 7.5 | 144      | 144        | 144        |
| 9 | 16 | 7.5 | 148      | 148        | 148        |
| 9 | 16 | 7.5 | 152      | 152        | 152        |
| 9 | 16 | 7.5 | 156      | 156        | 156        |
| 9 | 16 | 7.5 | 160      | 160        | 160        |
| 9 | 16 | 7.5 | 164      | 164        | 164        |
| 9 | 16 | 7.5 | 168      | 168        | 168        |
| 9 | 16 | 7.5 | 172      | 172        | 172        |
| 9 | 16 | 7.5 | 176      | 176        | 176        |
| 9 | 16 | 7.5 | 180      | 180        | 180        |
| 9 | 16 | 7.5 | 184      | 184        | 184        |
| 9 | 16 | 7.5 | 188      | 188        | 188        |
| 9 | 16 | 7.5 | 192      | 192        | 192        |
| 9 | 16 | 7.5 | 196      | 196        | 196        |
| 9 | 16 | 7.5 | 200      | 200        | 200        |
| 9 | 16 | 7.5 | 204      | 204        | 204        |
| 9 | 16 | 7.5 | 208      | 208        | 208        |
| 9 | 16 | 7.5 | 212      | 212        | 212        |
| 9 | 16 | 7.5 | 216      | 216        | 216        |
| 9 | 16 | 7.5 | 220      | 220        | 220        |
| 9 | 16 | 7.5 | 224      | 224        | 224        |
| 9 | 16 | 7.5 | 228      | 228        | 228        |
| 9 | 16 | 7.5 | 232      | 232        | 232        |
| 9 | 16 | 7.5 | 236      | 236        | 236        |
| 9 | 16 | 7.5 | 240      | 240        | 240        |
| 9 | 16 | 7.5 | 244      | 244        | 244        |
| 9 | 16 | 7.5 | 248      | 248        | 248        |
| 9 | 16 | 7.5 | 252      | 252        | 252        |
| 9 | 16 | 7.5 | 256      | 256        | 256        |
| 9 | 16 | 7.5 | 260      | 260        | 260        |
| 9 | 16 | 7.5 | 264      | 264        | 264        |
| 9 | 16 | 7.5 | 268      | 268        | 268        |
| 9 | 16 | 7.5 | 272      | 272        | 272        |
| 9 | 16 | 7.5 | 276      | 276        | 276        |
| 9 | 16 | 7.5 | 280      | 280        | 280        |
| 9 | 16 | 7.5 | 284      | 284        | 284        |
| 9 | 16 | 7.5 | 288      | 288        | 288        |
| 9 | 16 | 7.5 | 292      | 292        | 292        |
| 9 | 16 | 7.5 | 296      | 296        | 296        |
| 9 | 16 | 7.5 | 300      | 300        | 300        |
| 9 | 16 | 7.5 | 304      | 304        | 304        |
| 9 | 16 | 7.5 | 308      | 308        | 308        |
| 9 | 16 | 7.5 | 312      | 312        | 312        |
| 9 | 16 | 7.5 | 316      | 316        | 316        |
| 9 | 16 | 7.5 | 320      | 320        | 320        |
| 9 | 16 | 7.5 | 324      | 324        | 324        |
| 9 | 16 | 7.5 | 328      | 328        | 328        |
| 9 | 16 | 7.5 | 332      | 332        | 332        |
| 9 | 16 | 7.5 | 336      | 336        | 336        |
| 9 | 16 | 7.5 | 340      | 340        | 340        |
| 9 | 16 | 7.5 | 344      | 344        | 344        |
| 9 | 16 | 7.5 | 348      | 348        | 348        |
| 9 | 16 | 7.5 | 352      | 352        | 352        |
| 9 | 16 | 7.5 | 356      | 356        | 356        |
| 9 | 16 | 7.5 | 360      | 360        | 360        |
| 9 | 16 | 7.5 | 364      | 364        | 364        |
| 9 | 16 | 7.5 | 368      | 368        | 368        |
| 9 | 16 | 7.5 | 372      | 372        | 372        |
| 9 | 16 | 7.5 | 376      | 376        | 376        |
| 9 | 16 | 7.5 | 380      | 380        | 380        |
| 9 | 16 | 7.5 | 384      | 384        | 384        |
| 9 | 16 | 7.5 | 388      | 388        | 388        |
| 9 | 16 | 7.5 | 392      | 392        | 392        |
| 9 | 16 | 7.5 | 396      | 396        | 396        |
| 9 | 16 | 7.5 | 400      | 400        | 400        |
| 9 | 16 | 7.5 | 404      | 404        | 404        |
| 9 | 16 | 7.5 | 408      | 408        | 408        |
| 9 | 16 | 7.5 | 412      | 412        | 412        |
| 9 | 16 | 7.5 | 416      | 416        | 416        |
| 9 | 16 | 7.5 | 420      | 420        | 420        |
| 9 | 16 | 7.5 | 424      | 424        | 424        |
| 9 | 16 | 7.5 | 428      | 428        | 428        |
| 9 | 16 | 7.5 | 432      | 432        | 432        |
| 9 | 16 | 7.5 | 436      | 436        | 436        |
| 9 | 16 | 7.5 | 440      | 440        | 440        |
| 9 | 16 | 7.5 | 444      | 444        | 444        |
| 9 | 16 | 7.5 | 448      | 448        | 448        |
| 9 | 16 | 7.5 | 452      | 452        | 452        |
| 9 | 16 | 7.5 | 456      | 456        | 456        |
| 9 | 16 | 7.5 | 460      | 460        | 460        |
| 9 | 16 | 7.5 | 464      | 464        | 464        |
| 9 | 16 | 7.5 | 468      | 468        | 468        |
| 9 | 16 | 7.5 | 472      | 472        | 472        |
| 9 | 16 | 7.5 | 476      | 476        | 476        |
| 9 | 16 | 7.5 | 480      | 480        | 480        |
| 9 | 16 | 7.5 | 484      | 484        | 484        |
| 9 | 16 | 7.5 | 488      | 488        | 488        |
| 9 | 16 | 7.5 | 492      | 492        | 492        |
| 9 | 16 | 7.5 | 496      | 496        | 496        |
| 9 | 16 | 7.5 | 500      | 500        | 500        |
| 9 | 16 | 7.5 | 504      | 504        | 504        |
| 9 | 16 | 7.5 | 508      | 508        | 508        |
| 9 | 16 | 7.5 | 512      | 512        | 512        |
| 9 | 16 | 7.5 | 516      | 516        | 516        |
| 9 | 16 | 7.5 | 520      | 520        | 520        |
| 9 | 16 | 7.5 | 524      | 524        | 524        |
| 9 | 16 | 7.5 | 528      | 528        | 528        |
| 9 | 16 | 7.5 | 532      | 532        | 532        |
| 9 | 16 | 7.5 | 536      | 536        | 536        |
| 9 | 16 | 7.5 | 540      | 540        | 540        |
| 9 | 16 | 7.5 | 544      | 544        | 544        |
| 9 | 16 | 7.5 | 548      | 548        | 548        |
| 9 | 16 | 7.5 | 552      | 552        | 552        |
| 9 | 16 | 7.5 | 556      | 556        | 556        |
| 9 | 16 | 7.5 | 560      | 560        | 560        |
| 9 | 16 | 7.5 | 564      | 564        | 564        |
| 9 | 16 | 7.5 | 568      | 568        | 568        |
| 9 | 16 | 7.5 | 572      | 572        | 572        |
| 9 | 16 | 7.5 | 576      | 576        | 576        |
| 9 | 16 | 7.5 | 580      | 580        | 580        |
| 9 | 16 | 7.5 | 584      | 584        | 584        |
| 9 | 16 | 7.5 | 588      | 588        | 588        |
| 9 | 16 | 7.5 | 592      | 592        | 592        |
| 9 | 16 | 7.5 | 596      | 596        | 596        |
| 9 | 16 | 7.5 | 600      | 600        | 600        |
| 9 | 16 | 7.5 | 604      | 604        | 604        |
| 9 | 16 | 7.5 | 608      | 608        | 608        |
| 9 | 16 | 7.5 | 612      | 612        | 612        |
| 9 | 16 | 7.5 | 616      | 616        | 616        |
| 9 | 16 | 7.5 | 620      | 620        | 620        |
| 9 | 16 | 7.5 | 624      | 624        | 624        |
| 9 | 16 | 7.5 | 628      | 628        | 628        |
| 9 | 16 | 7.5 | 632      | 632        | 632        |
| 9 | 16 | 7.5 | 636      | 636        | 636        |
| 9 | 16 | 7.5 | 640      | 640        | 640        |
| 9 | 16 | 7.5 | 644      | 644        | 644        |
| 9 | 16 | 7.5 | 648      | 648        | 648        |
| 9 | 16 | 7.5 | 652      | 652        | 652        |
| 9 | 16 | 7.5 | 656      | 656        | 656        |
| 9 | 16 | 7.5 | 660      | 660        | 660        |
| 9 | 16 | 7.5 | 664      | 664        | 664        |
| 9 | 16 | 7.5 | 668      | 668        | 668        |
| 9 | 16 | 7.5 | 672      | 672        | 672        |
| 9 | 16 | 7.5 | 676      | 676        | 676        |
| 9 | 16 | 7.5 | 680      | 680        | 680        |
| 9 | 16 | 7.5 | 684      | 684        | 684        |
| 9 | 16 | 7.5 | 688      | 688        | 688        |
| 9 | 16 | 7.5 | 692      | 692        | 692        |
| 9 | 16 | 7.5 | 696      | 696        | 696        |
| 9 | 16 | 7.5 | 700      | 700        | 700        |
| 9 | 16 | 7.5 | 704      | 704        | 704        |
| 9 | 16 | 7.5 | 708      | 708        | 708        |
| 9 | 16 | 7.5 | 712      | 712        | 712        |
| 9 | 16 | 7.5 | 716      | 716        | 716        |
| 9 | 16 | 7.5 | 720      | 720        | 720        |
| 9 | 16 | 7.5 | 724      | 724        | 724        |
| 9 | 16 | 7.5 | 728      | 728        | 728        |
| 9 | 16 | 7.5 | 732      | 732        | 732        |
| 9 | 16 | 7.5 | 736      | 736        | 736        |
| 9 | 16 | 7.5 | 740      | 740        | 740        |
| 9 | 16 | 7.5 | 744      | 744        | 744        |
| 9 | 16 | 7.5 | 748      | 748        | 748        |
| 9 | 16 | 7.5 | 752      | 752        | 752        |
| 9 | 16 | 7.5 | 756      | 756        | 756        |
| 9 | 16 | 7.5 | 760      | 760        | 760        |
| 9 | 16 | 7.5 | 764      | 764        | 764        |
| 9 | 16 | 7.5 | 768      | 768        | 768        |
| 9 | 16 | 7.5 | 772      | 772        | 772        |
| 9 | 16 | 7.5 | 776      | 776        | 776        |
| 9 | 16 | 7.5 | 780      | 780        | 780        |
| 9 | 16 | 7.5 | 784      | 784        | 784        |
| 9 | 16 | 7.5 | 788      | 788        | 788        |
| 9 | 16 | 7.5 | 792      | 792        | 792        |
| 9 | 16 | 7.5 | 796      | 796        | 796        |
| 9 | 16 | 7.5 | 800      | 800        | 800        |
| 9 | 16 | 7.5 | 804      | 804        | 804        |
| 9 | 16 | 7.5 | 808      | 808        | 808        |
| 9 | 16 | 7.5 | 812      | 812        | 812        |
| 9 | 16 | 7.5 | 816      | 816        | 816        |
| 9 | 16 | 7.5 | 820      | 820        | 820        |
| 9 | 16 | 7.5 | 824      | 824        | 824        |
| 9 | 16 | 7.5 | 828      | 828        | 828        |
| 9 | 16 | 7.5 | 832      | 832        | 832        |
| 9 | 16 | 7.5 | 836      | 836        | 836        |
| 9 | 16 | 7.5 | 840      | 840        | 840        |
| 9 | 16 | 7.5 | 844      | 844        | 844        |
| 9 | 16 | 7.5 | 848      | 848        | 848        |
| 9 | 16 | 7.5 | 852      | 852        | 852        |
| 9 | 16 | 7.5 | 856      | 856        | 856        |
| 9 | 16 | 7.5 | 860      | 860        | 860        |
| 9 | 16 | 7.5 | 864      | 864        | 864        |
| 9 | 16 | 7.5 | 868      | 868        | 868        |
| 9 | 16 | 7.5 | 872      | 872        | 872        |
| 9 | 16 | 7.5 | 876      | 876        | 876        |
| 9 | 16 | 7.5 | 880      | 880        | 880        |
| 9 | 16 | 7.5 | 884      | 884        | 884        |
| 9 | 16 | 7.5 | 888      | 888        | 888        |
| 9 | 16 | 7.5 | 892      | 892        | 892        |
| 9 | 16 | 7.5 | 896      | 896        | 896        |
| 9 | 16 | 7.5 | 900      | 900        | 900        |
| 9 | 16 | 7.5 | 904      | 904        | 904        |
| 9 | 16 | 7.5 | 908      | 908        | 908        |
| 9 | 16 | 7.5 | 912      | 912        | 912        |
| 9 | 16 | 7.5 | 916      | 916        | 916        |
| 9 | 16 | 7.5 | 920      | 920        | 920        |
| 9 | 16 | 7.5 | 924      | 924        | 924        |
| 9 | 16 | 7.5 | 928      | 928        | 928        |
| 9 | 16 | 7.5 | 932      | 932        | 932        |
| 9 | 16 | 7.5 | 936      | 936        | 936        |
| 9 | 16 | 7.5 | 940      | 940        | 940        |
| 9 | 16 | 7.5 | 944      | 944        | 944        |
| 9 | 16 | 7.5 | 948      | 948        | 948        |
| 9 | 16 | 7.5 | 952      | 952        | 952</      |



nore, sono eguali al quadrato d'essa maggiore. Perché si può dire, che il quadrato 8. r. della maggiore cauone il duto (45.) d'essa maggiore nella differenza delle estreme è eguale al quadrato della media.

Onde conuerfamente quando si dirà il quadrato di  $a$ , cauone il duto di  $a$ , in  $u$ , i. o vogliamo dire il quadrato di  $a$ , manco il duto di  $a$ , in  $n$  i. è eguale al quadrato di  $u$ , s. o diciamoci di tre quantità, & linee rette, il quadrato della prima cauone il duto della prima nella differenza d'essa alla terza è eguale al quadrato della seconda, si conofcerà, che queste tre rette, o quantità sono di necessità continue proporzionali, & che la prima è la maggiore, la seconda la media, & la terza è la minore.

Et perché di quattro quantità proporzionali il duto delle estreme prima & quarta è così eguale al duto delle due medie, seconda, & terza, come anco di 3, sole continue proporzionali, il duto delle due estreme è eguale al duto della media in se stessa (che per mostrarlo, discorrendo naturalmente, essendo  $A$  5. prima,  $B$  3. seconda,  $C$  35. terza, &  $D$  21. quarta, quattro quantità proporzionali, cioè tali, che la proportionione della prima  $A$ , alla seconda  $B$ , sia come la proportionione della terza  $C$ , alla quarta  $D$ , & perciò tali, che quante volte (o più, o manco della vna) la prima  $A$ , contiene la seconda  $B$ , le medeme volte anco la terza  $C$ , contegua la quarta

$D$ , consideriamo, che se la  $A$ , contiene la  $B$  per 5 volte  $E$  17, moltiplicando noi, così la  $A$ , come la  $B$ , via vna medesima  $D$  21. ancora il duto della  $A$ , nella  $D$ , conterrà il duto della  $B$ , nella istessa  $D$ , per 5 medesime volte  $E$  17, per le quali l'vn moltiplicante  $A$ , contiene l'altro moltiplicante  $B$ . Onde se moltiplicassimo il duto di  $B$ , in  $D$ , per la  $E$ , allhora il prodotto faria eguale al duto di  $A$ , in  $D$ . Ma tanto è dire il duto di  $B$ , in  $D$ , per la  $E$  quanto è dire il duto di  $D$ , in  $E$ , per la  $B$ , poiche in ciaschun modo si produce il duto di esse tre quantità  $B$ ,  $D$ ,  $E$ , fra loro, per il che si vede, che moltiplicando la  $B$ , per il duto di  $D$  in  $E$ , (o vogliamo dire per vna quantità, che fusse volte  $E$  17, quanto la  $D$ , o che contenesse la  $D$ , per le volte  $E$  17, il prodotto faria eguale al duto della  $A$ , nella  $D$ , ma la  $C$  35. è tale, cioè contiene la  $D$ , per le volte  $E$  17, (come la  $A$ , contiene la  $B$ ), però a moltiplicare la  $B$ , via la  $C$  il prodotto faria eguale al duto della  $A$ , nella  $B$ , come si volea mostrare) si può dire, che di 4. quantità proporzionali il quadrato della maggiore delle due estreme, cauone il duto d'essa maggiore nella differenza, che è da lei all'altra estrema, è eguale al duto delle due medie.

Queto conuerfamente; quando si dirà, di 4. quantità il quadrato della maggiore delle due estreme cauone il duto d'essa nella differenza, che è da lei all'altra estrema, è eguale al duto delle due medie, si conofcerà, che quelle 4. quantità sono proporzionali.

Anzi (perche essendo come da 5. a 3. così da 35. a 21. ancora permutatamente da 5. a 35. faria come da 3. a 33. Et conuerfamente da 35. a 5. come da 21. a 3. Et anco faria da 5. a 21. come da 5. a 3. Et così ne gl'altri modi del margine, che quando le quantità sono proporzionali in 8. modi elle possono essere accomodate, che pure faranno proporzionali, poiche ciascuna d'esse 4. può essere nel primo luogo due volte) noi potiamo assolutamente dire, che di 4. quantità proporzionali il quadrato della maggiore cauone il duto d'essa nella differenza, che è da lei alla minore è sempre eguale al duto dell'altre due quantità.

Et conuerfamente quando si dirà, Di 4. quantità il quadrato della maggiore cauone il duto d'essa nella differenza, che è da lei alla minore è eguale al duto dell'altre due, sapremo che queste 4. quantità si possono accomodare per ordine in maniera, anai in 8. modi diversi, talmente che elle faranno proporzionali, cioè che dalla prima alla 2. farà come dalla terza alla quarta.


Di più a questa similitudine, perche nell'antecedente primo discorso da principio si mostrò, che di 3. quantità continue proporzionali il quadrato della minore giunto al duto d'essa nella differenza, che è da lei alla maggiore è sempre eguale al quadrato della media; Trasferendo noi questa proprietà nelle 4. proporzionali potremo dire, Di 4. quantità proporzionali il quadrato della

|    |    |            |     |        |
|----|----|------------|-----|--------|
| 5  | 3  | 35         | 21  | 21     |
|    |    |            |     | via 16 |
|    |    | 105        | 441 | 356    |
|    |    | cauato 316 |     |        |
|    |    | resta 105  |     |        |
| 5  | 3  | 35         | 21  |        |
| 5  | 35 | 3          | 21  |        |
| 35 | 5  | 21         | 3   |        |
| 35 | 21 | 5          | 3   |        |
| 3  | 5  | 21         | 35  |        |
| 3  | 21 | 5          | 35  |        |
| 21 | 35 | 5          | 3   |        |
| 21 | 3  | 35         | 5   |        |

Di più a questa similitudine, perche nell'antecedente primo discorso da principio si mostrò, che di 3. quantità continue proporzionali il quadrato della minore giunto al duto d'essa nella differenza, che è da lei alla maggiore è sempre eguale al quadrato della media; Trasferendo noi questa proprietà nelle 4. proporzionali potremo dire, Di 4. quantità proporzionali il quadrato della

della minore giontoli il dutto d'essa nella differenza, che è da lei alla maggiore, è sempre eguale al dutto dell'altre due. Et conuersamente quando si dirà. Di 4. quantità il quadrato della minore giontoli il dutto d'essa nella differenza, che è da lei alla maggiore, è eguale al dutto dell'altre due, sapremo che queste 4. quantità si possono ordinare in 8. modi, talmente, che saranno proportionali, cioè che dalla prima alla seconda sarà come dalla terza alla quarta.

¶ Ancora vediamo hora conferendo insieme le due proprietà delle 3. quantità continue proportionali, che di due quantità proposte tanto resulta a giungere al quadrato della minore il dutto d'essa nella differenza, che è da lei alla maggiore, quanto resultará a cauare dal quadrato della maggiore il dutto d'essa nella differenza, che è da lei alla minore. Poiche, & l'vno, & l'altro di quelli dui resultanti è sempre eguale al quadrato della quantità, che fusse media fra le due quantità proposte, ò vogliamo dire, poiche ciascuno di detti dui resultanti è sempre eguale al dutto d'esse due quantità proposte fra loro, Come anco si conosce benissimo nella figura del mar



O in numeri.

8. via 8. si compone da 5. via 3. & 3. via 8. Ma il 3. via 8. si compone da 3. via 3. & da 3. via 5. Adunque quello, che resta a cauare dal quadrato d'8. il dutto d'esso 8. nel 5. differenza da esso 8. a 3. è quanto il quadrato di 3. giontoli il dutto del medesimo 3. nella differenza 5. ch'è dal 3. ad 8.

gine, doue nel quadrato di a r, diuiso nel quadrato di a c, & nei dui rettangoli di a c, in c r, & di a r, in c r, (cioè & di n d in d m) tanto resulta a giungere l'vn rettangolo c d 15. che è il dutto di a c minore di due rette date a c 3. & a r 8. in c r 5. differenza loro. al quadrato d'essa a c, & ne resulta la superficie a d; Quanto resulta dal quadrato grãde a m, che è il quadrato della maggiore

re a r 8. cauare il dutto della istessa maggiore a r. (ouero a m, nella differenza, che è da essa a r, maggiore alla a c, minore, qual differenza è la c r, ouero la d m, & il dutto detto è la superficie m n, che cauato dal total quadrato a m, resta pure la superficie a d, che è la somma detta del quadrato di a c, con il rettangolo c d.

Hora dicendoci di tre quantità, ò di tre rette continue proportionali a n, n s, n o, la media n s, è 6. & la differenza di n o, minore ad a n, maggiore è 5. si domanda la n a, maggiore. Se potremo essa essere 1 x, la minore sarà 1 x m 5. & il loro dutto 1 x m 5 x, sarà eguale a 36. quadrato della media, onde per leuare il m, giunto 5 x, a ciascuna banda, haueremo 1 x, eguale a 5 x p 36. Ouero essendosi mostrato, che il quadrato della maggiore cauato il dutto d'essa maggiore nella differenza, che è da essa alla minore è eguale al quadrato della media, sapremo pure, che da 1 x. quadrato della maggiore cauato 5 x. dutto della maggiore 1 x nel 5. differenza data, il restante 1 x m 5 x, è eguale a 36. quadrato della media. Et perciò 1 x, è eguale a 5 x p 36. che è quanto a dire il quadrato della media con il dutto della maggiore nella differenza d'essa alla minore essere eguale al quadrato della maggiore. Ouero essendosi mostrato nella antecedente Consideratione, che il quadrato della minore giontoli il dutto d'essa minore nella differenza, che è da lei alla maggiore fa quãto il quadrato della media, sapremo, che 1 x m 10 x p 25. (quadrato della minore) con 5 x m 25. cioè in tutto 1 x m 5 x, sarà eguale a 36. (quadrato della media) & perciò come prima haueremo 1 x, eguale a 5 x p 36. Hora in questa Equatione ignora, per venire in cognitione del valore della x, & del modo di trouarlo, considereremo, che il composto di o n, minore, & di n a, maggiore forma il diametro a o, il centro del quale è in mezzo ad esso com posto; & fatta a i, parte sinistra del diametro, & della maggiore eguale ad o n, minore, la restante i n, della maggiore farà la differenza d'essa alla minore, perliche sarà il 5. differenza data, & nel mezzo d'essa differenza, cioè dal comune



termine n, delle due estreme verso il punto i, sarà il centro r, del cerchio, onde r n, sarà 3. & perche il suo quadrato 9, gionto al quadrato di n s 6, media data, qual quadrato è 36, che fanno in somma 45, ò due essere eguale al quadrato di r s, (oppoſta, ò subtenſa all'angolo retto r n s), & però eguale al quadrato di r o, ouero di r a, semidiametro, sapremo, che la r s, di questo 45, cioè 6. ò due essere il semidiametro r a, ma perche la maggiore posta 1 x, supera questo semidiametro a r, nella r n 3. mità di 5. differenza delle due estreme, vediamo, che a que

B

ſio 6 1/2 r,

Ho  $6\frac{1}{2}$  del composto del quadrato di  $6$  n. & di  $2\frac{1}{2}$  n. giunto esso  $1\frac{1}{2}$  n. la somma  $9$ . sarà la totale n. a. maggiore poste  $1$  z. cioè che  $9$ . sarà il valore della  $z$ . Et così veniamo a conoscere che quando haueremo  $1$  z. eguale a  $1$ . & numero (come hora che si hauea  $1$  z. eguale a  $5$  &  $16\frac{1}{2}$  Gioungendosi il quadrato della metà del numero delle  $z$ . al numero. & della somma pigliando la  $12$ . &  $2\frac{1}{2}$  esso  $12$ . gioungendo la metà del numero delle  $z$ . la somma sarà il valore della  $z$ . Onde sup. ad hora habbiamo regola al Capicolo, o Equatione d'  $1$  z. &  $z$ . eguale a numero, & all' Equatione d'  $1$  z. eguale a  $z$ . & numero.

Et tornando al principio. Dicendosi. Data la media di  $3$ . quantità continue proportionali & la differenza delle due estreme si vuol trovare ciascuna d' esse. Che in numeri essendo la media  $6$ . & la differenza delle due estreme  $5$ . conuerà trovare due quantità differenti in  $5$ . che il dutto loro sia  $36$ . quadrato della media  $6$ . Onde posta la minore  $1$  z. la maggiore sarà  $1$  &  $5$ . & il dutto loro  $1$  &  $5$  z. sarà eguale a  $36$ . (la medesima Equatione si trouaria, se considerando che di  $3$ . quantità continue proportionali il dutto della minore nella differenza d' essa alla maggiore gioungesi il quadrato di detta minore è eguale al quadrato della media, sapido noi la differenza della minore alla maggiore essere  $5$ . (& la media  $6$ .) posta la minore  $1$  z. ella si moltiplicasse nel  $5$ . differenza d' essa alla maggiore, che fa  $5$  z. & a questo si giougesse  $1$  z. quadrato della minore, che faria  $1$  &  $5$  z. & questa somma faria eguale a  $36$ . quadrato di  $6$ . media data) che però in questa Equatione a  $36$ . giunto  $6\frac{1}{2}$ . quadrato di  $2\frac{1}{2}$ . metà del  $5$ . numero delle  $z$ . che fa  $4\frac{1}{2}$ . & della sua  $12$ . che è  $6\frac{1}{2}$ . cauato il  $2\frac{1}{2}$ . metà del  $5$ . resta  $4$ . per valore della  $z$ . & la minor parte; Noi vediamo la Regola da trovare esse due quantità estreme potere essere questa. Al quadrato della media giungasi il quadrato della metà della differenza data delle due estreme, & dalla  $12$ . del composto si caui la metà della differenza delle due estreme, che il restante sarà la minore delle due estreme.

Et in linee si potrà dire a questa similitudine. Data la media di  $3$ . rette continue proportionali, & la differenza delle due estreme per trovare ciascuna d' esse.



In vna delle estremità di a. differenza data poniamo in c. si tiri ad angolo retto con essa la media data c. r. & dalla sommità r. al mezzo in g. della differenza data si tiri la retta r. g. & si allunghi la g. c. verso c. in t. sicche g. r. sia eguale alla g. r. che allhora la c. t. sarà la minore, & tutta la t. a. la maggiore delle due estreme.

Questo anco è quanto se dicesimo. D'vn parallelogramo rettangolo eguale al quadrato di c. r. (o eguale ad vn rettangolo, qual poi conuerria ridurre a quadrato per hauer noto il suo lato c. r.) la differenza della lunghezza, & larghezza è la a. c. si domandano esse lunghezza, & larghezza, che fariano a t. & c.

Et ponendo la quantità maggiore essere  $1$  z. & la minore  $1$  &  $5$  z. il dutto loro  $1$  &  $5$  z. faria eguale a  $36$ . cioè  $1$  z. eguale a  $5$  &  $16\frac{1}{2}$ .

Onde in questa Equatione al quadrato di  $2\frac{1}{2}$ . (metà di  $5$ . numero delle  $z$ .) che è  $4\frac{1}{2}$ . giunto  $36$ . (numero della Equatione) & fa  $40\frac{1}{2}$ . che ha  $12\frac{1}{2}$ . a questo  $6\frac{1}{2}$ . giunto il  $2\frac{1}{2}$ . (metà del numero delle  $z$ .) fa  $9$ . che è il valore della  $z$ . & però è la quantità maggiore, & che la regola è. Alla  $12$ . della somma del quadrato della media, & del quadrato della metà della differenza delle estreme giunta la metà della differenza delle estreme se ne forma la maggiore. Et in linee. Alla r. g. giunto in lungo la g. c. la somma r. o. è la maggiore; Perilche da essa g. r. segata la istessa g. c. il restante r. t. sarà la minore.

Et ponendosi la maggiore essere  $1$  &  $5$  z. Et la minore  $1$  &  $2\frac{1}{2}$ . che il prodotto loro  $1$  &  $12\frac{1}{2}$ . sarà eguale a  $36$ . Onde giunto  $6\frac{1}{2}$ . a ciascuna banda si hauerà  $1$  z. eguale a  $42\frac{1}{2}$ . che perciò la  $z$ . valerà la  $12$ . di  $42\frac{1}{2}$ . cioè  $6\frac{1}{2}$ . al quale giunto, & cauato  $2\frac{1}{2}$ . ne resterà  $9$ . &  $4$ . per le quantità poste  $1$  &  $5$  z. &  $1$  &  $2\frac{1}{2}$ . Vediamo pure, che alla  $12$ . del composto de' due quadrati di  $6$ . media, & di  $2\frac{1}{2}$ . metà della differenza delle estreme giunta essa metà della differenza delle estreme, ne risulta la maggiore, & cauatala ne risulta la minore.

Ahora considerando, che per essere le tre rette a n. o. n. a. b. & n. o. continue proportionali ne segue, che il dutto delle estreme a. & b. è eguale al quadrato della media n. Et vedendo che il dutto di tutta la a n. i. z. (composta dalle due estreme) nella minore n. a. è quanto il dutto della istessa n. o. nelle due parti a n. n. o. d' essa totale a n. cioè è quanto il dutto di n. o. in a. n. & di n. o. in n. o. istessa (che è il quadrato di n. o.) perche di quelli due sumi il primo di n. o. in a. n. (che sono le due rette estreme delle tre continue proportionali) è eguale al quadrato di n. a. media,

media, ò seconda, vediamo che se à questo quadrato della seconda giungeremo il quadrato di n, terza, la somma sarà eguale al tutto di questa media, ò terza nel composto della prima, & terza. Onde si può dire, che il tutto della terza nel composto della prima, & terza, cauatone il quadrato d'essa terza è eguale al quadrato della media.

Et perche potremmo, risuoltando le tre quantità continue proportionali 9. 6. 4. fingere, che fossero 4. 6. 9. cioè, che delle due estreme la minore 4. fusse la prima, & la maggiore 9. fusse la terza, pure si uerrà che il tutto della terza 9. nel composto 13. della prima, & terza, & fa 117. cauatone il quadrato 81. d'essa 9. terza, & resta 36. sarà eguale al quadrato della seconda 5. Ouero senza mouere l'ordine primiero delle 3. quantità, dicendo che sono 9. prima, 6. seconda, & 4. terza, perche pure vediamo, che il tutto di a n 9. prima in a o, composto della prima, & terza, è eguale alli due dritti della istessa a n 9. nelle due parti della totale a o, cioè al tutto di a n, in a n. Et di a n, in n o. Perche di quelli dai dritti, quello di a n, in n o, (prima, & terza delle 3. rette continue proportionali) è eguale al quadrato di n 6. media, ò seconda, vediamo, che se à questo quadrato della seconda giungeremo il tutto di a n, in a n, cioè il quadrato di a n, prima, che la somma sarà eguale al tutto di questa a n, prima nel composto della prima, & terza. Onde si può dire, che il tutto della prima nel composto della prima, & terza, cauatone il quadrato d'essa prima è eguale al quadrato della media.

Onde conuersamente quando si dirà, Il tutto di a n, in a o, cauatone il quadrato di a n, ò vogliamo dire, Il tutto di a n, in n o, manco il quadrato di a n, è eguale al quadrato di n s, ò dicendosi, Di tre rette, ò quantità il tutto della prima nella seconda, cauatone il quadrato della prima è eguale al quadrato della terza, si conoscerà, che in queste tre quantità, ò rette si vengono à includere tre quantità continue proportionali, delle quali vna delle estreme è quella, che è chiamata prima, media è quella, che è chiamata terza, & l'altra estrema è quella, che resta à canare la chiamata prima dalla chiamata seconda. Che dicendosi, Il tutto di 7. in 182. (che è 1274.) cauatone il quadrato di 7. (che è 49. & resta 1225.) è eguale al quadrato di 35. (che è 1225.) conuerà, che il 7. sia la prima, ò terza di tre quantità continue proportionali, il 35. sia la seconda, & la differenza di 7. à 182. cioè 175. sia l'altra estrema, cioè la terza, ò la prima.

Et applicando questo à 4. quantità, si può dire, Di 4. quantità proportionali il tutto d'vna delle estreme via la somma delle due estreme, cauatone il quadrato di detta vna delle estreme, è eguale al tutto delle due medie.

Onde conuersamente quando si dirà, Di 4. quantità il tutto del composto di due di loro moltiplicato via l'vna d'esse, cauatone il quadrato d'essa vna d'esse è eguale al tutto dell'altre due,

conoscere, che queste 4. quantità sono proportionali, & che essa vna d'esse è vna delle estreme ò prima, ò quarta, quale cauatà dal composto delle due di loro, resterà l'altra estrema. Et che l'altre due sono la seconda, & terza, ò la terza, & seconda.

Hora dicendosi, Di 3. quantità continue proportionali a n, n s, n o, la media n s, è 6. & la somma delle due estreme a n, n o, è 13. si domanda ciascuna d'esse due estreme: Se noi ponere, vna d'esse essere 12. l'altra sarà il restate fino a 13. somma loro, cioè farà 13 m 12. Et perche di tre quantità continue proportionali il tutto delle due estreme è eguale al quadrato della media, sapremo che 12 x m 12. (tutto di 12. via 12 m 12. poste essere le due estreme) è eguale a 36. (quadrato della 6. media) cioè (aggiunto 12 à ciascuna parte per leuare il m, dalla Equatione) che 12 x. sono eguali ad 12 x 36. Ouero sapendo noi per la prima Consideratione, che di tre quantità continue proportionali, auuene, che il quadrato della minore, giuntoli il tutto d'essa minore nella differenza, che è da lei alla maggiore, fa quanto il quadrato della media, se noi hauendo posto le due estreme essere 12. & 13 m 12. pigliaremo per minore la 12. (che a nostro beneplacito potiamo supporre, che la 12. sia maggiore, ò minore di 13 m 12.) il quadrato d'essa minore farà 12, & cauatone essa minore 12, da 13 m 12. che verrà ad essere la maggiore, & resterà 13 m 12. questo sarà la differenza, che è dalla minore alla maggiore, quale moltiplicata via la minore 12. fa 12 x m 12. che giunto ad 12. quadrato della detta minore fa 12 x m 12. il

|             |        |    |    |
|-------------|--------|----|----|
| 5           | 3      | 35 | 32 |
|             | 105    |    |    |
| 36          |        | 36 |    |
| via 5       | via 11 |    |    |
| fa 130      | fa 105 |    |    |
| cauatato 14 |        |    |    |
| resta 105   |        |    |    |
| 5           | 35     | 3  | 32 |
| 31          | 3      | 35 | 5  |
| 21          | 35     | 3  | 5  |



che è dalla minore alla maggiore, quale moltiplicata via la minore 12. fa 12 x m 12. che giunto ad 12. quadrato della detta minore fa 12 x m 12. il


che è eguale à 36. quadrato di 6. media. Et così haueremo pure 13. m. 12. eguale à 36. cioè 19. m. eguale ad 12 p. 36. Et se noi delle due estreme 12. & 13. m. 12. haueremo supposto la minore (si fere la 12. m. restando poi la maggiore la 12. il quadrato di detta minore sarà 144. m. 16. p. 12. Et cauando detta minore 13. m. 12. dalla maggiore 12. resterà 2. m. 12. che sarà la differenza che è dalla minore alla maggiore, & questa moltiplicata via la minore 13. m. 12. produce 336. m. 169. m. 12. p. 12. quadrato della minore. somma 123. m. 12. eguale à 36. cioè 13. m. 12. eguale ad 12 p. 36.

la maggiore nella differenza, che è da essa maggiore alla minore, fanno quãto il quadrato della maggiore. Se noi posse le due estreme 12. & 13. m. 12. piglieremo per minore la 12. che così la differenza d'essa alla maggiore 13. m. 12. sarà 13. m. 12. questa moltiplicata via la maggiore 13. m. 12. fa 169. m. 169. m. 12. p. 12. il che giunto à 36. quadrato della media, fa in somma 205. m. 39. p. 12. quale deu' essere eguale al quadrato della maggiore 13. m. 12. che è 169. m. 169. m. 12. p. 12. Onde accomodati i m. & leuati i superflui, ò parti eguali da ciascuna banda della Equatione haueremo 123. p. 36. eguale à 13. m. 12. come l'altre volte. Et supponendo, che delle due estreme 12. & 13. m. 12. la maggiore sia la 12. essendo la minore 13. m. 12. cauata q̃sta da la 12. resterà 2. m. 12. per la differenza d'esse due estreme, questa moltiplicata via la maggiore 12. produce 24. m. 13. m. 12. quale giunto à 36. quadrato della media, fa 22. m. 139. p. 36. il che deu' essere eguale al quadrato della maggiore 12. cioè ad 12. Onde giunto 13. m. 12. à ciascuna banda, & leuato 12. si haue-  
rà 123. p. 36. eguale à 13. m. 12. come prima.

Ouero, mediante questa terza Consideratione, hauendo veduto, che di 3. quantità continue proporzionali il duto della prima (cioè d'vna delle due estreme) nel composto della prima, & terza (cioè nel composto delle due estreme) cauato il quadrato d'essa prima, è eguale al quadrato della media, Se noi posse le due estreme 12. & 13. m. 12. piglieremo per prima la 12. & la moltiplicheremo via 13. composto della prima, & terza, che produce 156. m. & di questo cauaremo 12. quadrato della prima detta 12. che resterà 13. m. 12. & questo sarà eguale à 36. quadrato della media; Onde a: commodato il m. (ouero al quadrato 36. della media giunto 12. quadrato della prima, che fa 123. p. 36.) haueremo 123. p. 36. eguale à 13. m. 12. come l'altre volte. Et se haueremo preso 12. per terza, & però 13. m. 12. per prima delle tre quantità continue proporzionali, allhora moltiplicato la prima 13. m. 12. via 13. composto della prima, & terza, che produrrebbe 169. m. 13. m. 12. questo sarà eguale al 36. quadrato della media, giouoli 169. m. 169. m. 12. p. 12. quadrato della prima, che fanno in somma 205. m. 26. p. 12. Onde accomodati i m. & leuato 169. da ciascuna banda, haueremo 123. p. 36. eguale à 13. m. 12. come è auenuto in ciascuno degli altri modi, & positioni sopra dette. Hora per venire in cognitione del valore della 8. del modo di trovarlo, potremo considerare, che per essere la 2. o 1. 3. somma delle due estreme prima, & terza) il diametro del cerchio, & però nel mezzo d'essa il centro r, che il semidiametro r, ouero o, & però anco lo s, farà 6. m. 12. metà del 13. al quadrato del quale 6. semidiametro è sempre eguale al quadrato di n s, media, & il quadrato di n r, quale n r, è la differenza, che si troua dal centro, ò metà del 13. composto delle due prima, & terza, à ciascuna d'esse prima, & terza. Onde cauando il quadrato della media, cioè 36. dal quadrato del 6. semidiametro r s, cioè da 42. il restante 6. farà sempre il quadrato di r o, però essa r o, sarà la 8. di questo 6. cioè farà 12. perche se questo 12. si giunga al semidiametro r a 6. ne resulterà la parte maggiore a 9. ma se questo 12. si cauarà dal semidiametro r o 6. ne resulterà, ò resterà la parte minore a 9. Dal che si vede, che dato il composto delle due estreme, & la media di 3. quantità continue proporzionali, se dal quadrato della metà d'esso composto cauaremo il quadrato della media, & la 8. del restante si giunga, & caui alla metà del dato composto, li diui resulterà faranno le due estreme cercate. Et perche essendo il composto delle due estreme 23. & la media 6. si è peruenuto in qual si vogli delle superiori positioni ad 123. p. 36. eguale à 13. m. 12. nella quale Equatione il 36. numero accompagnato all'12. è sempre il quadrato di 6. media data, Et il 13. numero delle 2. che sono da se, è sempre il 13. composto delle due estreme, ò vogliamo dire composto delle due quantità, che distantemente si cercano, vediamo, che per trouare quella, che si è posta,

è posta, effere  $12$ , cioè per trouare il valore della  $x$ , conuiente dal quadrato di  $62$ , mità di  $12$ , numero delle  $x$ , canarne il  $36$ , numero della Equatione (che come s'è detto viene ad effere il quadrato della media) & del restante, hora  $62$ , pigliaroe la  $32$ , & essa  $32$ , che è hora  $22$ , giunta al  $62$ , mità del numero delle  $x$ , formerà vna quantità, ma cauata da detto  $62$ , formerà l'altra, Onde esse faranno hora  $62 \pm 32$ , &  $62 - 32$ , cioè  $9$ , &  $4$ . Et perche in queste positioni noi potiamo hauer supposto, che  $12$  sia la maggiore, & anco se ci farà piaciuto, potiamo hauer supposto, che nò la maggiore, ma la minore sia la  $12$ , & con qual si vogli di questi dui supposti si peruen sempre all'istessa Equatione d'  $12 \pm 36$ , eguale a  $12$ , noi vediamo perciò, che il valore della  $x$  può essere, & mostrare, & la parte maggiore, & la parte minore, cioè che la  $x$  può hauere due valute, vna maggiore, & allhora essa valuta mostra la parte, o quantità maggiore del  $12$ , & l'altra minore, & allhora essa valuta mostra la parte, o quantità minore del  $12$ , composto dato delle due estreme; Et così habbiamo trouato la regola dell'Equatione d'  $12$ , & numero eguale a  $2$ , effere la sopra detta, cioè. Quando  $12$ , & numero sono eguali a  $2$ , dal quadrato della mità del numero delle  $x$ , si caui il numero della Equatione, & la  $32$ , del restante si giunga, & caui alla mità del numero delle  $x$ , che ciascuno delli dui restanti farà il valore della  $x$ . Et anco habbiamo conosciuto la  $x$ , hauer sempre due valute, che sono li dui restanti, che nascono da giungere, & cauare dalla mità del numero delle  $x$ , la  $32$ , quadrà di quello, che resta à cauare il numero della Equatione, accompagnato all'  $12$ , dal quadrato della mità del numero delle  $x$ . Onde potiamo auuertire, che quando la  $32$ , di quello, che resta à cauare il numero della Equatione dal quadrato della mità del numero delle  $x$ , fusse niente; cioè, che il numero della Equatione fusse eguale al quadrato della mità del numero delle  $x$ , come auuertir se hauesimo  $12 \pm 36$  eguale a  $12$ , & che dal quadrato di  $6$ , mità del  $12$ , numero delle  $x$ , cioè da  $36$ , cauato il  $36$ , numero della Equatione accompagnato all'  $12$ , resta niente la  $32$ , del che è niente; allhora, perche alla mità del numero delle  $x$ , tanto resista à giungerli, quanto à cauare quell'istesso, poiche essi restanti sono l'istessa mità del numero delle  $x$ , ne segue, che quando questo auuenga, la  $x$ , hà vn solo valore, che è la istessa mità del numero delle  $x$ . Anzi potressi no pure anco dire, che ella hà due valute, che sono i dui restanti, giugnendo, & cauando nitate a  $6$ , & da  $6$ , mità di  $12$ , numero delle  $x$ , che fanno  $6 \pm 6$ , &  $6 - 6$ , cioè  $6$ , &  $6$ , ma che essi dui restanti sono eguali; Et perche essi mostrano le due parti del  $12$ , & le due quantità estreme delle  $3$ , contengono proporzionali; Egual- li anco verranno ad esserle le due parti del  $12$ , & le due quantità estreme, essendo ciascuna d'esse  $6$ , che dicendosi di  $3$ , quantità contengono proporzionali la media è  $6$ , & la somma delle due estreme è  $12$ . O vogliamo dire (che resulta l'istesso) di  $12$ , faccinsi due parti il duto delle quali sia  $36$ , (quadrato del  $6$ , media data) esse due parti, o quantità estreme faranno  $6$ , &  $6$ , & perciò le  $3$ , contengono proporzionali faranno  $6$ ,  $6$ ,  $6$ , perche esse fariano proporzionali nella proportion di egualità. Potiamo anco auuertire, che quando auuenisse, che il numero della Equatione, accompagnato all'  $12$ , non si potesse cauare dal quadrato della mità del numero delle  $x$ , allhora la Equatione saria impossibile, come saria per esempio, Se hauesimo  $12 \pm 49$ , eguale a  $12$ , & che il quadrato di  $6$ , mità di  $12$ , numero delle  $x$ , è  $36$ , dal quale non si può cauare  $49$ , numero della Equatione, che è con l'  $12$ . Et questa Equatione potria derinare da vna domanda, che dicesse, Di  $3$ , quantità continue proporzionali il quadrato della media è  $49$ , o la media è  $7$ , & la somma delle due estreme è  $12$ , si domanda ciascuna d'esse; Onero che resulta l'istesso, dicendo, Diuidasi  $12$ , in due parti tali, che il prodotto loro sia  $49$ , il che è impossibile, perche vna quantità non si può mai diuidere in due parti tali, che il prodotto d'esse parti ecceda, o sia maggiore del quadrato della mità d'essa quantità. Et lo conosceremo di qui. Se le due parti della quantità (che possono essere eguali fra loro, & ineguali) faranno eguali, allhora il duto loro, sarà quadrato, & è il quadrato di qual si vogli d'esse, cioè della mità della total quantità, di che esse sono parti eguali. Ma se esse due parti faranno ineguali, l'vna verà ad esser manco della mità della totale in qualche cosa, & l'altra sarà più della mità della quantità totale nel medesimo qualche cosa; Hor sia per commodità la totale quantità  $A B$   $18$ , diuisa nelle due parti ineguali  $A C$ , minore  $5$ , &  $C B$ , maggiore  $13$ , che della totale  $A B$ , essendo la sua mità  $A D$ , ouero  $D B$   $9$ , ciascuna delle due parti ineguali  $A C$ , minore, &  $C B$ , maggiore sarà differente dalla mità della totale nella  $C D$   $4$ . Noi vediamo, che il duto delle due parti eguali  $A D$   $9$ ,  $D B$   $9$ , fra loro è quanto il quadrato della mità  $A D$ , cioè quanto il duto di  $A D$   $9$ , nella istessa  $A D$   $9$ , ma diuisa essa  $A D$ , nelle due parti  $A C$   $5$ ,  $C D$   $4$ , sappiamo, che al duto di  $A D$   $9$ , in  $A D$   $9$ , è anco eguale la somma del duto della  $A D$ , intiera  $9$ , in ciascuna delle sue due parti  $A C$   $5$ , &  $C D$   $4$ , (che  $9$ , via  $9$ , si compone da  $9$ , via  $5$ , & da  $9$ , via  $4$ ;) ma di questi dui duti quello della intiera  $A D$   $9$ , via la parte  $C D$   $4$ , (che è quella parte, in che ciascuna delle due parti ineguali  $A C$   $5$ , &

CB 13, è differente dalla metà della AB 18, è eguale al dritto d'essa CD 4, nelle due parti AC 5, & CD 4, nelle quali è diuisa essa AD, (che 9, via 4, si compone da 3, via 4, & da 4, via 4.) per il che conosciamo, che il dritto di AD 9, in AD 9, (ò vogliamo dire di A D<sub>2</sub> in D B, cioè il quadrato della metà della totale data AB 18,) si compone da questi 3, dritti, che sono di AD 9, via AC 5, di AC 5, via CD 4, Et di CD 4, via CD 4. Ancora questo il dritto di AC 5, in CD 4, parti ineguali dette, considerata la CD 13, diuisa nelle due parti CD 4, DB 9, vediamo, che il dritto di AC 5, in CB 13, si compone dal dritto di AC 5, nelle due parti della CB, cioè dal dritto di AC 5, in CD 4, Et di AC 5, in DB 9, ma perche alla DB 9, metà della AB, totale 18, è eguale l'altra sua metà AD 9, noi in vece del dritto di AC 5, in DB 9, ponendo il dritto di AC 5, in AD 9, (poiche questi due dritti sono eguali, essendo ciascuna delle due quantità, che formano l'vno eguale a ciascuna delle due quantità, che formano l'altro) potremo dire, che il dritto, delle due parti ineguali AC 5, CB 13, si compone dalli due dritti di AC 5, via AD 9, & di AC 5, in CD 4. Ma delli medesimi dritti di AC 5, via AD 9, & di AC 5, in CD 4, Et anco di più dal dritto di CD 4, in CD 4, habbiamo veduto componersi il quadrato della metà di A B, però vediamo, che esso quadrato, qual contiene i tre dritti detti, è maggiore del prodotto delle due parti ineguali della medesima AB, che contiene solamente due d'essi prodotti. Anzi vediamo, di quanto egli è maggiore, conoscendoli, che egli contiene di più il dritto di CD 4, in CD 4, cioè il quadrato di CD, qual CD, è quella quantità, in che ciascuna delle due parti ineguali AC, CB, della data AB, è differente dalla metà d'essa data AB; Onde si può dire, che Quando vna quantità data sia diuisa in due parti ineguali, che allhora il prodotto delle due parti ineguali è sempre minore del quadrato della metà della quantità data, & in tanto, quanto importa il quadrato della quantità, in che ciascuna delle due parti ineguali è differente dalla metà della quantità data, ò vogliamo dire (& risulta l'istesso) quanto importa il quadrato della quantità, in che la minore delle due ineguali è minore della metà della totale data, ò in che la maggiore delle due ineguali è maggiore della metà della totale data.




Ma di più, perche vediamo, che dal quadrato della metà della quantità totale data a cavare il quadrato della quantità, in che le parti ineguali sono differenti dalla metà della data, resta sempre il dritto delle parti ineguali, & consequentemente, che cauto questo dritto delle parti ineguali dal quadrato della metà della data, resta il quadrato della quantità, in che ciascuna delle parti ineguali è differente dalla metà della data. Conosciamo, che douendosi diuidere vna quantità data, poniamo 16, ò Bz 80, in due parti, il prodotto delle quali sia 60, ò 30, cauando noi questo 60, ò 30, da 64, ò 20, quadrato di 8, ò di Bz 30, metà della data 16, ò Bz 80, che resterà 4, ò niente, questo 4, ò niente farà il quadrato della quantità, in che ciascuna delle due parti ineguali cercate è differente da 8, ò da Bz 30, metà della data; Onde la Bz, di 4, ò di niente, cioè, 2, ò niente sarà essa quantità mostrante la differenza detta; però gioggendola alla metà della data, se ne formerà la parte maggiore, & cauandola dalla metà della data, se ne formerà la parte minore, ò vogliamo dire, però gioggendola, & cauandola alla, & dalla metà della data, li due residui faranno le due parti cercate. Onde hora elle faranno 8 p 2, & 8 m 2, cioè 10, Et 6, ò Bz 30 p 0, Et Bz 30 m 0, cioè Bz 30, & Bz 30.

Sappia lo Studente che dicendosi, Di 3, quantità continue proportionali la media è 6, & la somma delle due estreme è 13, si domanda ciascuna d'esse, che è quanto a dire, Di 13, faccinsi due parti tali, che il dritto loro sia 36, noi non solo potiamo ponere, che l'vna d'esse parti sia 1, ò più, ò manco d'1, & l'altra dignità Algebrica; ma potiamo ponere, che l'vna sia la metà del 13, & 1, & di più; l'altra sia l'altra metà del 13, manco 1, che è il restante fino al 13, cioè ponere l'vna essere 6½ p 1, Et l'altra 6½ m 1, che il prodotto loro sarà 4½ m 1, & però douendosi essere eguale a 36, Onde accomodato il m 1, & leuato 36, da ciascuna banda, haueremo 1, & eguale a 6½, però il 1, valerà 6½, & la 1, che è Bz dell'1, valerà la Bz del 6½, valore del 1, cioè valerà 12, onde le due parti posse 6½ p 1, & 6½ m 1, faranno 6½ p 1, & 6½ m 1, cioè 9, & 4. Et così si sarà peruenuto ad Equatione semplice.

Et in

Et in linea a questa similitudine si può dire. Data la media di 3. rette continue proportionali, & la somma delle due estreme, si può trovare ciascuna d'esse. Et per farlo: Si canerà il quadrato della media dal quadrato della metà della somma delle due estreme, & la potente nel restante giunta, & cauata alla metà della somma delle due estreme, mostrerà nelli due risultanti le due estreme distinte. Cioè sopra alla mira A C, della A B, somma delle due estreme, come sopra al diametro si formi vn mezzo cerchio, & da vn termine A, del diametro si accòmodi nel mezzo cerchio la media data A D, & dal punto D, doue ella aerina alla circonferenza, all'altro termine C, del diametro si tiri la retta D C, (che questa D C, sarà la potente in quello, che resta al cauare il quadrato della media A D, dal quadrato della A C, metà della A B, somma delle due rette estreme) & dal termine C, dalla C B, si seghi la C P eguale alla C D, che allhora la A P, sarà la maggiore delle due quantità estreme, & la P B, sarà l'altera minore. Et ben si può conoscere, che il duto di P B, in P A, estreme è eguale al quadrato di A D, media; perche essendo di




uisa la A B, somma delle due estreme in due parti eguali in C. Et in due parti ineguali in P, ne segue (per quello, che di sopra s'è mostrato) che al duto delle parti eguali, che è quanto al quadrato della metà A C, sono eguali il duto delle parti ineguali P B, & A P, & il quadrato di C P, differenza che è dal-

la metà della A B, & ciascuna delle parti ineguali, cioè il duto di P B, in P A, con il quadrato di C B, & però in sua vece con il quadrato di C D, (ad esso quadrato di C P, eguale) sono eguali al quadrato di A C, ma al medesimo quadrato di A C sono eguali i due quadrati di A D, & di C D, che nel mezzo cerchio formano l'angolo retto D, però questi due quadrati di A D, & C D, sono ancora eguali al duto di P B, in P A, & al quadrato di C D. Onde da ciascuna banda leuato comunemente il quadrato di C D, resterà il solo quadrato di A D, eguale al duto di P B, in P A, perche la A D, è media proportionale fra A P, & P B, come si ricerca.

Si vede questo Problema, & questa operatione seruire similmente a diuidere vna data retta A B, in due parti tali, che il prodotto loro, o vogliamo dire, che il quadrangolo rettangolo da loro formato sia eguale ad vn rettilineo proposto, ma conuenie, che esso rettilineo non ecceda il quadrato della metà della data retta A B, perche quando lo eccedesse, allhora la potente in esso rettilineo, cioè il lato del quadrato eguale ad esso rettilineo, o al quale si riducesse (come conuenie ridurlo) esso rettilineo, & è qui figurato, o mostrato per la A D, verria ad essere maggiore della A C, diametro, & perciò non si potria accomodare in esso semicircolo, onde il quesito verria ad essere impossibile.

Ma in pratica essendo A B, la somma delle due estreme di tre continue proportionali, o la somma della lunghezza, & larghezza d'vn rettangolo eguale al quadrato di A D, cioè essendo



A D, la media, per trouare distintamente esse due estreme, o lunghezza, & larghezza da se, sopra a tutta la A B, faccisi vn mezzo cerchio, & preso vno squadra, o carta piegata ad angolo retto, in vno de' bracci dell'angolo, cominciando dall'angolo r, si segni la r n, eguale alla A D, & con l'altro braccio si vada sù per il diametro, finche il punto n, arriui precise alla circonferenza, che allhora il luogo del punto r, angolare sarà il punto della diuisione della A D, perche n r, & però A D, sarà media proportionale fra A r, & r D, come si domanda, il che si conosce benissimo, imaginando le due rette A n, & B n, che nel mezzo cerchio formano l'angolo A n B, retto, dal quale cade la n r, perpendicolare alla base A D, del triangolo rettangolo A n B, & perciò è media proportionale fra esse due parti A r, & r B, della base.



## ALTRE CONSIDERATIONI.

## Problema primo Algebrico.



**D**A TA la prima di tre quantità continue proportionali. & la somma de' dui quadrati della seconda, & terza, si vogliono trouare esse seconda, & terza. Sia la prima 9. & la somma de' quadrati della seconda, & terza sia 52. per trouare esse seconda, & terza. Poniamo la seconda essere 1. il suo quadrato è 1. quale partito per la prima 9. ne viene  $\frac{1}{9}$ . & questo douerà essere l'1. della terza. Il quadrato di questa terza è  $\frac{1}{81}$ . & il quadrato della seconda è 1. che giunti insieme fanno  $\frac{1}{81}$ . &  $\frac{1}{9}$  12. ma la somma d'essi dui quadrati è 52. però  $\frac{1}{81}$ . &  $\frac{1}{9}$  12. è eguale a 52. che ridotto ad 12. moltiplicando ciascuna parte per 81. hauere-  
mo 12. & 812. eguale a 4212. Et hora se sapessimo la regola di questa Equatione d'12. & 2. eguale a numero, potressimo trouare il valore della 2. & però la seconda quantità posta 12. ma non la sapendo, tentaremo altro modo. Sia perciò, che non la seconda, ma la terza quantità si possa essere 12. che così il duto d'essa terza 12. nella prima 9. farà 92. & questo è il quadrato della seconda (però essa seconda sarà 32. & 92.12.) quale con 12. quadrato della terza, fa 122. & 92. ma deue essere 52. però 122. & 92. è eguale a 2. Onde per trouare il valore della 2. in questa Equatione nota, giungeremo il numero 52. al 102. quadrato di 10. metà di 9. numero delle 2. & fa 72. la 32. del quale è 82. dal che cauato 42. metà di 9. numero delle 2. resta 4. per valore della 2. & quello 4. è la terza quantità posta 12. Onde moltiplicata con 9. prima, che fa 36. & di questo preso la 32. che è 6. questo 6. sarà la seconda.

Perche adunque il 9. numero delle 2. è sempre il 9. prima quantità data. Et il 52. numero della Equatione è sempre la somma de' quadrati della seconda, & terza, vediamo, che la regola nominale in questi quesiti potrà esser tale.

Al quadrato della metà della prima data si giunga la somma de' quadrati dell'altre due, & dalla 32. della somma si caui la metà della prima, che il restante sarà la terza, il quadrato della quale cauato dalla somma de' quadrati della seconda, & terza, resterà il quadrato della seconda, però la 32. d'esso restante sarà la seconda. Ouero questa terza si moltipichi via la prima, & del prodotto si pigli la 32. che ella sarà la seconda.

(Di qui si auuertisce, che poste 3. c. proportionali rationali, il quadrato della prima, il quadrato della seconda, & il quadrato della metà della terza, o vogliamo dire il quadrato d'vna delle estreme A, con il quadrato della media, & il quadrato della metà dell'altra estrema B, giunti insieme formano, o compongono vn numero quadrato, la 32. del quale è quanto la somma dell'A, prima, & della metà della B, però douendo trouare tre numeri quadrati, che giunti insieme facciano per somma numero quadrato, noi potremo postare dui a beneplacito alle 32. & 102. ro, trouare vn' antecedente, o consequente continuo proportionale, che il quadrato della metà d'esso con i dui quadrati presi, farà somma quadrata, la 32. della quale sarà la somma della metà detta dell'antecedente, o consequente trouato, & d'essa 32. dell'altro quadrato estremo delle due presi.)

Et volendo dare la regola lineale per sol-  
uere esso Problema, si potrà alla medesima  
similitudine dire.

Data la prima di tre linee rette continue proportionali, & la somma de' quadrati della seconda, & terza, o la potente in essa somma, si può trouare dette seconda, & terza. Regola.

Alla metà della prima data si accompagni ad angolo retto la potente nella somma de' quadrati dell'altre due, & dalla subtensa a quell'angolo retto si caui la metà della prima data, che il restante sarà la terza quantità. Poi sopra al congiunto della prima, & terza formato vn mezzo cerchio, & a detto congiunto dal termine comune della congiunzione se gli eleui vna perpendicolare, finche peruenga alla circonferenza, che essa perpendicolare sarà la seconda cercata. Ouero sopra alla potente ne' dui quadrati della seconda, & terza si formi vn mezzo cerchio, & dall'vn termine del diametro in esso mezzo cerchio si accomodi la terza trouata, & da doue ella arriva alla circonferenza all'altro termine del diametro si tiri vna retta, che ella sarà la seconda cercata.

Dimo.

**Dimostrazione.** Mi ecco la particolare dimostrazione Geometrica, che per breuità si dà sopra all'operatione esemplare posta in margine; La retta g e, è la prima data, & perche g d, è diametro del mezzo cerchio, & la h, perpendicolare ad esso è media fra le sue due parti g e, & d, si vede, che le tre rette g e, h, & d, sono continue proporzionali, resta hora à vedere, che la potente nel co nono de' dui quadrati della seconda, & h, & terza e d, cioè, che la imaginata h d, sia eguale alla d b, data, potente nella seconda, & terza, il che si cōgnoſce così.

Il quadrato di h e, è eguale al duto di g e, in e d, & però al duto di a e, mied

di g e & d, due volte, onde à ciascuna bnda giunto il quadrato di e d, & il quadrato di e a, habueremo il quadrato di h e, & il quadrato di e a, eguali al duto di a e, in e d, due volte, & alli dui quadrati di d e, & e a.

Ma delli tre quadrati da una banda, li dui di h e, & e d, sono eguali al solo quadrato di h d, & dall'altra banda il duto di a e, in e d, due volte con li dui quadrati di d e, & di e a, sono eguali al solo quadrato di a d, Onde li dui quadrati di d h, & a e, ma diciamo, & di a b, (perche a b, è eguale ad a e,) sono eguali al quadrato di a d, ma al medesimo quadrato di a d, sono anco eguali li dui quadrati di d b, & a b, onde li dui quadrati di d h, & a b, sono eguali alli dui quadrati di d b, & a b, perche da ciascuna banda leuato il comune quadrato di a b, resterà il solo quadrato di d h, eguale al solo quadrato di d b, & però la retta h d, farà eguale alla retta d b, cioè la h d, potente nelli dui quadrati di h e, seconda, & e d, terza delle tre rette continue proporzionali e g, e h, & d, è eguale alla d b, potete data come si ricerca.

Et che anco operado nell'altro modo per tronare la b si ella sia la seconda cercata, si cōnosce facilmente, perche hauendo già cōosciuto la d e, essere la terza, & però la d f, à questa d e, fatta eguale, Et anco la d b, essere eguale alla d h, considerati li dui triangoli rettangoli h e d, dalla costruzione, & b f d, per esser formato nel mezzo cerchio, essendo vn lato d e, dell'vno eguale ad vn lato d f, dell'altro, & la subtensa d h, dell'vno eguale alla subtensa d b, dell'altro, ancora al restante lato e h, dell'vno farà eguale il restate lato e f, dell'altro, però così come e h, è media proporzionale fra a e, & e d, così anco vi farà media la b.

### Corollario.

**D**A 112. cose dette si manifesta, che di tre quantità continue proporzionali, il composto della prima, & terza, la potente nelli dui quadrati della seconda, & terza, & la terza sono altre tre quantità continue proporzionali. Cioe, che la potente nelli dui quadrati della seconda,

C

&amp; terza,

& terza, di tre quantità continue proporzionali & media proportionale fra la terza, & la somma della prima, & terza.

Perchè essendo  $g, e, \& h$  d. tre quantità continue proporzionali, & la  $d, h$ , la potente nella somma de' dui quadrati di  $e, h$ , seconda, &  $e, d$ , terza, vediamo essa  $d, h$ , essere media fra la totale  $g, d$ , (composto della prima, & terza) & la parte  $e, d$ , che è la terza (che considero il triangolo  $d, h, g$ , rettangolo, per esser fatto l'angolo  $h$ , nel mezzo cerchio, dal quale angolo retto  $h$ , al lato opposto, è diametro  $g, d$ , e ad  $e, h$ , perpendicolare, ella viene a dividere il totale triangolo  $d, h, e$ , in dui triangoli simili fra loro, & al totale, però ciascun lato  $h, d, h, g$ , è medio proportionale fra la base totale  $d, g$ , & la parte  $d, e$  conterminale  $d, e, g, e$ .)

Se hora habendo trouare la seconda, & terza delle tre quantità continue proporzionali, essendo data la prima, & la somma de' quadrati della seconda, & terza, mediante il Capitolo, o Equatione d'  $1 \times p \times 9$ , eguale al numero  $52$ , al quale si peruiene, ponendo la terza essere  $1$ , vorremo anco andare ritrovando la regola del Capitolo, o Equatione d'  $1 \times p \times 81$ , eguale al numero  $4212$ , al quale si peruiene ponendo la seconda essere  $1$ , potremo considerare, che nell' Equatione d'  $1 \times p \times 9$ , eguale a  $52$ , il  $9$ , numero delle  $2$ , è sempre la prima di tre quantità continue proporzionali, & il numero  $52$ , è sempre la somma del quadrato della seconda, & del quadrato della terza d'esse tre quantità, & seguendo la Equatione, il valore della  $2$ , è poi sempre la terza quantità, quale moltiplicata via la prima, & del prodotto presa la  $32$ , essa  $32$ , è sempre la seconda; Cioè: Qual valore della  $2$ , (o terza quantità) moltiplicato per il numero delle  $2$ , della Equatione (o prima quantità) & del prodotto presa la  $32$ , essa  $32$  è sempre il valore della  $2$ , (o seconda quantità) quando si pone la seconda quantità (& non la terza) essere  $1$ .

Ma quando si pone la seconda essere  $1$ , si peruiene ad  $1 \times p \times 81$ , eguale a  $4212$ , nella quale Equatione è necessario dunque, che la  $2$ , venghi la  $32$ , del duto di  $9$ , prima (o numero delle  $2$ , nella Equatione nota) nel valore della  $2$ , che si troua in esso Capitolo, o Equatione nota d'  $1 \times p \times 9$ , eguale a  $52$ . Et nell' Equatione d'  $1 \times p \times 81$ , eguale a  $4212$ , vediamo, che l'  $81$ , numero de'  $2$ , è sempre il quadrato di  $9$ , prima quantità data, & però è il quadrato di  $9$ , numero delle  $2$ , nell' Equatione nota; Et il  $4212$ , numero è sempre il duto d'esso  $81$ , via  $52$ , numero dell' Equatione nota: onde vediamo, che se nell' Equatione d'  $1 \times p \times 81$ , eguale a  $4212$ , faremo che l'  $1$ , doueti  $1 \times 2$ , & che dell'  $81$ , numero della  $2$ , si pigli la  $32$ , che è  $9$ , & siano  $8$ , da accompagnare all'  $1 \times 2$ , formando  $1 \times p \times 9$ , & che il numero  $4212$ , si parta per l'  $81$ , numero della  $2$ , & l'auuenimento  $52$ , sia per numero, al quale si agguagli l'  $1 \times p \times 9$ , trouate allhora mediante questa Equatione, che ha regola nota per trouare il valore della  $2$ , noi potremo poi anco trouare il valore della  $2$ , nella prima Equatione d'  $1 \times p \times 81$ , eguale a  $4212$ , & si farà moltiplicando il valore della  $2$ , del Capitolo noto per  $9$ , numero delle  $2$ , in esso, o vogliamo dire per la  $32$ , del numero de'  $2$ , nella Equatione prima, & del prodotto pigliando la  $32$ , che essa baserà il valore della  $2$ , nella prima Equatione. Si potrà dunque dare la regola al Capitolo, o Equatione d'  $1 \times p \times 2$ , eguale a numero mediante essa trasmutazione dicendo.

Quando  $1 \times 2$ , &  $2$ , sono eguali a numero, allhora il numero si parta per il numero de'  $2$ , & l'auuenimento, che è numero si agguagli ad  $1 \times p$ , tante  $2$ , quante la  $32$ , del numero de'  $2$ , & trouato il valore della  $2$ , ella si moltiplichi per il numero delle  $2$ , & del numero de'  $2$ , & del prodotto si pigli la  $32$ , che ella sarà il valore della  $2$ , nella Equatione d'  $1 \times p \times 2$ , eguale a numero.

Et se non vorremo trattare di Trasmutazione, potremo, intendendouela, occultamente dire. Partasi il numero per il numero de'  $2$ , & l'auuenimento si giunga al quadrato della metà della  $32$ , del numero de'  $2$ , & della somma si pigli la  $32$ , dalla quale si causerà metà della  $32$ , del numero de'  $2$ , & il restante si moltiplichi via la  $32$ , del numero de'  $2$ , & del prodotto si pigli la  $32$ , che essa sarà il valore della  $2$ .

Questa istessa regola si può anco derivare dalla operatione Geometrica: Et così, poichè l' operatione Geometrica ha la dimostrazione Geometrica, & non senza mostrauela, ella dipende dall' Algebra, habendo mollrato, & dimostrato esso Problema, ne potremo derivare la regola dell' Equatione d'  $1 \times p \times 2$ , eguale a numero. Et così parerà, che questa regola derivi dalla semplice Geometria, l' che tutto si dice per fare accorto lo studente.

Di tre quantità continue proporzionali essendo la prima  $9$ , & la somma de' quadrati della seconda, & terza  $52$ , si domanda ciascuna d'esse. Ponendo la seconda essere  $1$ , si peruerà all' Equatione d'  $1 \times p \times 81$ , eguale a  $4212$ , nella quale  $81$ , numero de'  $2$ , è il quadrato di  $9$ , prima data, & il numero  $4212$ , è il duto di  $81$ , via  $52$ , somma de' due quadrati dati. Noi dunque, perchè nella operatione Geometrica vediamo, che la retta  $2, d, e$ , metà del  $9$ , prima data, & il suo quadrato giunto al quadrato di  $32, b, d$ , potere nella somma de' dui quadrati della

il qua-

il quadrato di  $4\frac{1}{2}$  giunto al  $52$ . fa il quadrato di  $a$ , & che perciò  $a$ , è la potente in essi quadrati, cioè, che essa  $a$  è  $8\frac{1}{2}$ . è la  $32$ . della somma della due quadrati detti, & del quadrato della metà della prima data, dalla quale  $a$  è  $8\frac{1}{2}$ . cavando essa metà della prima, resta la terza  $e$ , & che al dutto d'essa terza nella prima è eguale il quadrato di  $e$ , cioè, che  $e$  è  $6$ . è la  $32$ . del dutto d'essa terza nella prima, quale  $e$  è la seconda. (ò vogliamo dire, Et che cavato il quadrato di essa terza d'  $52$ . dal  $52$ . la  $32$ . del restante è il quadrato di  $b$ , cioè, che  $b$  è  $6$ . è la  $32$ . di quello, che resta al cavare il quadrato della terza d'  $52$ . ouero d'  $e$ , dal  $52$ . quale  $b$  è la seconda) & però il valore della  $e$ . nella nostra Equatione, perciò riducendo quella operatione lineale a numeri, cioè al dare la regola di trouare il valore della  $e$ . in questo Capitolo d'  $14$ . &  $x$ . eguale a numero, potremmo dire.

Al quadrato della metà del numero della  $32$ . de'  $x$ . (cioè hora al quadrato di  $4\frac{1}{2}$ . metà di  $9$   $32$ . d'  $81$ . si piglia il numero  $(52)$ . che nasce a partire il numero della Equatione  $(4212)$ . per il numero de'  $x$ .  $(81)$ . & della somma  $(72\frac{1}{2})$  si piglia la  $32$ . (che è  $8\frac{1}{2}$ . & da essa si cavi la metà della  $32$ . del numero de'  $x$ . (cioè hora il  $4\frac{1}{2}$ .) & il restante (hora  $4$ .) si moltiplichi con la  $32$ . del numero de'  $x$ . (cioè hora con  $9$ .) & del prodotto  $(36)$ . si piglia la  $32$ . (che è  $6$ .) (Ouero, Et il quadrato del  $(4)$ . restante si cavi dal  $(52)$ . numero, che nasce a partire il numero dell' Equatione  $(4212)$ . per il numero de'  $x$ .  $(81)$ . & di quello  $(36)$ . che resta si piglia la  $32$ . (che è  $6$ .) che questa  $32$ . (cioè che questo  $6$ .) sarà il valore della  $e$ .

### Corollario.

**Q** V A N D O faranno tre quantità continue proporzionali, il quadrato della metà della prima, con i quadrati della seconda, & terza compongono il quadrato della somma della terza, & metà della prima. Questo è chiaro, vedendo, che  $a$  b. è la metà della prima b d. e la potente nella somma de' quadrati della seconda, & terza, Et a d. il quadrato della quale è eguale alli detti, & il composto della metà della prima, & della terza.

Esempio della regola del Capitolo d'  $14$ . &  $x$ . eguale a numero.

Sia  $1 \times 8 \times 20$  eguale a  $140$   
 $32 \times 20 = 7$

la metà è  $32$  5. il suo quadrato è 7  
 con 5  
 fa 12

la  $32$ . è  $32$  12. cavatone la  $32$  5. resta  
 $32$  7. in  $32$  5. questo moltiplicato via  
 la  $32$  10. fa  $32$  240 in 10 la  $32$ . del che  
 è  $32$  1  $32$  240 in 10. che è il valore  
 della  $e$ .

$32$  240 in 10. vale il  $x$ .  
 via 10

$32$  96000 in 100. sono li 20  $x$ .  
 $340$  in  $32$  96000. è l'  $14$ .

Summa 140. come bisogna.

$1 \times 8 \times 20$  eguale a  $4212$ .

$1 \times 8 \times 20$  eguale a  $52$ .

$4\frac{1}{2}$ . via  $4\frac{1}{2}$ . fa  
 $20\frac{1}{2}$ . H.

si giunge 52

Summa  $72\frac{1}{2}$ . la  $32$ . è  $8\frac{1}{2}$ .

si cavi  $4\frac{1}{2}$ .

resta 4

via 9

fa 36. la  $32$ . è

6. per il valore della  $e$ .

Quel 9. numero delle  $e$ . è la  $32$ . dell'  $81$ . numero delle  $e$ . nell'altra,

Si trasmuta in  $1 \times 8 \times 20$  eguale a 7

$32$  5. in se stesso  
 fa 5. giuntoli il 7. fa 12. la sua  $32$ . è  
 $32$  12. cavatone la  $32$  5. resta  $32$  7 in  
 $32$  5. che è il valore della  $e$ . il suo quadrato è 17 in  $32$  240. che è valore del  
 $x$ . quello con  $32$  240 in 10. valore di  
 $32$  20  $e$ . fa 7. come bisogna, però è vero, che nell' Equatione d'  $1 \times 8 \times 20$   $e$ .  
 eguale a 7. la  $e$ . vale  $32$  2 in  $32$  5.

Equatione inferiore viene ad essere valore del  $x$ . nella Equatione superiore, si può vedere, che questo modo di operare, & il trouato nell' altro modo risultano l' istesso.

$1 \times 8 \times 20$  eguale a  $4212$ .

$1 \times 8 \times 20$  eguale a  $52$ .

$40\frac{1}{2}$ . via  $40\frac{1}{2}$ . fa

$1640\frac{1}{2}$

$4212$

Summa  $5852\frac{1}{2}$ . la  $32$ . è  $76\frac{1}{2}$

$23409$  si cavi  $40\frac{1}{2}$

$153$  resta 36. la

$32$ . è 6. per il

valor della  $e$ .

Et perche per altri discorsi si conoscerà, che la regola del Capitolo, ò Equatione d'  $1 \times 8 \times 20$  eguale a  $4212$ . è come se hauesimo  $1 \times 8 \times 20$  eguale a  $4212$ . ma ne risulta il valore di  $e$ . cioè quello, che si troua essere valore della  $e$ . nella

Notifi, che il  $20\frac{1}{2}$ . segnato H. è sempre l'  $1$ . dell'  $81$ . numero de'  $x$ . perche il quadrato della metà della  $32$ . d' vn numero è sempre il quarto d' esso num. cioè, perche  $4\frac{1}{2}$ . è la metà di 9. ne segue, che il quadrato di  $4\frac{1}{2}$ . che è  $20\frac{1}{2}$ . sia l'  $1$ . del quadrato di 9. che è l'  $81$ . Però anco si può dare la regola dicendo: Partasi il numero dell' Equatione per il

Et il 5. numero dell'Equatione qui è l'8. del 411. numero dell'Equatione nell'altra. Onde il 4. farà  $1\frac{1}{2}$  del 40. & perciò il quadrato del  $4\frac{1}{2}$  cioè 20. farà  $1\frac{1}{2}$  del quadrato di 40. cioè del 160. per il che al 20. giuto 92. che è l'8. similmente del 411. che si giuto al 160. la somma 72. farà medefinamente l'8. della somma 58. che è 76. Er anco, perche  $4\frac{1}{2}$  che si caua, dell'8. è similmente l'8. del 40. che si caua dal 76. (poiche tutto il 9. doppio al  $4\frac{1}{2}$ . è l'8. di tutto l'8. doppio al 40.) però il restante 4. farà  $1\frac{1}{2}$  medefinamente del restante 36. Onde il restante 4. moltiplicandolo per 9. denominatore dell'8. qual 9. è il numero delle x. qui è la 36. dell'81. numero delle x. nell'altra Equatione, vediamo che il prodotto 36. farà l'istesso 36. che è restante nell'altra Equatione, però la 36. di questo 36. qui è l'istesso 6. che è 36. del 36. li. ma, & qui, & li quello 6. è il valore della x. però conosciamo, che nell'un modo, & nell'altro il valore della x. è sempre l'istesso, cioè tanto resulta l'operare in l'un modo, quanto nell'altro, & questo auuene per causa della conuenienza veduta si a essi dui modi di operare.

per il numero de' x. & all'auuenimento si giungo l'8. del numero de' x. dalla 36. del la somma si caui la metà della 36. del numero de' x. (o vogliamo dire si caui la 36. dell'8. del numero de' x. che resulta l'istesso) & il restante si moltiplichi via la 36. del numero de' x. & del prodotto si pigli la 36. che ella sarà il valore della x.

Si habbi 1 x 30 neg. a 140  

$$\begin{array}{r} 140 \\ 30 \\ \hline 7 \\ \hline 140 \end{array}$$
  
 giogafsi 5. l'8. di n. de' x.  
 somma 12. la 36. è 36. 12  
 cauafe 36. 5. che è la 36. di 5. quarta parte del numero de' x. & resta 36. 12 m 36. 5.  
 via 36. 20. che è la 36. del num. de' x.  
 prodotto 36. 140 m 10. che la sua 36. è  
 36. 136 m 10 x. quale è il valore della x.

### Problema secondo Algebratico.



T dicendosi. Di tre quantità continue proportionali la media è 36. & la differenza de' quadrati delle due estreme è 64. si vogliono trouare esse due estreme. Potendo la minore essere 1. il suo quad. è 1. & che giuto li 64. differenza d'esso quad. al quad. della maggiore fa 1 + 64. & questo faria il quad. della maggiore, però ella faria 36. 1 + 64. il che dutto 1. 12. cioè in 36. 1. & l'altra estrema, fa 36. 1 + 64. il che è eguale al quad. della media, cioè al quad. di 36. qual quadrato è 60. Onde quadrando le parti per leuare la 36. l. haueremo 1 + 64. x. eguale a 3600. perche operando con la regola trouata, vedremo che in questa Equatione la x. vale 6. però 6. è la minor quantità delle due estreme polla 1. Onde la maggiore faria la 36. del còposto del quadrato d'essa 6. con il 64. differenza data, cioè farà la 36. di 100. che è 10.

Et se ponesimo la maggiore delle due quantità estreme essere 1. il suo quadrato è 1. che cauare il 64. dato differenza de' quadrati delle due estreme, resta 1 + 64. che faria il quadrato della minore, però essa minore faria la 36. di detto restante, cioè faria 36. 1 + 64. quale moltiplicata via l'altra estrema 1. o 36. 1. fa 36. 1 + 64. x. per il quadrato della media, ma essa media è 36. & il suo quadrato è 60. però a questo 60. faria eguale 36. 1 + 64. x. l. Onde quadrando le parti, per leuare la 36. l. haueremo 1 + 64. x. eguale a 3600. cioè 1 + 64. x. eguale a 3600. Ma noi non lappiamo la regola di questa Equatione d'1. x. eguale a 2. & numero; però, ci ingegnaremo d'andarla trouando, Perilche considerando, che qui il valore della x. ha da essere la maggiore delle tre quantità continue proportionali, Et che nell'Equatione d'1. x. 64. l. eguale a 3600. il valore della x. è la minore d'esse tre quantità continue proportionali; & vedendo noi, che così nella Equatione d'1. x. 64. l. eguale a 3600. come nella Equatione d'1. x. eguale a 64. l. 3600. Il 3600. numero della Equatione è sempre l'istesso, & è il quadrato del quadrato della media 36. & il 64. numero de' x. è sempre l'istesso, & è il 64. differenza de' quadrati delle due estreme quantità 6. & 10. Conosciamo, che trouata la minor quantità con la Equatione d'1. x. 64. l. eguale a 3600. qual minor quantità è il 6. se al quadrato di questo 6. cioè a 36. giungeremo 64. differenza de' quadrati della minore, & maggiore, cioè se al 36. quadrato di quello 6. (valore della x. nell'Equatione d'1. x. 64. l. eguale a 3600.) giungeremo il 64. numero de' x. la somma 100. farà il quadrato della maggiore quantità, & perciò presa la 36. di questa somma 100. qual 36. è 10. esso 10. farà la maggiore, & conseguentemente farà il valore della x. nella Equatione d'1. x. eguale a 64. x. 3600. Potremo dunque dire, Quando 1. x. è eguale a 2. & numero, fingasi che li x. siano con l'1. x. hauendo 1. x. & 64. eguale a numero, & in questa noua Equatione si troui il valore della x. al quadrato della quale si giunga al numero de' x. & della somma si pigli la 36. che ella 36. farà il valore della x. nella nostra

Equa.



medefmi dui quadrati è eguale il quadrato ſia  $x$ , dia metro (ſonima delle due quaſità eſtreme) che è oppoſto all'angolo retto, formato nel mezo cerchin dalle due rette  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , però il quadrato di  $a$ , farà 169, onde eſſa  $a$ , farà la  $Bz$ , di 169, cioè 13, & queſto è la ſonima delle due eſtreme, Perilche vediamo, che, Dato la media, & la ſonima de' quadrati delle due eſtreme, ſe ad eſſa ſonima ſi giunga il doppio del quadrato della media, & del compoſto ſi pigli la  $Bz$ , che ella farà la ſonima delle due eſtreme, quale hora farà 13, perilche ci ridurreſſimo ad vn'altro queſito, ehe dicceſſe. Di tre quantità continue proporzionali la media è 6, & la ſonima delle due eſtreme è 13, ſi domanda ciaſcuna d'eſſe. Ma ſtando pure nel queſito come ſu dato, cioè la media è 6, & la ſonima de' quadrati delle due eſtreme è 97, per trouare ciaſcuna d'eſſe. Poſto il quadrato della prima  $x$ , & però il quadrato della terza  $z$ , eſſe faranno  $x$  &  $z$ , 97 ſi  $x$  &  $z$ , perilche la ſonima loro farà  $x$  &  $z$ , 97 ſi  $x$  &  $z$ , ma per la cōſideratione  $A$ , fatta di ſopra al 97, ſonima data de' quadrati delle eſtreme, giointo il doppio del quadrato della media, cioè 72, & ſà 169, la  $Bz$ , di queſto 169, cioè 13, è di neceſſità la ſonima d'eſſe due eſtreme, però à queſto 13, farà eguale  $x$  &  $z$ , 97 ſi  $x$  &  $z$ . Onde per commodità laſſando la  $Bz$ , da ſe, haueremo 13 ſi  $x$ , eguale à  $z$ , 97 ſi  $x$  &  $z$ . Et quadrando le parti ſi hauerà 169 ſi  $x$  &  $z$ , 97 ſi  $x$  &  $z$ , eguale à 97 ſi  $x$  &  $z$ . Cioè 13 ſi  $x$ , eguale à 97 ſi  $x$  &  $z$ . Cioè riducendo ad 1  $x$ , ſi hauerà  $x$  &  $z$ , 97, eguale à 13  $x$ , che è Equatione nota (nella quale il 13, numero delle  $x$ , è ſempre il 13, ſonima delle due eſtreme, cioè la  $Bz$ , del compoſto della ſonima data de' quadrati delle eſtreme cō il doppio del quadrato della media, Et il 36, numero della Equatione è ſempre il 36, quadrato della media) nella quale di 43  $\frac{1}{2}$ , quadrato di 6  $\frac{1}{2}$ , mità di 13, numero delle  $x$ , cauato 36, numero della Equatione, & del reſtante 6  $\frac{1}{2}$ , preſa la  $Bz$ , che è 13, queſto 2  $\frac{1}{2}$ , giointo, & cauato à 6  $\frac{1}{2}$ , mità del numero delle  $x$ , ciaſcuno de' dui reſultanti 9, & 4, è il valore della  $x$ . Et anco ſono le due quantità eſtreme cercate, perche hauendo poſto il quadrato della prima eſſere 1  $x$ , & però la ſua  $Bz$ , che è 13, farà eſſa prima, cioè il valore della  $x$ , moſtrará eſſa prima, ma lau, vale 9, & anco può ualere 4, però 9, ouero 4, farà la prima, onde 81, ouero 16, (valore del  $x$ ) farà il quadrato della prima, & il ſeſto ſino à 97, cioè 16, ouero 81, farà il quadrato della terza, & però ella, farà 4, ouero 9, Cioè quando la prima ſi dica eſſere 9, eſſendo la maggiore delle eſtreme, allhora la terza, cioè la minore farà 4, ma quando ſi dica la prima eſſere la minore, ella farà 4, & allhora la terza, ò maggiore farà 9. Hauendo dunque trouato il valore della  $x$ , ò le quantità eſtreme, mediante l'Equatione d'1  $x$  &  $z$ , 97, eguale à 13  $x$ . Et douendoli anco trouare liſteſſo, mediante l'Equatione d'1  $x$  &  $z$ , 97, eguale à 97  $x$ , cioè douendo queſte due Equationi hauere le iſteſſe due valute della  $x$ , cōſiderando come da quella baſſa ſi poſſa deriuare la regola à queſta'altra, & perciò cercando la conuenienza, che hāno fra loro queſte due Equationi, vedremo che nella baſſa il numero della Equatione è ſempre la  $Bz$ , del numero della Equatione nella ſuperiore d'1  $x$ , & c. (Et di più vediamo, che eſſo numero della Equatione nella baſſa è ſempre il quadrato della media data) Et il numero delle  $x$ , nell'Equatione baſſa è ſempre la  $Bz$ , del compoſto del 97, numero de'  $x$ , nell'Equatione ſuperiore con il doppio del numero dell'Equatione baſſa, ò vogliamo dire con il doppio della  $Bz$ , del numero della Equatione ſuperiore (che è quanto à dire la  $Bz$ , del compoſto del doppio del quadrato della media con la ſonima de' quadrati delle due eſtreme) perilche di qui potremo deriuare la regola all'Equatione d'1  $x$ , & numero eguale à  $x$ , dicendo.

Quando 1  $x$ , & numero ſono eguali à  $x$ , al numero de'  $x$ , ſi giunga il doppio della  $Bz$ , del numero dell'Equatione, & della ſonima ſi pigli la  $Bz$ , che ella farà  $a$ , alle quali faranno ſempre eguali 1  $x$ , ( $Bz$ , dell'1  $x$ ) & il numero, che è  $Bz$ , del numero nella noſtra Equatione. Dipoi in queſta Equatione di  $x$ , eguali ad 1  $x$ , & numero ſi troui il valore della  $x$ , che ella farà anco il valore della  $x$ , nella noſtra Equatione.

Et ſe non vogliamo nominare queſta traſmutatione della noſtra Equatione nell'altra à lei eguale di 1  $x$ , & numero eguale à  $x$ , potremo ſemplicemente dire.

Quando 1  $x$ , & numero ſono eguali à  $x$ , al doppio della  $Bz$ , del numero dell'Equatione ſi giunga il numero de'  $x$ , & della ſonima ſi pigli la  $Bz$ , & dal quadrato della mità d'eſſa  $Bz$ , (qual mità ſi chiami  $A$ ) ſi caui la  $Bz$ , del numero dell'Equatione, & la  $Bz$ , del reſtante ſi giunga, & caui alla, & dalla mità detta  $A$ , che ciaſcuno de' dui reſultanti potrà eſſere il valore della  $x$ .

Eſſendo dunque nel noſtro queſito peruenuti ad 1  $x$  &  $z$ , 97, eguale à 97  $x$ , per trouare il valore della  $x$ . Preſa la  $Bz$ , del numero 1296, che è 36, al tuo doppio 72, giungeremo 97, numero de'  $x$ , & ſà 169, & di queſta pigliaremo la  $Bz$ , che è 13, & di queſto la mità  $A$ , è 6  $\frac{1}{2}$ , dal quadrato della quale 43  $\frac{1}{2}$ , cauaremo 36  $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione, & reſta 6  $\frac{1}{2}$ , del quale ſi piglia la  $Bz$ , & è 13, queſto ſi giunga, & cauato alla mità detta  $A$ , & ne reſultano 9, & 4, ciaſcuno de' quali reſulta in può eſſere il valore della  $x$ , & nel vna delle quantità eſtreme, che ſi poſſa 1  $x$ .

ſarà 9.

farà 9, ouero 4. & perciò il suo quadrato farà 81. ouero 16. che cauto da 97. somma data de' quadrati delle estreme, resta 16. ouero 81. per il quadrato dell'altra estrema, petilche ella sarà la 9. di 15. ouero di 81. cioè 4. ouero 9. & così haueremo trouato, che quando la prima sia 9. la terza farà 4. (essendo la media 6.) ma se 4. fusse la prima, il 9. sarà la terza.

Se di qui vorremo estrarre la regola generale, potremo dire. Data la media di tre quantità continue proportionali, & la somma delli quadrati delle due estreme per trouare ciascuna d'esse due estreme. Al doppio del quadrato della media si giunga la somma de' quadrati delle due estreme, & della somma si pigli la 3a. dal quadrato della mira, della quale (& essa mita si chiami A.) si caui il quadrato della media, & la 3a. del restante si giunga, & caui alla mita detta A. che li dui risultanti faranno le due quantità estreme cercate.

Hor sia, che in vn' Equatione d'1. & numero eguale a 2. la z. si vogli, che vaghi 7. & per formarne l'Equatione, sappiamo che 1. & farà 2401. & il 2. valerà 49. & siano essi 2. poniamo 62. che importano 3038. cioè 637. di più dell'1. & onde haueremo 1 & 637. eguale a 622. Per trouare il valore della z. mediante la regola data, diremo. la 3a. del numero 637. è 37. il suo doppio è 74. giuntoli 62. numero de' 2. fa 62 & 37. 2548. che la 3a. è 7 & 37. 13. (& questo sarà z. facendosi la trasmutazione, quali sariano eguali ad 1 & 637. essendo la 3a. 637. la 3a. del numero 637. accompagnato all'1. cioè si haucria 1 & 637. 637. eguale a 7 & 37. 13. il quadrato della mira di questo 7 & 37. 13. (cioè 12. del quadrato di questo 7 & 37. 13. cioè 12. del 62 & 37. 2548. somma trouata del numero de' 2. con il doppio della m. del numero dell'Equatione) è 152. & 37. 13. da questo si caui 62 & 37. che è la 3a. del numero della Equatione (che per ciò è sempre doppia alla 3a. 152. & 37. 13.) & resta 152. & 37. 13. del che presa la 3a. ella è 7 & 37. 13. quale si giunge, & caui ad A. 37. & 37. 13. che è mita del 7 & 37. 13. di sopra trouato, & merelutatio 7. & 37. 13. ciascuno de' quali 7. & 37. 13. è il valore della z. Onde conosciamo di più, che non solo il 7. supposto vale la z. nell'Equatione d'1. & numero eguale a 2. formata, ma che anche, vale 13. & così 1. & valerà 19. che con il numero 637. fa 866. & 12. valerà 13. & però 62 & 37. valeranno ancor essi l'istesso 806.

Ma dal vedere, che del 62 & 37. 2548. pigliando la 3a. & poi quadrare la mita d'essa 3a. ne risulta sempre l'12. del medesimo 62 & 37. 2548. noi nel dare la regola potiamo dire.

Quando 1. & numero sono eguali a 2. al doppio d.lla 3a. del numero dell'Equatione si giunga il numero de' 2. & dall'12. della somma si caui la 3a. del numero dell'Equatione. Ma tutto questo, cioè giungere il doppio di 3a. 637. a 62. & della somma 62 & 37. 2548. pigliare l'12. che è 152. & 37. 13. cioè è l'12. del 62. & la mita della 3a. 637. & di questo 152. & 37. 13. cauare la 3a. 637. resterà il 152. (che è l'12. del 62.) manco 37. & 37. 13. che è l'altra mita della 3a. 637. Onde tutto questo è quanto a dire, Dal l'12. del numero de' 2. si caui la mita della 3a. dell'12. del numero dell'Equatione, o vogliamo dire, Dal l'12. del numero de' 2. si caui la 3a. dell'12. del numero dell'Equatione, & del restante si pigli la 3a. & quella 3a. si giunga, & caui alla mita della 3a. della somma, che nasce a giungere al numero de' 2. il doppio della 3a. del numero dell'Equatione, che i dui risultanti faranno le due valute della z. che in questa Equatione occorrono.

Sia ancora, che la z. vaghi 3. che così 1. & valerà 61. il 2. valerà 9. & siano poniamo li 2. che importano 108. cioè 27. di più dell'1. & onde haueremo 1 & 27. eguale a 122. la 3a. del numero 27. è 27. il suo doppio è 54. giuntoli 12. numero de' 2. fa 12 & 27. 108. che la sua 3a. è 3 & 27. 3. (& questo sarà z. facendosi la trasmutazione, quali sariano eguali ad 1 & 27. essendo la 3a. 27. la 3a. del numero 27. accompagnato all'1. & cioè si haucria 1 & 27. 27. eguale a 3 & 27. 3.) Il quadrato della mira di questo 3 & 27. 3. (cioè 12. del quadrato di questo 3 & 27. 3. cioè 12.

1 & 637. eguale a 622  
 37  
 62  
 62 & 37 2548  
 3844  
 2548  
 1296  
 36  
 12. con 31. & da 31  
 9. & 13  
 7 & 37. 13. è la 3a. del binomio  
 (7 & 37. 13.) eguale ad 1 & 637  
 A. 37 & 37. 13. il suo quadrato è  
 152 & 37. 13  
 si caui 37. 637. num. della Equatione.  
 resta 152 & 37. 13. da pigliarne la 3a. & perche egli è il residuo del binomio 152 & 37. 13. la sua 3a. sarà ancora il residuo di 37 & 37. 13. che è 3a. del binomio, cioè la 3a. dettata del residuo 152 & 37. 13. sarà 37 & 37. 13. & perche questo 37 & 37. 13. (3a. detta cercata) si giunge & caui a 37 & 37. 13. che è il suo binomio (& è sempre la mita del nu. delle 7 & 37. 13.) la somma sarà 7. doppio del 37. (che il sommatore 37. con 37. 13. la somma è  
 niente.

niente, annullandosi esse due  $\frac{1}{2}$ , per essere l'vna  $\frac{1}{2}$ , & l'altra  $\frac{1}{2}$ , & il restante sarà  $\frac{1}{2}$  3, doppio della  $\frac{1}{2}$  1 $\frac{1}{2}$ , (che li diui 3 $\frac{1}{2}$ , si annullano, cauando l'vno dell'altro, & a cauare  $\frac{1}{2}$  3 $\frac{1}{2}$ , da  $\frac{1}{2}$  3 $\frac{1}{2}$ , si giunge il  $\frac{1}{2}$ , al  $\frac{1}{2}$ , & però ne risulta il doppio d'essa  $\frac{1}{2}$  3 $\frac{1}{2}$ ,) onde questi dui risultanti cioè la somma, & restante detti 7, &  $\frac{1}{2}$  13, vengono sempre ad essere i dui nomi del binomio 7  $\frac{1}{2}$  13, che è numero delle 2, ò vogliamo dire, che è  $\frac{1}{2}$  del binomio, che si forma a giungere il doppio della  $\frac{1}{2}$ , del numero della Equatione con il numero de' 2, nella Equatione principale; quali dui risultanti sono le due diuersè valute della 2, che occorrono in questa Equatione, cioè la 2, valerà 7, & anco può valere  $\frac{1}{2}$  13.

Perche mò del 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  8, (ò altra quantità) pigliando la  $\frac{1}{2}$ , & poi quadrare la mità d'essa  $\frac{1}{2}$ , ne risulta sèpre l' $\frac{1}{2}$ , del medesimo 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  8, (ò della medesima altra quantità) si conosce pure, che ne deriuu la istessa regola data di sopra, perche similmete si potrà dire, Quando 1  $\frac{1}{2}$ , & numero sono eguali a 2, giungasi al numero de' 2, il doppio della 2, del numero dell'Equatione, & dall' $\frac{1}{2}$ , della somma si caui la  $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione; Ma tutto questo, cioè giungerà a 12, il doppio di  $\frac{1}{2}$  27, & della somma pigliare l' $\frac{1}{2}$ , che è 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , cioè l' $\frac{1}{2}$ , del 12, & la mità della  $\frac{1}{2}$  27, & di questo cauare la  $\frac{1}{2}$  27, restarà il 3, (che è l' $\frac{1}{2}$ , del 12,) manco  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , che è l'altra mità della  $\frac{1}{2}$  27, onde tutto questo è quato a dire, Da l' $\frac{1}{2}$ , del numero de' 2, si caui la mità della  $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione, ò vogliamo dire, Da l' $\frac{1}{2}$ , del numero de' 2, si caui la  $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione, & del restante si pigli la  $\frac{1}{2}$ , & que'  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  si giunga, & caui alla mità della  $\frac{1}{2}$ , della somma, che nasce a giungere al numero de' 2, al doppio della  $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione, che i dui risultanti saranno le due valute della 2, che in questa Equat. occorrono.

Sia 1  $\frac{1}{2}$  27, eguale a 12  $\frac{1}{2}$ ,  
si forma 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  8, da pigliarne la  $\frac{1}{2}$ ,

144

cauato 108

resta 36, la sua  $\frac{1}{2}$  è 18, la mità è 9, che giunta, & cauata a 6, mità del 12, fa 9, & 3, le  $\frac{1}{2}$ , de' quali sono 3, &  $\frac{1}{2}$  3, che accompagnati insieme, fanno 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , che è la  $\frac{1}{2}$ , del 12  $\frac{1}{2}$  8.

Di detto 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , la mità è 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ , A il quadrato della quale mità è 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , si caua la  $\frac{1}{2}$ , del nu. dell'Eq. cioè  $\frac{1}{2}$  27

resta 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ 

del quale si piglia la

3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ 

9

cauati 6 $\frac{1}{2}$ 

12, la  $\frac{1}{2}$ , è 1 $\frac{1}{2}$ , che con 3, & da 3, fa 4 $\frac{1}{2}$ , & 1 $\frac{1}{2}$ , le mità sono 2 $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$ , che le loro  $\frac{1}{2}$ , sono 1 $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$  3 $\frac{1}{2}$ , però 1 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , è la  $\frac{1}{2}$ , del residuo 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , che si giunge, & caua ad A 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$

A 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ giongi 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ cauati 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ 

somma 3

restante  $\frac{1}{2}$  3

Da l' $\frac{1}{2}$ , del numero de' 2, (cioè hora da 3,) si caui la  $\frac{1}{2}$ , dell' $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione (cioè hora  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ ,) & del restante (3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ ,) adoprato come residuo (cioè fatta la sottrazione colleguo  $\frac{1}{2}$ , se bene esse due quantità fossero commensurabili in lunghezza, & si potesse cauare questa da questa) si pigli la  $\frac{1}{2}$ , che sia in forma d'v' altro residuo, & ciascuno de' dui nomi d'esso residuo

cioè l' $\frac{1}{2}$ , del 12  $\frac{1}{2}$  8, somma tronata del numero de' 2, con il doppio della  $\frac{1}{2}$ , del num. dell'Equatione) è 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , da questo si caui  $\frac{1}{2}$  27, che è la  $\frac{1}{2}$ , del numero dell'Equatione (che perciò è sèpre doppia alla  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ ,) resta 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , del che presa la  $\frac{1}{2}$ , della 1 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , il che si giunge, & caua ad A 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ , che è mità del 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , di sopra trouato, & ne risultano 3, Et  $\frac{1}{2}$  3, ciascuno de' quali dui risultanti, cioè 3, & anco  $\frac{1}{2}$  3, è il valore della 2. Onde conuinciamo di più, che non solo il 3, supposto vale la 2, nella Equatione d'1  $\frac{1}{2}$ , & numero eguale a 2, formata, ma anco può valere  $\frac{1}{2}$  3, che, così 1  $\frac{1}{2}$ , valerà 9, che con il numero 17, fa 36, Et 1  $\frac{1}{2}$ , vale 3, & però 12  $\frac{1}{2}$ , valeranno ancor essi l'istesso 36. Et in quest' esempio d'Equatione è bello da auuertire, che delle due valute della 2, che sono,  $\frac{1}{2}$  3, & 3, l'vna è la  $\frac{1}{2}$ , dell'altra, ò vogliamo dire l'vna valuta della 2, in questa Equatione è quanto la valuta del 2, nella istessa Equatione, rispetto all'altra sua valuta della 2.

Noti, che nel douer giungere, & cauare l'1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , all'A 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ , perche sempre questi dui 1  $\frac{1}{2}$ , sono eguali, & anco le due  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$ , quanto al  $\frac{1}{2}$ , sono eguali, vediamo che nel sommare il binomio 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , col residuo 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ , (perche se d'1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$ , si annullano) la somma è sempre il doppio dell'1  $\frac{1}{2}$ , cioè è 3, Et nel cauare l'istesso residuo 1  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{1}{2}$ , dall'istesso binomio 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , li diui 1  $\frac{1}{2}$ , s'anno hano, & le due  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$ , si giungono insieme, & perciò ne risulta il doppio di  $\frac{1}{2}$  3, cioè  $\frac{1}{2}$  3, onde li dui risultanti sono l'vno, il doppio, d'1  $\frac{1}{2}$ , cioè 3, & l'altro il doppio di  $\frac{1}{2}$ , cioè  $\frac{1}{2}$  3, quali 3, &  $\frac{1}{2}$  3, mostrano le due valute della 2, essere l'vna 3, & l'altra  $\frac{1}{2}$  3.

Dall' hauere dunque auuertito, che doppiando l'1  $\frac{1}{2}$ , & anco doppiando il  $\frac{1}{2}$ , che forma il 3  $\frac{1}{2}$  6 $\frac{1}{2}$ , detto, ne nascono sempre le due valute della 2, noi nel dare la regola, potremo dire, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (151

residuo si doppij da se, non intendendo altramente, o non tenendo più conto del segno m, nel minore, che i dui risultanti, o dupli detti faranno le due valute della z.

Si hà 1 \* p 144. eguale à 88 z  
si caua 6. da 22. che resta 22 m 6. del qual residuo si piglia la Bz  
da 484  
si caua 36  
resta 448. la sua Bz, è Bz 448. la mità è Bz 112 che si giunge, & caua à 11  
da 112  
si caua 112

resta 9. la Bz, è 9. quale giunta, & caua à 11. fa 14. & R. le mità sono 7 & 4. & le loro Bz sono Bz 7. & 2. però Bz 7 p 2. farà la Bz. del binomio, & Bz 7 m 2 farà la Bz. del residuo. qual due quantità caua la minore dalla maggiore, cioè accompagnare insieme come residuo & il segno m. formaranno la Bz. del principal residuo 22 m 6. però essa sua Bz. farà Bz 7 p 2. meno (Bz 7 m 2) & (ben si vede, che da Bz 7 p 2. cauaio Bz 7 m 2. resta 4. che è la Bz. di 22 m 6. cioè di 10.) cioè Bz 7 no de' quali dui nomi di questo residuo, cioè Bz 7 p 2. & Bz 7 m 2. si doppià, & tanno Bz 2 p 4. & Bz 2 m 4. quali sono le due valute della z.

Si hà 1 \* p 144. eguale à 100 z  
si caua 6. da 25. resta 25 m 6. del qual residuo si piglia la Bz  
da 625  
si caua 36  
resta 589. la sua Bz. è Bz 589. la mità è Bz 147½. che si giunge, & caua à 15½  
mità del 25. & fa 12½ p Bz 147½. & 12½ m Bz 147½. di ciascuno de' quali si piglia la Bz  
da 156½  
si caua 147½

resta 9. la sua Bz, è 9. la mità è 1½ quale giunta, & caua 2½ mità del 15½. fa 7½. & 4½. le Bz. de' quali sono Bz 7½. & Bz 4½. però Bz 7½ p Bz 4½. farà la Bz. del binomio, & Bz 7½ m Bz 4½. farà la Bz. del residuo. Quali due quantità accompagnate insieme col segno m (perche si caua la minore dalla maggiore, douendo elle mostrare, o formare la Bz. del 25 m 6. che è residuo) & fanno Bz 7½ p Bz 4½ m (Bz 7½ m Bz 4½.) qual quantità, o residuo è la Bz. di 25 m 6. (& ben si vede, che Bz 7½ p Bz 4½. mako Bz 7½ m Bz 4½. cioè, che da Bz 7½ p Bz 4½. a cauarne Bz 7½ m Bz 4½. resta il doppio di Bz 4½. cioè Bz 19. che è bene la Bz. di 25 m 6. che significa a 19.)

Hora ciascuno di questi dui nomi del residuo (che è Bz. del 25 m 6.) cioè Bz 7½ p Bz 4½. & Bz 7½ m Bz 4½. si doppià, & fanno Bz 3 p Bz 19. & Bz 3 m Bz 19. però diremo, che la z. vale Bz 3 p Bz 19. & anco può valere Bz 3 m Bz 19.

Et se di più considerarem (come s'è notato in margine) che à giungere al numero de' z. il doppio della Bz. del numero dell'Equatione, & della somma pigliare la Bz. & si chiami B. & della mità d'essa Bz. che è vn binomio giungere, & caua la Bz. di quel residuo, che resulta à caua la Bz. dell'½. del numero dell'Equatione dall'½. del numero de' z. (la Bz. del qual residuo è anch'ella residuo, & si chiami R. & è sempre il residuo del binomio detto, che è mità del binomio B.) li dui risultanti sono i dui nomi del binomio B. detto (che è la Bz. del binomio composto dal numero de' z. & dal doppio della Bz. del numero dell'Equatione) quali dui risultanti sono amole due valute della z. che occorrono in questa Equatione d'1 \*. & numero eguale à z. vedremo, che molto breuemente si può dare la regola à questa Equatione, dicendo.

Quando 1 \*. & numero sono eguali à z. al numero de' z. si giunga il doppio della Bz. del numero dell'Equatione, & del binomio, che ne resulta per somma (che tale agguitione si deuè fare sempre col segno p. acciò se ne formi vn binomio) si pigli la Bz. che sarà anch'ella vn binomio. Et ciascuno delli dui nomi di questo binomio sarà valuta della z. Onde hauendo 1 \* p 63 z. eguale à 62 z. Al 62 numero de' z. gionto Bz 2548. doppio di Bz 63 z. Bz. del numero 637. dell'Equatione fa 67 p Bz 2548. Di questo binomio piglia 40z. che è 7 p Bz 13. il 7. primo nome d'esso binomio 7 p Bz 13. farà vna valuta della z. & Bz 13. che è l'altro nome d'esso binomio farà l'altra valuta della z.

Habbiafi 1 \* p 144. eguale à 88 z. Binomio 88 p 24. la sua Bz. è Bz 28 p 4. Più Bz 28 m 4. però Bz 28 p 4. vale la z. Et anco può valere Bz 28 m 4.

Riglisi la R, di questo binomio.

88 p 24

7744. quadrato dell'88.

ficaui 576. quadrato del 24.

resta 7168. la sua R, è R 7168. la metà della quale è R 1792. che si giugge, & cava alla metà dell'88 parte maggiore di binomio, & fa

44 p R 1792. Et

44 m R 1792. di ciascun de' quali 2. risultati si piglia la R

44 p R 1792. da pigliar-

1936

1792

resta 144. la sua R è 12 la metà del quale è 6. da giungere, & cavare a 22. metà del 44. & ne risultano 28. & 16. di ciascuno de' quali si piglia la R, & sono R 28. & 4. che accompagnate insieme fanno R 28 p 4. & questo è la R, del 44 p R 1792. però la R, del 44 m R 1792. sarà R 28 m 4. Et queste due giunte insieme fanno R 28 p 4. Più R 28 m 4. il che è la R, dell'88 p 24. binomio dato.

Ancora habbiamo p 144. eg. a 1002 binomio 100 p 24. da pigliarne la R

10000

ficaui 576

resta 9424. la sua R, è R 9424. la

metà della quale è R 2356. che si giugge, & cava a 20. metà del 100. & ne risultano

50 p R 2356. & 50 m R 2356. di ciascuno de' quali due risultanti si piglia la R, & esse R, so-

23500

2356

resta 144. la sua R, è 12. la metà è 6. che si giugge, & cava a 22. metà del 50. & ne risultano 11. & 19. di ciascuno de' quali 2. risultanti si piglia la R, & sono R 31. & R 19. che accompagnati insieme fanno R 31 p R 19. il che è la R, del binomio 50 p R 2356.

1002. cioè la R, valerà R 31 p R 19. & anco potrà valere R 31 m R 19.

Ancora considerando d'havece poniamo 14 p 144. eguale a 1002. & essersi accompagnato al 100. numero de' 2. il 24. che è doppio a 12. di 144. numero dell'Equatione, formando il binomio 100 p 24. Hora di questo binomio douendo pigliare la R, che farà vn'altro binomio (che d'vn binomio la R, e bin. & d'vn residuo la R, è residuo) inteso quest'altro bin. diuiso nella sua di nomi che faranno R 31 p R 19. & R 31 m R 19. (còueniente come si conosce dal quadrare i binomij) che essi suoi due nomi liano tali, che i due quadrati loro giunti insieme formino il 100. parte maggiore del binomio 100 p 24. & che il doppio del dutto d'essi due nomi sia 24. parte minore del 100 p 24. Se noi non sapessimo la regola del trouare la R, de binomij, si potrà fare vn quesito nel trouare la R, di 100 p 24. che dicesse. Trouami due quantità, che il doppio del dutto loro sia 24. Onerò per più breuità, che il dutto loro sia 12. metà del 24. & che la somma de' due quadrati loro si 100. Onde posto l'vna delle due quantita essere 12. con questa partito 12. dutto loro, ne viene  $\frac{12}{12}$ , che sarà l'altra quantità. I quadrati loro sono 12 &  $\frac{144}{12}$ , che giunti insieme fanno 12 p  $\frac{144}{12}$ , il che deve essere 100. & però è eguale a 100. onde per leuare il rotto,

Per fare la proua numerale dell'hauer concluso, che la R, d'88 p 24. è R 28 p 24. Più R 28 m 4. Quadraremo essa R, trouata, quale è vn binomio composto d'vn binomio, & d'vn residuo.

R 28 p 4. Più R 28 m 4  
via R 28 p 4. Più R 28 m 4

R 28 p 4

via R 28 m 4

44 p R 28. 8. volte  
44 m R 28. 8. volte

fa 28 m 16. Cioè 12. che è vn rettangolo delle due parti del binomio, però il suo doppio 24. comprende i due rettangoli delle parti.

sōma 88. che comprende i quadrati delle 2. parti del bino-

mio, che con 24. che sono i due rettangoli fa 88 p 24. però il quadrato del binomio proposto da quadrare è 88 p 24. come bisogna. Cioè si potrà dire essere 112. la R, del quale sarà R 112. come anco significa R 28 p 4. Più R 28 m 4. Che a giungere R 28 m 4. con R 28 p 4. ben si vede (annullà Joffi m 4. & p 4.) la somma essere R 28. & R 28. cioè il doppio di R 18. che è R 112.

Valendo la R 28 p 4. Il 2. valerà 44 p R 1792

44 p R 1792

1936

1792

Et il 2. valerà 3728 p (R 1792.) 88. volte  
Con 144 num. della Equatione

3728 p (R 1792.) 88. volte

Il che è bene quanto 882. cioè quanto 88. volte il 44 p R 1792. Et è ista similitudine Se la 2. valerà R 28 m 4. Il 2. valerà 44 m R 1792. & il 2. valerà 3728 m. (R 1792. 88.) volte, al quale giunto il 144. numero dell'Equatione fa 3728 m (R 1792.) 88. volte, il che è bene quanto 882.

no R 31 p R 19. & R 31 m R 19. quali si accompagnano insieme, & fanno R 31 p R 19. Più R 31 m R 19. & questo binomio è la R, del binomio 100 p 24. del quale si hauea da pigliare la R. Ciascuna mò delle 2. parti di questo binomio, o R, trouata sarà valuta della R, nella nostra Equatione d'144 p 144. eguale a

moltiplicando ogni cosa per 12. denominatore d'esso rotto. haueremo 12 p 144. eguale a 100. & Ouero hauendo pollo l'vna delle due quantita essere 12. il suo quadrato e 12 però il quadrato dell'altra farà il resto fino a 100 cioè 100 m 12. & la quantita sarà R 100 m 12. quale moltiplicata per la posta 12 cioè p R 12. fa R 1200 m 144. & questo è eguale a 12. che denotefire il duto delle parti. Onde leuando la R 12. col quadrare le parti, haueremo 100 m 12. eguale a 144. cioè 12 p 144. eguale a 100. Onde hora trouando il valore del 12. ella sarà vna parte del binomio, vogliamo dire, trouando le due valute della 12. che occorrono in questa Equatione (quando, cioè la dignità maggiore è con il numero) elle faranno le due quantita cercate, cioè le due parti R 31 p R 19. & R 31 m R 19. del binomio, che è R. del binomio 100 p 24. Perilche si vede, che tanto è trouare le due valute della 12. nell'Equatione d'12 p 144. eguale a 100. quanto è trouare le due parti della R. di 100 p 24. Et conuersamente tanto è trouare le due parti della R. di 100 p 24. quanto è il trouare le due valute della 12. nell'Equatione d'12 p 144. eguale a 100. Se dunque, come s'è detto, trouaremo la R. del binomio 100 p 24. le due parti del binomio, che ne nascerà per sua R. faranno le due valute della 12. che possono auuenire in questa Equatione.

Di più in altro modo concluderemo l'istesso, se supposto di sapere la regola seguente per trouare la valute della 12. nell'Equatione d'12. & numero eguale a 12. (& è Dal quadrato della metà del numero de' 12. si caui il numero dell'Equatione, & del restante si piglia la R. & essa si giunga & caui alla metà del numero de' 12. & di ciascuno delli doi risultanti (ciascuno de' quali è valute del 12.) si piglia la R. che ciascuna d'esse R. farà il valore della 12. Della qual regola ancora si mostrerà il nascimento) Consideraremo, che hauendo poniamo 12 p 144. eguale a 100. secondo questa regola Dal quadrato di 12. che è 144. si caui 144. numero dell'Equatione, & resta 0. di che si piglia la R. che è R. 2356. & questa si giunge, & caui al 50. & ne resta 100 p 24. & 50 m R 2356. di ciascuno de' quali (che è valore del 12.) si piglia la R. quali R. faranno R 31 p R 19. & R 31 m R 19. & ciascuna d'esse. che sono l'vna vn binomio, & l'altra vn residuo, farà il valore della 12. cioè la 12. valerà R 31 p R 19. & anco potrà valere R 31 m R 19.

Hora considerando ancora il modo dell'operare nel formare il binomio 100 p 24. (nella Equatione istessa d'12 p 144. eguale a 100.) del quale si piglia poi la R. vedremo, che essendo al 100. sempre l'istesso, & il 24. il doppio della R. del 144. noi moltiplicando vna volta la metà

$$\begin{array}{r} 12 \text{ p } 144. \text{ eguale a } 100 \\ \text{via } 50 \\ \hline 2500 \\ \text{si caui } 144 \\ \hline \text{resta } 2356 \end{array}$$

la sua R. si giunge, & caui al 50. & risultano 50 p R 2356. & 50 m R 2356. di ciascuno de' quali si piglia la R. 50 p R 2356

$$\begin{array}{r} 5000 \\ \text{si caui } 2356 \end{array}$$

resta 144. che la sua R. è 12. giutto, & caui al 50. fa 52. & 38. le loro metà sono 31. & 19. le R. delle quali sono R 31. & R 19. però haueremo R 31 p R 19. che sarà R. del binomio 50 p R 2356. Et similmente R 31 m R 19. sarà R. del residuo 50 m R 2356. ciascuna delle quali R 31 p R 19. & R 31 m R 19. farà valute della 12.

$$\begin{array}{r} 12 \text{ p } 144. \text{ eguale a } 100 \\ 100 \text{ p } 24. \text{ binom. di che si piglia } \\ \hline 10000 \\ \text{si caui } 576 \end{array}$$

9424. la sua R. è R 9424. la metà di essa è R 2356. quale si giunge, & caui al 50. metà del 100. parte maggiore del binomio 100 p 24. & ne risultano 50 p R 2356. & 50 m R 2356. de' quali doi risultanti si pigliano le R. che sono R 31 p R 19. & R 31 m R 19. queste giunte insieme fanno R 31 p R 19. Più R 31 m R 19. qual binomio è la R. del 100 p 24. d'esso binomio ciascuna delle due parti, cioè R 31 p R 19. & R 31 m R 19. è vna delle due valute della 12.

$$\begin{array}{r} \text{Qua } R 31 \text{ p } R 19. \text{ Più } R 31 \text{ m } R 19 \\ \text{delli } R 31 \text{ p } R 19. \text{ Più } R 31 \text{ m } R 19 \\ \hline 50 \text{ p } R 2356 \text{ p } 12 \text{ p } 12 \\ 50 \text{ m } R 2356 \\ \hline 100 \\ \text{fa } 100 \text{ p } 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{la 12. vale } R 31 \text{ p } R 19 \\ \text{il 2. vale } 50 \text{ p } R 2356 \\ \hline 50 \text{ p } R 2356 \\ \hline 2500 \\ \hline 2356 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{il 2. vale } 4856 \text{ p } R 23560000 \\ \text{il num. } 144 \end{array}$$

vna parte 50 p R 23560000 che è quanto 100. volte 50 p R 2356. valore del 12. però è quanto 100.2. che è l'altra parte.

Et così occorre nella valute R 21 m R 19. che il 2. vale 50 m R 2356. poi il 2. è 4856 m R 23560000. al quale giutto, il 144. numero, che è con il 2. fa 5000 m R 23560000. che è l'vna parte. & è appunto quanto 5000 m R 23560000 valore di 100.2. che è l'altra parte.

di 100. cioè 50. in se stesso, & del prodotto cabando 144. & resterà 36. Et l'altra volta (per pigliare la Bz. del binomio 1000 p 2.) moltiplicando il 100. totale in se stesso, che produrrà il quadruplo del prodotto dal 50. sua metà, & da esso prodotto cavandone il quadrato da 24. cioè 576. che anch'egli è il quadruplo del 144. (essendo 24 Bz. del 576. doppio a 11 Bz. del 144.) ne segue, che il restante 9424. sarà anch'egli quadruplo al restante 2336. & perche di ciascuno di questi due restanti si piglia la Bz. & sono Bz. 2336. & Bz. 9424. ne segue, che per essere il numero 9424 quadruplo al numero 2336. la Bz. poi del maggiore sarà doppia alla Bz. del minore (perche la Bz. di 4. denominatore del quadruplo è 2. che mostra la denominatione duplicata) cioè che Bz. 9424 è doppia a Bz. 2336. Et perche d'essa Bz. 9424. si piglia la metà (ella perciò, che è Bz. 2336. sarà di necessita eguale all'altra Bz. 2336. dell'altro modo, Et perche anco questa metà, cioè Bz. 2336. si giunge, & caua alla metà di 100. (parte maggiore del binomio 100 p 24.) cioè a 50. qual 50. perciò è eguale al 50. che si quadrò nell'altro modo, anco qui ne resterà 50. Bz. 2336. & 50. m Bz. 2336. come nell'altro modo. Et perche di ciascuno d'essi due restanti così nell'un modo come nell'altro si pigliano le Bz. è necessario, che ne deriuino le medesime Bz. 31 p Bz. 19. Et Bz. 31 m Bz. 19. Et perche nel binomio 100 p 24. (per trouare la Bz.) esse due quantità s'ingiungano insieme col segno. Più, cioè accompagnate in forma di binomio, & fanno Bz. 31 p Bz. 19. Più Bz. Bz. 31 m Bz. 19. qual binomio (che è composto d'un binomio Bz. 31 p Bz. 19. & d'un residuo Bz. 31 m Bz. 19.) è la Bz. del binomio 100 p 24. come si vede quadrandolo. Ma nell'istesso modo esse due quantità, cioè Bz. 31 p Bz. 19. & Bz. 31 m Bz. 19. non vanno altramente accompagnate insieme, ma ciascuna da se è una valuta della z. si conosce chiaramente quello, che si voleva, cioè, che. Quando del binomio 100 p 24. (formato come s'è detto) si piglierà la Bz. quale sarà anch'ella binomio, ciascuna delle due parti d'esso binomio componente questa Bz. verra ad essere valuta della z. nella nostra Equatione.

Ahora habendo poniamo 1 p 144. eguale a 88 z. & trasformadosi, come di costoro non più a basso vedremo potersi trasformare in 12 p 144. eguale a 88 z. & in quella nuova Equatione trouando il valore della z. potremo operare, come si vede.

12 p 144. eguale a 88 z.

1936

si caua 144.

resta 1792. la sua Bz. è Bz. 1792. da giungere, & caua 244. & fa 44 p Bz. 1792. & 44 m Bz. 1792. per valore della z. qui, ma sono le valute della z. nell'Equatione superiore principale di 1 p 144. eguale a 88 z. hora per trouare le valute della z. in essa Equatione principale, facendo che la z. è Bz. del z. conuen trouare le Bz. di questi due binomij, & residuo, ma per trouare si caua il quadrato di Bz. 1792. cioè 1792. da 1936. quadrato del 44 & però resterà l'istesso 144. A che è numero dell'Equatione, & di quello 144. si piglia la Bz. che è 12. qual 12 si giunge, & caua al 44. (che è sempre la metà dell'88. numero de' z.) & ne risultano 56. & 31. de' quali si piglia la metà, che sono 28. & 16. ouero la metà del 12. si giunge, & caua alla metà del 44. & ne si giunge, & caua 61. a 22. & da 22. cioè la metà della Bz. del numero dell'Equatione si giunge, & caua all'12. del numero de' z. Ouero (che resta l'istesso) la Bz. dell'12. del numero dell'Equatione si giunge, & caua all'12. del numero de' z. & delli due risultanti 28. & 16. si pigliano le Bz. che sono Bz. 28. & 4. quali (per formare il binomio, che ha da essere Bz. del binomio 44 p Bz. 1792.) si giungono insieme, & anco si caua la minore 4. dalla maggiore Bz. 28. per formare il residuo (che ha da essere la Bz. del residuo 44 m Bz. 1792.) & ne risultano Bz. 28 p 4. & Bz. 28 m 4. (per le Bz. del binomio; & residuo detti) quali sono le due valute della z. nell'Equatione di 1 p 144. eguale a 88 z. Onde da quell'operare si può deriuare la regola a questa Equatione di 1 p 144. numero eguale a 88 z. dicendo.

La metà della Bz. del numero dell'Equatione, ouero la Bz. dell'12. del numero dell'Equatione (cioè hora 6.) si giunge, & caui all'12. del numero de' z. (che hora è 22.) & delli due risultanti (che hora sono 28. & 16.) si pigliano le Bz. (che hora sono Bz. 28. & 4.) & la minore d'essidue Bz. si giunge, & caui alla maggiore (che hora ne risultano Bz. 28 p 4. & Bz. 28 m 4.) che adui risultanti faranno le due valute della z. che occorrono in questa Equatione.

Habbiasi 1 p 144. eguale a 100 z. A 25. che è l'12. del 100. numero de' z. si giunge, & caua a. che è la Bz. dell'12. di 144. numero dell'Equatione, & ne risultano 31. & 19. de' quali si pigliano le Bz. & sono Bz. 31. & Bz. 19. Hora la minore Bz. 19. si giunge, & caua alla maggiore Bz. 31. &

ne di ri-

meridiano  $23^{\circ} 17' 30''$  di  $34^{\circ}$  in  $32^{\circ}$  e delle quali due quantità, binomio cioè, & residuo, ciascuna è valore della  $x$ .

« Di più habbiati 1 e p 637. eguale a 62 z. A 1 $\frac{1}{2}$ z. che ell'z. di 62. numero de' z. si giunge, & causa 159z. che è la Bz. dell'z. di 637. numero dell'Equazione, & per risultar 152 p Bz. 159z. de' z. che si giunge de' quali si pigliano le Bz. & sono 1 $\frac{1}{2}$  p Bz. 3 $\frac{1}{2}$  & 3 $\frac{1}{2}$  m Bz. Hora la minore, cioè 1 $\frac{1}{2}$  m Bz. si giunge, & causa alla maggiore 3 $\frac{1}{2}$  p Bz. 3 $\frac{1}{2}$  & ne risultar 7, & Bz. 13. cioè uno de' quali due restanti è una volta della z. e l'altro valerà 7. & ancora potrà valere le 13.

di 15,58 e 15,90, rispettivamente.

resta 81, la sua Bz. è 9, la mità è  $4\frac{1}{2}$ , quale si giunge, & caua à 7 $\frac{1}{2}$ , mità del 15, & ne risultano 12 $\frac{1}{2}$ , & 3 $\frac{1}{2}$ , di ciascuno de quali si piglia la Bz, & sono 3 $\frac{1}{2}$ , & Bz 3 $\frac{1}{2}$ , quali giunte insieme fanno 3 $\frac{1}{2}$ , 6 Bz 1 $\frac{1}{2}$ , che è la Bz, cercata.

«Dire quantità continue proporzionalia fia la media 6. & la somma de' quadrati de' due e-  
streme fa 97. si cercano esse due estremi. Ponol'vna d'esse fia la maggiore sia la minore e-  
stere i. il suo quadrato è 1. 2. però il quadrato dell'altra sarà 97 mi. 1. 2. onde la sua B è 97 mi.  
1. 2. perché la somma d'esse due estremi farà i. + p. B. 97 mi. 1. 2. mi. mediante la confide-  
razione A. habbiamo conosciuto, essa somma delle estreme douere esser 13. però haueremo  
i. + p. B. 97 mi. 1. 2. eguale a 13. Et quadrato di cias. una parte p trouar modo di leuar la B. i.  
i. + p. B. 1. 2. p. B. 1. 2. + 97 mi. 1. 2. eguale a 169. (chacra)

Doc 81384 xmb + equal 21572

Cioè  $384 \pm m_4$  eguale a  $5184$ .

Cioè 97,2 eguale a 14 p 1798

Quero, tirando para 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e 11 e 12 e 13 e 14 e 15 e 16 e 17 e 18 e 19 e 20 e 21 e 22 e 23 e 24 e 25 e 26 e 27 e 28 e 29 e 30 e 31 e 32 e 33 e 34 e 35 e 36 e 37 e 38 e 39 e 40 e 41 e 42 e 43 e 44 e 45 e 46 e 47 e 48 e 49 e 50 e 51 e 52 e 53 e 54 e 55 e 56 e 57 e 58 e 59 e 60 e 61 e 62 e 63 e 64 e 65 e 66 e 67 e 68 e 69 e 70 e 71 e 72 e 73 e 74 e 75 e 76 e 77 e 78 e 79 e 80 e 81 e 82 e 83 e 84 e 85 e 86 e 87 e 88 e 89 e 90 e 91 e 92 e 93 e 94 e 95 e 96 e 97 e 98 e 99 e 100 e 101 e 102 e 103 e 104 e 105 e 106 e 107 e 108 e 109 e 110 e 111 e 112 e 113 e 114 e 115 e 116 e 117 e 118 e 119 e 120 e 121 e 122 e 123 e 124 e 125 e 126 e 127 e 128 e 129 e 130 e 131 e 132 e 133 e 134 e 135 e 136 e 137 e 138 e 139 e 140 e 141 e 142 e 143 e 144 e 145 e 146 e 147 e 148 e 149 e 150 e 151 e 152 e 153 e 154 e 155 e 156 e 157 e 158 e 159 e 160 e 161 e 162 e 163 e 164 e 165 e 166 e 167 e 168 e 169 e 170 e 171 e 172 e 173 e 174 e 175 e 176 e 177 e 178 e 179 e 180 e 181 e 182 e 183 e 184 e 185 e 186 e 187 e 188 e 189 e 190 e 191 e 192 e 193 e 194 e 195 e 196 e 197 e 198 e 199 e 200 e 201 e 202 e 203 e 204 e 205 e 206 e 207 e 208 e 209 e 210 e 211 e 212 e 213 e 214 e 215 e 216 e 217 e 218 e 219 e 220 e 221 e 222 e 223 e 224 e 225 e 226 e 227 e 228 e 229 e 230 e 231 e 232 e 233 e 234 e 235 e 236 e 237 e 238 e 239 e 240 e 241 e 242 e 243 e 244 e 245 e 246 e 247 e 248 e 249 e 250 e 251 e 252 e 253 e 254 e 255 e 256 e 257 e 258 e 259 e 260 e 261 e 262 e 263 e 264 e 265 e 266 e 267 e 268 e 269 e 270 e 271 e 272 e 273 e 274 e 275 e 276 e 277 e 278 e 279 e 280 e 281 e 282 e 283 e 284 e 285 e 286 e 287 e 288 e 289 e 290 e 291 e 292 e 293 e 294 e 295 e 296 e 297 e 298 e 299 e 300 e 301 e 302 e 303 e 304 e 305 e 306 e 307 e 308 e 309 e 310 e 311 e 312 e 313 e 314 e 315 e 316 e 317 e 318 e 319 e 320 e 321 e 322 e 323 e 324 e 325 e 326 e 327 e 328 e 329 e 330 e 331 e 332 e 333 e 334 e 335 e 336 e 337 e 338 e 339 e 340 e 341 e 342 e 343 e 344 e 345 e 346 e 347 e 348 e 349 e 350 e 351 e 352 e 353 e 354 e 355 e 356 e 357 e 358 e 359 e 360 e 361 e 362 e 363 e 364 e 365 e 366 e 367 e 368 e 369 e 370 e 371 e 372 e 373 e 374 e 375 e 376 e 377 e 378 e 379 e 380 e 381 e 382 e 383 e 384 e 385 e 386 e 387 e 388 e 389 e 390 e 391 e 392 e 393 e 394 e 395 e 396 e 397 e 398 e 399 e 400 e 401 e 402 e 403 e 404 e 405 e 406 e 407 e 408 e 409 e 410 e 411 e 412 e 413 e 414 e 415 e 416 e 417 e 418 e 419 e 420 e 421 e 422 e 423 e 424 e 425 e 426 e 427 e 428 e 429 e 430 e 431 e 432 e 433 e 434 e 435 e 436 e 437 e 438 e 439 e 440 e 441 e 442 e 443 e 444 e 445 e 446 e 447 e 448 e 449 e 450 e 451 e 452 e 453 e 454 e 455 e 456 e 457 e 458 e 459 e 460 e 461 e 462 e 463 e 464 e 465 e 466 e 467 e 468 e 469 e 470 e 471 e 472 e 473 e 474 e 475 e 476 e 477 e 478 e 479 e 480 e 481 e 482 e 483 e 484 e 485 e 486 e 487 e 488 e 489 e 490 e 491 e 492 e 493 e 494 e 495 e 496 e 497 e 498 e 499 e 500 e 501 e 502 e 503 e 504 e 505 e 506 e 507 e 508 e 509 e 510 e 511 e 512 e 513 e 514 e 515 e 516 e 517 e 518 e 519 e 520 e 521 e 522 e 523 e 524 e 525 e 526 e 527 e 528 e 529 e 530 e 531 e 532 e 533 e 534 e 535 e 536 e 537 e 538 e 539 e 540 e 541 e 542 e 543 e 544 e 545 e 546 e 547 e 548 e 549 e 550 e 551 e 552 e 553 e 554 e 555 e 556 e 557 e 558 e 559 e 560 e 561 e 562 e 563 e 564 e 565 e 566 e 567 e 568 e 569 e 570 e 571 e 572 e 573 e 574 e 575 e 576 e 577 e 578 e 579 e 580 e 581 e 582 e 583 e 584 e 585 e 586 e 587 e 588 e 589 e 590 e 591 e 592 e 593 e 594 e 595 e 596 e 597 e 598 e 599 e 600 e 601 e 602 e 603 e 604 e 605 e 606 e 607 e 608 e 609 e 610 e 611 e 612 e 613 e 614 e 615 e 616 e 617 e 618 e 619 e 620 e 621 e 622 e 623 e 624 e 625 e 626 e 627 e 628 e 629 e 630 e 631 e 632 e 633 e 634 e 635 e 636 e 637 e 638 e 639 e 640 e 641 e 642 e 643 e 644 e 645 e 646 e 647 e 648 e 649 e 650 e 651 e 652 e 653 e 654 e 655 e 656 e 657 e 658 e 659 e 660 e 661 e 662 e 663 e 664 e 665 e 666 e 667 e 668 e 669 e 670 e 671 e 672 e 673 e 674 e 675 e 676 e 677 e 678 e 679 e 680 e 681 e 682 e 683 e 684 e 685 e 686 e 687 e 688 e 689 e 690 e 691 e 692 e 693 e 694 e 695 e 696 e 697 e 698 e 699 e 700 e 701 e 702 e 703 e 704 e 705 e 706 e 707 e 708 e 709 e 710 e 711 e 712 e 713 e 714 e 715 e 716 e 717 e 718 e 719 e 720 e 721 e 722 e 723 e 724 e 725 e 726 e 727 e 728 e 729 e 730 e 731 e 732 e 733 e 734 e 735 e 736 e 737 e 738 e 739 e 740 e 741 e 742 e 743 e 744 e 745 e 746 e 747 e 748 e 749 e 750 e 751 e 752 e 753 e 754 e 755 e 756 e 757 e 758 e 759 e 760 e 761 e 762 e 763 e 764 e 765 e 766 e 767 e 768 e 769 e 770 e 771 e 772 e 773 e 774 e 775 e 776 e 777 e 778 e 779 e 780 e 781 e 782 e 783 e 784 e 785 e 786 e 787 e 788 e 789 e 790 e 791 e 792 e 793 e 794 e 795 e 796 e 797 e 798 e 799 e 800 e 801 e 802 e 803 e 804 e 805 e 806 e 807 e 808 e 809 e 810 e 811 e 812 e 813 e 814 e 815 e 816 e 817 e 818 e 819 e 820 e 821 e 822 e 823 e 824 e 825 e 826 e 827 e 828 e 829 e 830 e 831 e 832 e 833 e 834 e 835 e 836 e 837 e 838 e 839 e

Re 197 m. 12. eguale a 13 m. 12. (& è quanto à dire, se il quadrato dell'vna, o prima sia 12. re-  
 sta per il quadrato dell'altra 97 m. 12. però essa terza sarà 34 + 97 m. 12. fatta effendo la prima 12.  
 la terza è il resto fino à 13. forma loro, cioè è 13 m. 12. però quello è eguale à 34: 197 m. 12. 3  
 hora quadrando cia/cuna parte, haueremo

Cioè 26 4. eguale à 12 p 72. Cioè 12 4. eguale à 12 p 36. Et così ancora in questo modo vediamo, che tanto importa l'habere 12 p 36. eguale à 12 4. quanto habere 12 p 12 eguale à 26 4.

Ma sia che la maggiore delle due quantità estreme si possa essere  $6\frac{1}{2}$  p. i. il suo quadrato  $42\frac{1}{4}$  p. i.  $3\frac{1}{2}$  p. i. che equato da 97, resta  $54\frac{1}{4}$  m. i.  $3\frac{1}{2}$  m. i. x. per il quadrato della minore, onde el la farà  $82\frac{1}{4}$  m. i.  $3\frac{1}{2}$  m. i. x. che con  $6\frac{1}{2}$  p. i. polita la maggiore fa  $4\frac{1}{2}$  p. i. x.  $82\frac{1}{4}$  m. i.  $3\frac{1}{2}$  m. i. x. che farà la somma loro, perche he quello e eguale a 23, che (appiamo doue e essere somma) onde quadrando le parti per auer un modo di leuare la  $82\frac{1}{4}$  hauera

97 p (B) 154 m (3 x m 1 x) volte (P p 2 x) eguale a 169.9  
 leua, do 97. da cia, una banda, & poi partendo per 13 p 1

la vale  $\frac{97}{2\frac{1}{2}}$  si ha ueta Del  $54\frac{1}{2}$  m 13 e m 12 eg. a  $\frac{73}{13 p 7}$  e quadrado ciafc. di loro

il 2 vale 16  $\frac{1}{2}$   
il 3 vale 15  $\frac{1}{2}$   
il 4 vale 14  $\frac{1}{2}$

|     |     |      |        |
|-----|-----|------|--------|
| 100 | 39  | 219  |        |
| 368 | 400 | 3701 | m 6762 |

$256\frac{1}{2} \times 978\frac{1}{2}$        $252\frac{1}{2} \times 1197 \times 169 \times 123 \times 4$   
 forma  $141\frac{1}{2} \times 1197$        $169 \times 123$

Il numero è 1017 e si ha:  $2152 \div 2 = 1076$  e  $1076 \div 2 = 538$ .  
Cioè  $4088 \div 2 = 2044$  e  $2044 \div 2 = 1022$  e  $1022 \div 2 = 511$ .  
Nella quale l'1 è il numero di cui si ha 511 volte.

Somma  $14\frac{1}{2}$

Q. 2. The following are the marks obtained by 10 students in a test. Find the mean marks.



na banda, haueremo  $\frac{36}{12}$ , eguale à 12 m 12, & hora multiplicando per 12, denominatore del rotto, haueremo 36, eguale à 12 m 12.

Similmente posta la maggiore delle due estreme  $6\frac{1}{2}$  p 12, con questa partito 36, quadrato della media, & però dutto delle estreme, ne verrà  $\frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , che sarà l'altra estrema, ma ella deu' essere  $6\frac{1}{2}$  m 12, però  $\frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , sarà eguale à  $6\frac{1}{2}$  m 12, onde per leuare il rotto, multiplicando ciascuna di loro per il denominatore  $6\frac{1}{2}$  p 12, haueremo 36, eguale à 42 m 12, cioè 12, eguale à  $6\frac{1}{2}$ . Ouero essendo la maggiore  $6\frac{1}{2}$  p 12, & trouando la minore essere  $\frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , la somma loro sarà  $6\frac{1}{2} \times 12 + \frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , quale sarà eguale à 12. Onde ridotto al rotto la prima parte, haueremo  $\frac{42 \times 12}{6\frac{1}{2} \times 12} = \frac{42}{6\frac{1}{2}}$ , cioè  $7\frac{1}{2}$  p 12, eguale à 12. Et multiplicando ciascuna parte per  $6\frac{1}{2}$  p 12, denominatore del rotto, per lenarlo haueremo  $7\frac{1}{2} \times 12$ , eguale à 84 m 12, cioè 12, eguale à  $6\frac{1}{2}$ . Ouero essendo la somma  $6\frac{1}{2} \times 12 + \frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , eguale à 12, multiplicando ciascuna parte per  $6\frac{1}{2}$  p 12, denominatore del rotto, per leuailo si hauerà pure  $7\frac{1}{2} \times 12$ , eguale à 84 m 12, cioè 12, eguale à  $6\frac{1}{2}$ . Ouero essendo la somma  $6\frac{1}{2} \times 12 + \frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , eguale à 12, leuando  $6\frac{1}{2} \times 12$ , da ciascuna parte, acciò il rotto resti solo, haueremo  $\frac{36}{6\frac{1}{2} \times 12}$ , eguale à  $6\frac{1}{2}$  m 12. Et hora per leuare il rotto, multiplicando ciascuna parte per il denominatore  $6\frac{1}{2}$  p 12, haueremo 36, eguale à 42 m 12, cioè 12, eguale à  $6\frac{1}{2}$ , & la r. valerà 12. Il che tutto s'è detto, acciò lo Studente si facci esperto ne i diuersi modi d'operare. Ancora considerando, che quando tre quantità sono continue proportionali, ancho tre quadrati loro sono continui proportionali.

### Propositione prima:



Se quattro quantità siano proportionali anchora i quadrati loro nel medesimo ordine saranno proportionali. Siano le quattro quantità A, B, a, b, proportionali, cioè che da A, a B, sia come da a, a b, & siano i loro quadrati per ordine Q, R, q, r, si dice, che anch'essi faranno nel medesimo ordine proportionali, cioè, che da Q, quadrato di A, ad R, quadrato di B, sarà come da q, quadrato di a, ad r, quadrato di b.

Dimostrazione. Perche da A, a B, è come da a, a b, ne segue, che il denominatore della proportion di A, a B, (& sia D,) sia eguale al denominatore della proportion di a, a b, (& sia d.)

& perche A, in se stesso produce Q, & a multiplicare B, in se stesso produce R, sia che fra Q, & R, si ponga M, che sia il duto di A, in B, onde, perche a multiplicare A, & B, per vn'istesso A, se ne produce Q, & M, tal proportion sarà da Q, ad M, quale da A, a B, & anchora, perche a multiplicare A, & B, per vn'istesso B, se ne produce M, & R, tal proportion sarà da M, ad R, quale da A, a B, & però Q, ad M, sarà come da M, ad R, sì che Q M R, saranno tre quantità continue proportionali nella proportion di A a B, & però per la medesima ragione posto fra q, & r, quadrati di a, & b, la quantità m, duto di a, in b, concluderemo, che q m r, sono tre quantità continue proportionali nella proportion di a, a b, & però nella proportion di A, a B, (alla quale è eguale dal

supposito la proportion di a, a b,) ma anchora se tre Q M R, sono tre quantità continue proportionali nella proportion istessa di A, a B, però le tre quantità Q M R, & le tre q m r, sono proportionali in vna istessa proportion, che è quella di A, a B, o di a, a b, onde, perche la proportion di Q, ad R, contiene due volte, o vogliamo dire è duplicata a quella di Q, ad M, (il denominatore della quale proportion di Q, ad R, è sempre il duto del denominatore della proportion di Q, ad M, nel denominatore della proportion di M, ad R, & però è il quadrato del denominatore d'vna d'esse due proportioni di Q, ad M, o di M, ad R, quando elle (come auuiene hora) sono eguali fra loro) Et che similmente la proportion di q, ad r, contiene due volte,

o vogliamo

ò vogliamo dire è duplicata à quella di  $q$ , ad  $m$ , & esse due proporzioni di  $Q$ , ad  $M$ , & di  $q$ , ad  $m$ , sono eguali fra loro, & perciò la duplicata all'vna è l'istessa proporzion, che la duplicata all'altra, ne segue, che la proporzion di  $Q$ , ad  $R$ , sia eguale alla proporzion di  $q$ , ad  $r$ , che è quello, che si volea mostrare.

L'istesso si conosce auuenire, se in vece di quattro quantità proporzionali se ne pigliano tre, continue proporzionali, cioè, che delle quattro quantità proporzionali la seconda, & terza, per essere eguali, douentino vna istessa, che serua per conseguente alla prima, & per antecedente alla terza. Similmente se le quantità proporzionali, ò le continue proporzionali siano quante si vogliono si potrà mostrare nel medesimo modo, che i quadrati loro nel medesimo ordine saranno proporzionali.

### Proposizione seconda.

SE quattro quantità siano proporzionali, ancora i Cubi d'esse nel medesimo ordine saranno proporzionali. Siano le quattro quantità  $A, B, a, b$ , proporzionali. Et siano i loro Cubi per ordine  $C, V, c, v$ , si dice, che anch'essi saranno nel medesimo ordine proporzionali. Dimostrat.

|                  |                  |     |                  |                  |
|------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| $A$              | $B$              | $a$ | $b$              |                  |
| 9                | 6                | 6   | 4                |                  |
| $Q$              | $R$              | $q$ | $r$              |                  |
| 81               | 36               | 36  | 16               |                  |
| $C$              | $N$              | $V$ | $c$              | $n$              |
| 729              | 486              | 216 | 316              | 144              |
| $D 1\frac{1}{2}$ | $E 2\frac{1}{2}$ |     | $D 1\frac{1}{2}$ | $E 2\frac{1}{2}$ |
| $G 3\frac{1}{2}$ |                  |     | $G 3\frac{1}{2}$ |                  |

Et considerisi, che per essere  $C$ , &  $N$ , i dotti di  $A$ , &  $B$ , via vn'istesso  $Q$ , la proporzion di  $C$ , ad  $N$ , sarà come da  $A$ , à  $B$ . Ancora dall'altra banda per essere  $c$ , &  $n$ , i dotti di  $a$ , &  $b$ , via vn'istesso  $q$ , la proporzion di  $c$ , ad  $n$ , sarà come da  $a$ , à  $b$ , ma questa di  $A$ , à  $B$ , & di  $a$ , à  $b$ , del supposito eguale à quella di  $A$ , à  $B$ , però da  $c$ , ad  $n$ , sarà come di  $A$ , à  $B$ . Et anco come di  $A$ , à  $B$ , così è da  $C$ , ad  $N$ , però da  $C$ , ad  $N$ , è come da  $c$ , ad  $n$ . Di più, perche  $N$ , &  $V$ , deriuano dal duto di  $Q$ , &  $R$ , nell'istesso  $B$ , ne segue, che da  $N$ , ad  $V$ , sia come da  $Q$ , ad  $R$ . Ancora dall'altra banda per essere  $n$ , &  $v$ , i dotti di  $q$ , &  $r$ , nell'istesso  $b$ , ne segue, che da  $n$ , ad  $v$ , sia come da  $q$ , ad  $r$ , &  $q$ , ad  $r$ , per la antecedente dimostrazione) è come da  $q$ , ad  $r$ , però da  $n$ , ad  $v$ , sarà come di  $Q$ , ad  $R$ . Et già s'è mostrato ancora da  $N$ , ad  $V$ , essere come da  $Q$ , ad  $R$ , però da  $N$ , ad  $V$ , sarà come da  $n$ , ad  $v$ . Onde, perche la proporzion di  $C$ , ad  $V$ , si compone delle due di  $C$ , ad  $N$ , & di  $N$ , ad  $V$ . Et dall'altra banda la proporzion di  $c$ , ad  $v$ , si compone delle due di  $c$ , ad  $n$ , & di  $n$ , ad  $v$ . Et essendo delle componenti la prima di  $C$ , ad  $N$ , eguale alla prima di  $c$ , ad  $n$ , Et la seconda di  $N$ , ad  $V$ , eguale alla seconda di  $n$ , ad  $v$ , ancora la composta da quelle, cioè la da  $C$ , ad  $V$ , sarà eguale alla composta da quelle, cioè alla da  $c$ , ad  $v$ . Ouero, perche sappiamo, che il denominatore della proporzion di  $N$ , ad  $V$ , è l'istesso, che il denominatore della proporzion di  $n$ , ad  $v$ , (cioè il medesimo, che è denominatore della proporzion de' quadrati  $Q$ , &  $R$ , ò de' quadrati  $q$ , &  $r$ .) & che anco il denominatore della proporzion di  $C$ , ad  $N$ , è l'istesso, che il denominatore della proporzion di  $c$ , ad  $n$ , (cioè il medesimo, che è denominatore della proporzion delle prime quantità  $A$ , &  $B$ , ouero  $a$ , &  $b$ .) cioè, perche  $C$ , contiene  $N$ , per il denominatore della proporzion di  $C$ , ad  $N$ , & sia  $D 1\frac{1}{2}$ . Et  $N$ , contiene  $V$ , per il denominatore della proporzion di  $N$ , ad  $V$ , & sia  $E 2\frac{1}{2}$ , ne segue, che  $C$ , contenirà  $V$ , per il duto di  $D 1\frac{1}{2}$ , in  $E 2\frac{1}{2}$ , & sia  $G 3\frac{1}{2}$ . Et dall'altra banda similmente  $c$ , contenirà  $v$ , per il duto de' dui denominatori delle proporzioni di  $c$ , ad  $n$ , & di  $n$ , ad  $v$ , &  $a$ , ma essi dui denominatori sono gl'istessi  $D 1\frac{1}{2}$ , &  $E 2\frac{1}{2}$ , che sono anco denominatori delle proporzioni di  $C$ , ad  $N$ , & di  $N$ , ad  $V$ , per la egualità d'esse proporzioni, onde anco il duto del  $D 1\frac{1}{2}$ , via l' $E 2\frac{1}{2}$ , da quest'altra banda sarà eguale al  $G 3\frac{1}{2}$ , duto del  $D 1\frac{1}{2}$ , via l' $E 2\frac{1}{2}$ , dalla prima banda, ma questi dotti mostrano l'vno la quantità delle volte, che  $C$ , contiene  $V$ , cioè il denominatore della proporzion di  $C$ , ad  $V$ , & l'altro la quantità delle volte, che  $c$ , contiene  $v$ , cioè il denominatore della proporzion di  $c$ , ad  $v$ , però essendo essi denominatori eguali fra loro (anzi l'istessi) ne segue, che anco le proporzioni da essi denominate siano medesime, fra loro eguali, cioè, che dal cubo  $C$ , al cubo  $V$ , sia come dal cubo  $c$ , al cubo  $v$ , che è quanto

è quanto si volea mostrare. L'istesso si conosce auuenire se in vece di quattro quantità proporzionali se ne pigliano tre continue proporzionali, cioè, che delle quattro quantità proporzionali la seconda, & terza per essere eguali douentino vna istessa, che serua per consequente alla prima, & per antecedente alla terza. Similmente se le quantità proporzionali, ò le continue proporzionali, siano quante si vogliano, si potrà mostrare nel medesimo modo, che i cubi loro nel medesimo ordine sono proporzionali.

### Proposizione terza.

Se quattro quantità siano proporzionali i quadri quadrati loro nel medesimo ordine saranno proporzionali. Siano le quattro quantità A B, a b, proporzionali, & siano i loro quadri quadrati per ordine P S, p s, si dice, che anch'essi saranno nel medesimo ordine proporzionali.

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A                | B                | a                | b                |
| 9                | 6                | 4                | 4                |
| C                | V                | C                | u                |
| 729              | 216              | 316              | 64               |
| P                | T                | S                |                  |
| 6561             | 4374             | 1296             |                  |
| $D 1\frac{1}{2}$ | $G 3\frac{1}{2}$ | $D 1\frac{1}{2}$ | $G 3\frac{1}{2}$ |
| $H 5\frac{1}{2}$ |                  | $H 5\frac{1}{2}$ |                  |

Delle medesime quattro quantità A B, a b, siano i loro cubi per ordine C V, c u, quali anch'essi per ordine (per la antecedente seconda proporzione) sono proporzionali. E perchè à moltiplicare il Cubo per la sua Bz, emba ò lato se ne forma il quadro quadrato, ne segue, che à moltiplicare C, per A, ne deriuo P, & à moltiplicare V, per B, ne deriuo S. Ancora ne gl'altri due quadri quadrati similmente sarà il duto

di c, in a, & s, il duto di u, in b. Hora fra P, & S, si ponà T, che sia il duto di C in B, & similmente fra p, & s, si ponà t, che sia il duto di c, in b. Et considerisi, che per essere P, & T, i dotti di A, & B, via vn'istesso C, la proporzione di P, à T, sarà come da A, à B. Ancora dall'altra banda per essere p, & t, i dotti di a, & b, via vn'istesso c, la proporzione di p, à t, sarà come da a, à b, ma quella di a, à b, è dal supposito eguale à quella di A, à B, però da p, a t, sarà come di A, à B, l'anco come da A, à B, così è da P, à T, però da P, à T, è come da p, a t. Di più, perchè T, & S, deriuano dal duto di C, & V, nell'istesso B, ne segue, che da T, ad S, sia come da C, ad V. Ancora dall'altra banda per essere t, & s, i dotti di c, & u, nell'istesso b, ne segue, che da t, ad s, sia come da c, ad u, ma ancora da C, ad V, (per la antecedente proporzione) è come da c, ad u, però da t, ad s, sarà come di C, ad V. Et già s'è mostrato, che ancora da T, ad S, è come da C, ad V, però da T, ad S, sarà come da t, ad s. Onde, perchè la proporzione di P, ad S, si compone dalle due di P, à T, & di T, ad S. Et dall'altra banda la proporzione di p, ad s, si compone dalle due di p, à t, & di t, ad s. Et la prima delle componenti da vna banda è eguale alla prima delle componenti dall'altra banda, & la seconda di T, ad S, è eguale alla seconda di t, ad s. Ancora la da P, ad S, composta da quelle sarà eguale alla da p, ad s, composta da quelle. Ouero, perchè sappiamo, che il denominatore della proporzione di P, à T, è l'istesso, che il denominatore della proporzione di p, à t, (Cioè il medesimo, che è denominatore della proporzione di A, à B, ouero di a, à b,) & che anco il denominatore della proporzione di T, ad S, è l'istesso, che il denominatore della proporzione di t, ad s, (cioè il medesimo, che è denominatore della proporzione de' cubi C, & V, ò de' cubi c, & u,) ò vogliamo dire, perchè P, contiene T, per il denominatore della proporzione di P, à T, & T, contiene S, per il denominatore della proporzione di T, ad S, & sia G  $3\frac{1}{2}$ , ne segue, che P, conterrà S, per il duto di D  $1\frac{1}{2}$ , in G  $3\frac{1}{2}$ , & sia H  $5\frac{1}{2}$ . Et dall'altra banda similmente, p, conterrà s, per il duto de' due denominatori delle proporzioni di p, à t, & di t, ad s, ma essi due denominatori sono gl'istessi D  $1\frac{1}{2}$ , & G  $3\frac{1}{2}$ , che sono anco denominatori delle proporzioni di P, à T, & di T, ad S, per la egualità d'esse proporzioni, onde anco il duto del D  $1\frac{1}{2}$ , via il G  $3\frac{1}{2}$ , da quest'altra banda sarà eguale ad H  $5\frac{1}{2}$ , duto del D  $1\frac{1}{2}$ , via il G  $3\frac{1}{2}$ , dalla prima banda, ma questi dotti mostrano l'vno la quantità delle volte, che P, contiene S, cioè il denominatore della proporzione di P, ad S, & l'altro la quantità delle volte, che p, contiene s, cioè il denominatore della proporzione di p, ad s, però essendo essi denominatori eguali fra loro (anzi l'istesso) ne segue, che anco eguali fra loro siand le proporzioni da essi denominate, cioè, che dal quadro quadrato P, al quadro quadrato S, sia come dal quadro quadrato p, al quadro quadrato s, che è quel o, che si volea mostrare. Il medesimo si conosce auuenire se in vece di quattro quantità proporzionali se ne pigliano tre continue proporzionali, cioè,

cioè, che delle quattro quantità proporzionali la seconda, & te. 2. a per essere eguali donentano una istessa, che serua per consequente alla prima, & per antecedente alla terza.

Similmente se le quantità proporzionali, ò le continue proporzionali siano quante si vogliano, si potrà mostrare nel medesimo modo, che i quadri quadrati loro nel medesimo ordine sono proporzionali.

Et così con modo simile si potrà mostrare, che le quante quantità si vogliano siano proporzionali, ò continue proporzionali, anco il loro relati, il loro quadri cubi, il loro secondo relati, il loro quadri quadri quadrati, il loro cubi cubi, il loro quadri primi relati, i loro terzi relati, il loro cubi quadri quadrati, il loro quarti relati, il loro quadri secondo relati, i loro cubi primi relati, il loro quadri quadri quadrati, il loro quinti relati, i loro quadri dubbi cubi &c. in infinito nel medesimo ordine faranno proporzionali.)

Dicendosi. Di tre quantità continue proporzionali, la media è 6. & la somma de i quadrati delle estreme è 97, noi potremo fingerci anco il quadrato della media, quale è 36, dir poi con un altro quesito. Di tre quantità continue proporzionali la media è 36. & la somma dell'altre due è 97. si domanda ciascuna d'esse, & trouatele esse faranno le due parti distinte del 97. cioè i due quadrati di ciascuna delle estreme, onde presene le 36, esse 36, faranno le due estreme cercate. Sia dunque, che delle due quantità estreme, la somma delle quali è 97, (essendo la media 36.) l'una sia 12. & l'altra il resto fino a 97. cioè 97 m 12. il prodotto loro è 97 x m 12. il che è eguale al quadrato della media, cioè a 1296. per il che tenuto il m, giungendo 72. a ciascuna parte, haueremo

$$12 \pm 72 = 1296. \text{ eguale a } 97^2$$

9409. quadri  
ficanza 5184. quadri

relia 4225. quadri. la 36. è 42. che giunto, & cattuato a 27. mita del numero della 2. fa 81. & 16. per le due valore della 2. Onde 81. sarà l'una delle estreme, & 16. l'altra; ma perche queste sono i quadrati delle estreme principali, che si cercano, le 36. di queste 81. & 16. cioè 9. & 4. faranno le due estreme principali cercate, la media fra le quali è 6.

Da questa considerazione molto benissimo si conosce la facilissima trasmutazione dell'Equatione d'12. & numero eguale a 2. nell'Equatione d'12. & numero eguale a 2. restando fermi i medesimi numeri per ordine in ambedue, mutandosi solo il segno 2. in 12. & il segno 12. in 2. perche nell'hauer detto. Di tre quantità continue proporzionali la media è 6. & la somma de' quadrati delle due estreme è 97. si domanda ciascuna d'esse, essendosi con la posizione dell'vna d'esse posta 12. peruenuto ad 1296. eguale a 972. Ma nell'hauer detto (seruendoci de i quadrati delle tre quantità continue proporzionali, che anch'essi sono tre quantità continue proporzionali.) Di tre quantità continue proporzionali la media è 36. & la somma delle due estreme è 97. essendosi con il medesimo modo di posizione peruenuto ad 1296. eguale a 972. in ciascuna delle quali Equationi il 1296. è sempre l'istesso, perche è il quadrato di 36. quadrato di 6. media, & il 97. è sempre l'istesso, perche è la somma de' quadrati delle due estreme, vediamo, che questa Equatione d'12. & numero eguale a 2. si trasforma in questa d'12. & numero eguale a 12. ma che in questa si viene a trouare le due estreme delle tre quantità continue proporzionali che sono i quadrati delle due estreme delle cercate nel principal quesito, onde di esse due, cioè di 16. & di 81. si quadrati pigliando le 36. esse faranno le due quantità estreme principalmete cercate, per il che vediamo la regola dell'Equatione d'12. & numero eguale a 2. seruire anco all'Equatione d'12. & numero eguale a 12. ma che si viene a trouare il quadrato della quantità cercata, cioè il valore del 2. per il che presene la 36. ne resulta il valore della 2. Onde qui deriuando la regola d' detta Equatione d'12. & numero eguale a 2. potremo dire.

Quando 12. & numero sono eguali a 2. Cauisi il numero dell'Equatione dalla mita del numero de' 2. & del restante si pigli la 36. qual 36. si giunga, & caui alla mita del numero de' 2. & di ciascuno de i due risultanti (che è valore del 2.) si pigli la 36. che ciascuna d'esse due 36. sarà vna delle due valore della 2. che ella può hauere in questa Equatione d'12. & numero eguale a 2. Et questa è la Regola, di che si fece mentione a facciate 17.

Et considerando l'istesso, cioè, che di tre quantità continue proporzionali ancora i quadrati loro sono continui proporzionali, ò formano tre altre quantità continue proporzionali (se bene in diuersa proportionalità, poiche la proportion de i quadrati di due quantità è duplicata alla proportion d'esse due quantità) vedremo, che al medesimo modo anco gl'altri due Capitoli, o Equationi compagni a questo, cioè doue occorrono 12. 2. & numero si possono trasmutare ne gl'altra

te gl'altri dui Capitoli doue occorrono 1. 2. & numero à loro corrispondenti, & hauere se istesse regole, auuertendo nondimeno . che il valore della 2. ne gl'inferiori viene à mostrare il valore del 2. nei superiori; Ma di più se auuertiremo, che quando tre quantità sono continue proporzionali, non solo i tre quadrati loro sono anco continui proporzionali, ma i loro cubi, i loro quadri quadrati, i loro relati, i loro quadri cubi, &c. in infinito sono pur anco continui proporzionali, vedremo, che nel modo mostrato di sopra, in tutte le Equationi doue essino due dignità, & numero, la dignità inferiore sia la 32, quadra della superiore. ò vogliamo dire, che la dignità superiore sia il quadrato della inferiore, cioè quando faranno 4. 3. & numero. Quero 8. 2. & numero. Quero 16. 4. & numero, &c. ciascuna di queste si potrà trasmutare nelle minime, ò più basse inferiori à loro corrispondenti, doue sono 2. 2. & numero, restano sempre i nomi tutti gl'istessi. Et ordinatamente l'vna alla similitudine dell'altra; ma nondimeno il valore della 2. cioè della minore delle due dignità 2. & 2. che si trouano nelle più basse, ò inferiori, verrà à mostrare il valore della dignità minore (che è 32, quadra dell'altra dignità maggiore) nell'Equatione à lei corrispondente superiore, ò più alta; Che per esempio hauendo 1. 4. 16. 3. eguale à 176. questo farà come se si hauesse 1. 2. 4. 2. eguale à 176. ma il valere della 2. qui che è 8. verrà ad essere, ò mostrare il valore del 3. in quella, onde se 1. 3. vale 8. sapremo, che la 2. quale è 32, cuba del 3. valerà la 32, cuba d'8. cioè 2. Et così quando 1. 4. 16. 3. sia eguale à 176. troueremo, che la 2. vale 2. Et ben si vede, che perciò 1. 3. valerà 8. & vn censo cubo, ò quadro cubo valerà il quadrato d'8. cioè 64. che con 112. valore di 14. 3. fa 176. come si ricerca.


Veda mò lo Studente come queste Dottrine sono mirabili, poiche da alquanto di splendore di dimostrazione, ò auuertimento si illumina l'intelletto accorto, & atto, talmente, che acquistando di continuo maggiore attitudine, v'è speculando, & trouando continue inuentioni; Ma auuertisca à non si andar straccando, ò tétando in vano le inuentioni con lo semplice esperimento di numeri, ò con il compasso, &c. ma sempre accompagnato con qualche lume di considerazione, & discorso naturale, ò artificiale, che così acquistarà Dottrina, & diletto, & dalle speculationi cerchi sempre cavar costrutto, riducendole à qualche operatione, ò per vfo, ò per ornamento della Dottrina, acciò non paiano aride, & inutili (come patono à molti le Dimostrazioni Geometriche Euclidiane, & d'altri famosi, & Eccellenti Mathematici, poiche non fanno ridurle all'vfo, estraendone le Regole numerali, & lineali, per l'operare in numeri, ò in linee) che se giudiciosamente si andrà speculando, si potrà da esse Dimostrazioni in apparenza secche (come anco si fa da terreno simile, deriuandone minere, & neque conuine, commodi, & velli) deriuare operationi di giouamento, & piacere, Et per darne in esempio; & sia per hora in figgero di pesi, & forze da mouerli, ò condurli, &c. Sia che lo Studente si abbatta à leggere la noua Propositione dell'ottauo libro di Pappo Alessandrino, tradotto dal Greco in Latino dall'Eccellentissimo Mathematico M. Federigo Comandini Vrbinato; dico, che ingegnandosi di estrarre da essa Propositione Geometrica il modo pratico, egli potrà fingerli vn Quesito simile, dicendo. Vn peso si conduce per il piano A B, con la forza di quattro Buoi ordinarij, cioè, si bisognau quattro Buoi, si domanda, volendolo condurre su per l'erta strada B C, quanti Buoi ordinarij bisognerà? Et per farlo, accomodandosi virtualmente al modo Geometrico, si potrà, segnato, ò preso vn punto nell'erta B C, & sia per hora l'istesso termine B, da essortare vna perpendicolare à detta B C lunga quanto si vogli, & sia B D, poi dal D tirate la D E, equidistante al piano A B, (cioè à liuello) & dal B, ad essa D E, si tiri la perpendicolare B F, & dalla D E, si seghi la D G, eguale alla D B, poi si misurino G F, & F D, & sia che si trouino essere G F 6. & F D 9. si che tutta G D sarà 15. (eguale alla D B,) poi sempre si multipli il 4. numero delli Buoi dato, per tutto il 15. G D, che fa 60. & quello prodotto sempre si parta per il 6. G F che ne viene 10. qual 10. è il numero delli Buoi cercato, ò domandato, che è di bisogno per condurre nel medesimo modo il medesimo peso su per l'erta B C. Quero forsi più facilmente per chi non sapeffe calcolare à baltanza, trouati G F, essere 6. & tutta G D, misurata essere 15. veggasi quante volte entri il 6. nel totale 15. & v'entra volte 2½. che questo 2½. mostrerà, che anco volte 2½. di tanta forza data bisognano, cioè volte 2½. li quattro Buoi detti; onde preso il 4. le volte 2½. che ne risultano 10. si dirà, che 10. Buoi bisogna.

Et se l'erta fusse la B C, operando, su la quale la G F, entraria nella G D, ouero B D, volte 3½. in circa, così anco volte 3½. li quattro Buoi, che fa 14. Buoi, si dirà, che vi bisognassero.


Et nell'altra figura doue l'erta si pone essere la B C, perche la G F, nella G D, (ouero B D, sempre eguali) entra volte 7½. in circa, si dirà, che volte 7½. li quattro Buoi, cioè 30. Buoi fariano di bisogno.

Ma dall'operare in linee deriuiamone anco il modo facile da potersi ponere in opera da ogni sorte di persone, & lo trouaremo Considerando, che le rette impuriate in questo

negotio sono D B, che fa angolo retto con l'erta, & D F G, (che si fa sempre eguale ad essa D B,) che è equidistante al piano, o à liuello, & il punto F, nella D G, che è sempre mostrato dal segamento, che fa in essa la perpendicolare al piano, che si parte dal punto B, commune alle D B, & B C, erta data; onde il piano, la à lui perpendicolare B F, & la F G, fanno vna squadra doppia, cioè vno strumento così fatto.




Et perche il punto D, è sempre alla dirittura della F, & G, si potrà dire, che le D G, F B, A, formino vno strumento di tre squadre così. Onde conistrutto con tre righe sode di legno, ferro, o altro vno strumento così fatto, noi ce ne potresimo seruire in tali casi così; Essendo il piano dato A B, & l'erta la B C, ponremo lo strumento con la riga A B, sul piano, vnendo il punto B, dello strumento con il B, angolare del piano, & erta, solleuandolo in aria, sì che la B F, sia perpendicolare al piano; Et hauendo vn'altra squadra pure di legno, ferro, o altro, ponremo l'vno de' suoi due bracci sù l'erta B C, sì che nel termine B, dell'erta, & dello strumento sia l'angolo della squadra, & l'altro braccio voltato verso la G D, si allunghi con la vista (efmode) o con vn regolo, o spago per il diritto, finche concorra con la G D, dello strumento, allungata anch'ella, se occorrerà, per l'istesso verso, & segnato il punto del cōcorso, & sia D, si pigli la lunghezza della retta D B, & portata sù la D G, dello strumento equidistante al piano si segni il punto G, doue ella termini, & allhora misurata la parte G F, si veda quante volte ella entri nella totale G D, ouero B D, che tal numero di volte mostrerà, che tanto numero di volte bisognerà moltiplicare il numero de' Buoi, o forza data d'huomini, o d'altra machina equiualeute, accio ella possa seruire à condurre il peso proposto sù l'erta B C. Et da questo principio ampliando la cognitione in tale studio, si potrà anco facilmente venire à trouar modo di soluere altri quesiti di tal qualità, come per esemplo faria il seguente.




A tirare vn peso sù per l'erta B C, bisognano 6. Buoi, o forse, si domanda à tirarlo sù per l'altra diuerfazerza C F, quanti Buoi, o forse della medesima forte bisogneranno? Ouero dicendoci. Vna Carozza, o Carro, che pesa libre 560. con 6. persone (o mazzi di Canape) che pesano libre 200. per ciascuno o tirata commodamente da quattro Caualli sù per l'erta B C, si domanda quando si arriuì alla maggiore erta C F, accio che gl'istessi quattro Caualli possino seruire à tirare nel medesimo modo, quante persone, o che peso bisognerà scemarli.

Sia l'angolo D B C, fatto dal piano, o liuello con l'erta B C, di gradi 176. che perciò l'acuto C B, resta di gradi 4. Et l'angolo n C F, fatto dal liuello equidistante all'Orizonte, & dall'erta C F, sia di gradi 173. che perciò l'acuto C F, resta di gradi 7. intendendosi l'angolo retto, o à squadra essere gradi 90.

Ma comiene auuertire, che doue le Speculationi Mathematiche, & inuentioni loro si congiungono con la materia, o materie diuerse, per ridurle all'vso, è necessario hauere bastevole pratica, & esperienza delle qualità loro, & de gl'ostacoli, che possono apportare, & in questi casi



in particolare hauer notizia delle forze de gl'animali, & huomini, douendosi enseruire come strumenti, & sapere se la forza poniamo di otto animali, riesce in pratica dupla alla forza di quattro, in occasione di tirar pesi, &c. O se tirerà peso d'upla, sì come il numero 8. è duplo al numero 4. Et se noti, andarne



& così tutti operare cosa di rilieuo nel tirare, che ne anco egli aggiugné doui, che numero d'huomini si vogli manco si tirará, perché le forze, che se gli aggiungerlo restaria non inutili, non si potendo accomodare all'aiuto bisognoue. Et circa al tirar pesi per diuerse erce, si potria dare erta tale, che a pena gl'huomini vi potriano salire senza tirarsi dietro peso importate. Onde in ciò vn peso poniamo, che sù vn colle, ò s'iro poco eleuato, ò erto, si tirasse con 6. huomini, ò animali, in vn' altro sito montuoso molto ripido, forsi non si potria tirare con numero alcuno d'huomini, ò animali, che a pena vi potriano tirare, ò condurre le persone, ò corpi loro; onde in tali casi conuerria vsare forze altratte di strumenti atti, aiutati anco da forze animate, &c. Il che tutto si nota per auuertire gli Studiosi, che come si dice, *Virtutem posuere Di sudore parandam*. Et come scrive l'elegantissimo Tasso, *Sopra dell'erto, & saturo colle Della virtù ripello è il nostro bene, Chi non gela, & non suda, & non s'effolle Dalle vie del piacer, là non peruiene*; Poiche con la esperienza, & cognitione di molte Dottrine, si peruiene a sicura Scienza; Et così studiando sempre per il comodo, & salute vniuersale, si acquista anco, & honore, & salute per se, che come scrive l'istesso Poeta, *La via d' honor, della salute è via*; Et dicono i Legisti, *Vigilantibus, & non dormientibus iura subueniunt*. Onde sì come i Cieli sono sempre in moto, i Mari sempre l'ano il flusso, & refluxo, ò sempre vanno agitati, i fiumi sempre gli conducono l'acqua, le vene d'essi sempre ne sorgono; Et tutte le cose animate sono sempre in qualche modo in moto, è ben douere, che l'huomo anco si eserciti sempre ad apportare vtile, & ornamento al Mondo, secondo la sua vocatione, attitudine, & possibilità ad laudem Dei, & æterni omnipotentis.

Et così lo Studente conosce, che facendosi esperto nelle Dottrine de' numeri, & linee, potrà con l'accorto giudicio non solo come da surgenti fonti deriuare riuì, & fiumi d'inuentioni, ma anco facilitarle di modo, che si possa ageuolmente intendere l'uso loro da ogni mediocre intelletto, a gloria di N. S. Dio, & comodo ornamento del Mondo.

Sia che si dica. Di tre quantità continue proportionali la prima è 9. & la differenza de' quadrati dell'altre due è 20. si domanda ciascuna di loro. Ponendo la prima 2. il suo quadrato è 4. &

che partito per 9. ne viene  $\frac{4}{9}$ , per la terza, il suo quadrato è  $\frac{16}{9}$ , & il quadrato della seconda è 12. Onde se la seconda sarà maggiore della terza, il quadrato 12. sarà maggiore del quadrato  $\frac{16}{9}$ , però cauto  $\frac{16}{9}$ , da 12. che resta 12  $\frac{8}{9}$ , questo sarà eguale a 20, cioè 12 eguale a  $\frac{16}{9}$  p 20, cioè 81 2. eguale a 1 p 1620. Che la 2. vale 6. & anco vale 32 45. perché le tre quantità continue proportionali faranno 9. 6. 45. Ouero anco 9. 32 45. 5.

Ma se la seconda fusse minore della terza, il quadrato 12. sarà minore del  $\frac{16}{9}$ , quadrato della terza, però cauto 12. da  $\frac{16}{9}$ , che resta  $\frac{8}{9}$ , m 12. quello sarà eguale a 20. Ouero ad 12. minore giunto il 20. la somma 12 p 20. sarà eguale all'  $\frac{16}{9}$ , che ridotto ad 12. partendo ogni cosa per  $\frac{16}{9}$ , numero de' 9. si hauerà 12. p. 81 2 p 1620. Onde la 2. valerà 32 45. & quello sarà la seconda, al quadrato della quale, che è 32 45 p 405, giunto 20. che è la differenza d'esso al quadrato della terza maggiore, fa 3260 p 60, cioè 60 p 3260, & quello è il quadrato della terza, però essa terza sarà 3260 p 3260, cioè 32 45 p 45. Et così le tre quantità faranno la prima 9. la seconda 32 45 p 405, & la terza 3260 p 405. Et ben si vede elle essere continue proportionali, poiché a moltiplicare

6561. quarti  
6480. quarti  
resta 81. quarti. la 2. è 45.  
con 405. & da 405. fa 45.  
36. che sono le due valute del  
2. però la 2. vale 32 45. & anco  
vale 32 45. cioè 6.  
6561  
6480  
130. 2. quarti è la  
somma, la sua 2. è 3260, da  
giungerli 405. mite del numero  
de' 2. & fa 3260 p 405. che è

il va-

care

il valore del  $x$ . però la  $x$ . vale  $32\frac{1}{2}$   
 $32 \times 260\frac{1}{2} \dot{p} 40\frac{1}{2} L$ . & è la seconda,  
 il quadrato dunque della terza sa-  
 rà  $60\frac{1}{2} \dot{p} 32 \times 260\frac{1}{2}$   
 $3260\frac{1}{2}$

resta  $400$ . la  $32$ . è  $20$ . la mi-  
 tà è  $10$ . che giunto, & cauato d'  
 $30\frac{1}{2}$ . fa  $40\frac{1}{2}$ . &  $30\frac{1}{2}$ . le loro  $32$ . so-  
 no  $32 \times 40\frac{1}{2}$ . &  $4\frac{1}{2}$ . però  $32 \times 40\frac{1}{2} \dot{p} 4\frac{1}{2}$ .  
 sarà la terza.

ne d'1  $\ast$  & numero eguale a  $x$ . che ha due valute della  $x$ . ciascuna delle quali vediamo seruire al  
 nostro quesito, & perciò allhora il quesito ha due risposte. Onde ne viene ad hauere in tutto tre.  
 Et così si vede la mirabil forza della Dottrina Algebratica, poiche ella ci fa venire in cogniti-  
 one di tutte le cose, ci auuertisce di tutti i particolari, & ci insegna le Regole, & in numeri, & in  
 linee da elequirle.

Chi volesse accorgersi se alcuno fusse esperto nell'Algebra, potrà pigliarne occasione di qual  
 facendoli questo quesito, o simile, ma in questo modo.

Io hò tre quantità continue proportionali, delle quali la prima è  $9$ . & la differenza de' qua-  
 drati dell'altre due è  $20$ . domando le altre due, che hò. Et egli hauere tre diverse carte dove fus-  
 sero diuerfamente, cioè particolarmente in ciascuna d'esse vna soluzione, in l'vna  $9$ .  $6$ .  $4$ . nell'al-  
 tra  $9$ .  $32 \times 45$ .  $5$ . & nell'altra  $9$ .  $32 \times 32 \times 260\frac{1}{2} \dot{p} 40\frac{1}{2} L$ .  $32 \times 4\frac{1}{2} \dot{p} 4\frac{1}{2}$ . Et rispondendo quel tale per  
 qual si vogli di loro, verbi gratia per  $9$ .  $6$ .  $4$ . allhora cauau fuori, o pigliare vna dell'altre, & di-  
 re non è così, perche io hò queste, cioè  $9$ .  $32 \times 45$ .  $5$ . (dell'altra) Et rispondendo per due, cioè po-  
 niamo per  $9$ .  $6$ .  $4$ . &  $9$ .  $32 \times 45$ .  $5$ . allhora pigliar l'altra, & dire non è così, perche io hò queste  $9$ .  
 $32 \times 32 \times 260\frac{1}{2} \dot{p} 40\frac{1}{2} L$ .  $32 \times 4\frac{1}{2} \dot{p} 4\frac{1}{2}$ . Et rispondendo per tutte tre si vedria lui scire esperto, & ac-  
 corto.

Ma bisogna bene auuertire di non dare il quesito largo modo. Perche dicendosi,  
 Di tre quantità continue proportionali la prima è  $9$  & la differenza de' quadrati della seconda,  
 & terza è  $20$ . si domanda esse seconda, & terza, allhora qual si vogli risoluzione, che desse seria  
 di bastanza per la soluzione del quesito.

Ancora dicendosi. Di tre quantità continue proportionali la prima è  $9$ . & il quadrato della  
 seconda supera il quadrato della terza in  $20$ . noi gli veressimo d'insegnare, o auuertirlo, che la  
 prima è la maggiore delle due estreme. Et allhora il quesito ha due soluzioni.

Et dicendosi. Di tre quantità continue proportionali la prima è  $9$ . & il quadrato della secon-  
 da è  $20$ . manco del quadrato della terza, noi gli veressimo a mostrare, che la prima è la minore  
 delle due estreme. Et allhora il quesito ha vna sola soluzione.

Però a chi hà da dare, & ricuere questi conuiene essere ingegnoso, accorto, & esperto, ha-  
 uendo, come ci dice, auorato l'intelletto alla mirabile pietra Algebratica, accio sia atto a pe-  
 netrare nelle occorrenti fortilità, & speculationi.

Ma di lle tre quantità continue proportionali essendo la prima  $9$ . & la differenza de' quadrati  
 dell'altre due  $20$ . posso il quadrato della seconda  $1 \times \dot{p} 10$ . supponedo che ella sia maggiore del-  
 la terza. Et il quadrato della terza  $1 \times \dot{m} 10$ . accioche il quadrato della seconda sia  $20$ . di più,  
 che il quadrato della terza, allhora la terza sarà  $32 \times 1 \times \dot{m} 10 L$ . il che multiplicato via la prima  $9$ .  
 fa  $32 \times 1 \times \dot{m} 810 L$ . & questo è eguale al quadrato della seconda, cioè  $1 \times \dot{p} 10$ . & quadrando  
 ciascuna parte p'leuata la  $32 L$ . haueremo  $1 \times \dot{p} 20 \times \dot{p} 100$ . eguale a  $81 \times \dot{m} 810$ . Cioè  $1 \times \dot{p} 910$ .  
 eguale a  $20 \times 1$

3721. quarti

3640. quarti

81. quarti. la  $32$ . è  $4\frac{1}{2}$ . che  
 giuto, & cauato d'  $30\frac{1}{2}$ . mità del 61.  
 numero de  $x$ . fa  $35$ . &  $26$ . quali so-  
 no le due valute del  $x$ . onde il qua-  
 drato della seconda posto  $1 \times \dot{p} 10$ .  
 sarà  $35 \dot{p} 10$ ; cioè  $45$ . O anco sarà  
 $26 \dot{p} 10$ . cioè  $36$ . Et il quadrato del-  
 la terza posto  $1 \times \dot{m} 10$ . sarà  $35 \dot{m} 10$ .  
 cioè  $25$ .

Ma supponendosi la seconda essere minore della terza,  
 allhora il quadrato della terza sarà da ponere  $1 \times \dot{p} 10$ . &  
 il quadrato della seconda  $1 \times \dot{m} 10$ . Onde la terza sarà  
 $32 \times 1 \times \dot{p} 10 L$ . & questa multiplicata per la prima  $9$ . pro-  
 durrà  $32 \times 1 \times \dot{p} 810 L$ . il che sarà eguale al quadrato del-  
 la seconda, cioè ad  $1 \times \dot{m} 10$ . & quadrando le parti p'leuare  
 la  $32 L$ , haueressimo  $81 \times \dot{p} 810$ . eguale a  $1 \times \dot{m} 20 \times \dot{p} 100$ .  
 Cioè  $101 \times \dot{p} 710$ . eguale ad  $1 \times \dot{p}$ . Però  $1 \times \dot{p} 10$ . sarà  $60\frac{1}{2}$   
 $\dot{p} 32 \times 260\frac{1}{2}$ . per il qua-  
 drato della terza, per-  
 ilche essa terza sarà  $32 \times$   
 $40\frac{1}{2} \dot{p} 4\frac{1}{2}$ . Et il quadra-  
 to del-

10201. quarti

2840. quarti

13041. quarti

$32 \times 260\frac{1}{2} \dot{p} 50\frac{1}{2}$ . vale il  $x$

cioè 35. Onco sarà 26 m 10. cioè 26. Perliche essendo il quadrato della seconda 45. ò 36. essa seconda sarà 32. 43. ò 6. Et essendo il quadrato della terza 35. ò 16. essa terza sarà 5. ò 4. Et però haueremo 9. 32. 45. Ouero 9. 6. 4.

quadrato della seconda, ne viene  $\frac{16}{12}$  per la terza, il suo quadrato è  $\frac{1296}{12}$ . & il quadrato della prima è 22. hora conuien stabilire quale delle due estreme si pigli per minore, cioè la posta 12. ò l'altra. perche conuien cauare il quadrato della minore dal quadrato della maggiore. Sia dunque, che 12. sia la minore, onde cauando 12. suo quadrato da  $\frac{1296}{12}$ . restará  $\frac{1296}{12}$  m 12. & è eguale a 65. differenza data. Cioè 12 p 65. eguale a  $\frac{1296}{12}$ . Et leuando il rotto si hauerá 12 p 65 x. eguale a 1296. Però come se haueremo 12 p 55 x. eguale a 1296. noi Al quadrato di 32. mità del numero delle 2. qual quadrato è 1056. giungeremo il numero 1296. & fa 2352. del quale presa la 32. ella è 48. dalla quale cauato 32. mita del numero de' 2. resta 16. & questo è la valuta del minore Equatione d' 12 p 65 x. eguale a 1296. però la 2. valerà 32. cioè 4. però 4. sarà la quantità estrema minore posta 12. Ma volendo, che la posta 12. sia la maggiore delle due estreme. Noi dal suo quadrato 144. cauato  $\frac{1296}{12}$  che sarà il quadrato dell'altra minore, restará 12 m  $\frac{1296}{12}$  il che sarà eguale a 65. & leuato il m. si hauerá 12. eguale a  $\frac{1296}{12}$  p 55. Et leuato il rotto sarà 12. eguale a 1296 p 55 x. Onde come se haueremo 12. eguale a 1296 p 65 x. al quadrato di 32. mita del num. delle 2. giungeremo il 1296. numero dell' Equatione, & della somma 2352. pigliharemo la 32. che è 48. & ad essa giungeremo 32. mita del numero delle 2. che fa 81. & questo 81. è la valuta del 2. nell' Equatione d' 12. eguale a 65 x p 1296. però la 2. in essa Equatione valerà 9. ond 9. sarà la quantità estrema maggiore posta 12. Ouero delle due quantità estreme sia la minore 4. il suo quadrato è 12. però il quadrato della maggiore sarà 65 p 12. & ella sarà 32. 43. p 12. che moltiplicata via 12. che è l'altra fra 32. 43 x p 12. il che è eguale a 36. quadrato della media, & quadrando le parti per leuare la 32. si hauerá 12. p 65 x. eguale a 1296. come di sopra. & però la 2. valerà 4. per la quantità estrema minore. Ouero di dette due quantità estreme sia la maggiore 12. il suo quadrato è 144. dal quale cauato 65. differenza de' quadrati delle estreme, resta 12 m 65. per il quadrato della minore, onde ella sarà 32. 12 m 65. quale moltiplicata via 12. maggiore, cioè via 32. 12. fa 32. 12 m 65 x. qual prodotto d'esse estreme è eguale a 36. che è il quadrato della media, & quadrando le parti haueremo 12 m 65 x. eguale a 1296. cioè 12. eguale a 65 x p 1296. come di sopra, però la 2. valerà medesimamente 9. & sarà la quantità maggiore delle due estreme.

Se mò lo Studente passará auanti alla speculatione d'altre Equationi Algebriche, ricordisi di star sempre molto auuertito, che questa Dottrina Algebratica ricerca intelletto accorto, & vinace. Et si riposi quando le operationi numerali, o altre l'habbino affaticato mediocrement, perche passando questo segno, egli si indebolirà, & nõ vedrà ne anco le cose molto chiare, che possono succedere; Et noti bene, che conuien sempre andar tentando, ò cercádo le Regole dell' Equationi con qualche lunie, ò fondamento sicuro. Et molte Equationi potranno hauere diuerse valute della 2. se bene parerà, che n'habbino vna sola, che per esempio Hauẽdo 13 p 21 x.

Si hà 13 p 21 x. eguale a 92 p 9. Et si troua la 2. valere 3 p 32. 6. Del che si fa la proua numerale.

32. 65. 34. è quanto 32. 6. via 33. 32. 26. 34. è quanto 32. 6. via 31. la sòma è quanto 32. 6. via 31. cioè quanto 32. 6. via 32. 26. che produce 32. 17496.

13 è 81 p 32. 65. 34.  
21 x 63 p 32. 26. 46.  
sòma 144 p 32. 17496  
che è l'vna parte de' l'Equat.  
9 x cono 33. p 32. 17496  
il numero 9  
somma 144 p 32. 17496  
che è l'altra parte, & c. eg. all'  
vna parte già trouata sopra,  
detta, però si vede esser vero,  
che la 2. vale 3 p 32. 6.

eguale a 92 p 9. Adotando la regola data dal Bombellone: a sua mirabile Algebra a facciate 334. in questa Equatione si trouará la 2. valere: p 32. 6. come è vero, perche il 2. valerà 15 p 32. 216. & il 3. valerà 81 p 32. 65. 34. Onde 13 p 21 x. cioè 21 p 32. 65. 34. con 63 p 32. 26. 46. che fanno in tutto 144 p 32. 17496. p vna parte. Sarà quanto 9 x p 9. cioè quanto 135 p 32. 17496. con 9. che fanno

3 p 36. vale la z  
 3 p 36  
 15 p 36. vale il z  
 3 p 36  
 82 1296  
 3 6  
 4 8  
 8 1

3. via 36. è quanto  
 3. via 36. via 36. cioè  
 quanto 3. via 6. via 36.  
 cioè quanto 18. via 36. & cō  
 15. via 36.  
 fa quanto 33. via 36. cioè  
 quanto 3689. via 36. che  
 produce 36534.  
 però 81 p 36534. vale il 3.

fanno in tutto medefimamente 124 p 36  
 7496. per l'altra parte come contiene:  
 Et di più se auuertiremo vedremo anco  
 la z. valere 3. che così ita. valerà 9. & il  
 3. valerà 27. perche 13. cioè 27. con  
 112. cioè con 63. fa in somma 90. come  
 li 92. che sono 81. con il numero 9. che  
 fanno pure 90. Onde qui vediamo la z.  
 hauere queste due valure, che sonò li  
 na 3 p 36. & l'altra 3.

Ancora habiēdo 13 p 12. eguale a 62 p 32. Adoprando la Regola data dal Bombello a fac-  
 ciate 141. in questa Equatione, si troua la z. valere 36 15 p 2. come è vero, pesche la z. valrà

Si hà 13 p 12. eguale a 62 p 32. Et si troua la z. valere 36 15 p 2.

Del che qui li fa la proua numerale.

36 15 p 2. vale la z. 2. via 4. vol. 36 15 li 62. sono 114 p 6. volte 36 140 24. v. 36 15  
 129 p 36 140. vale il z. cioè 8. via 36 15 le 32. sono 6 p 3. volte 36 15 3. v. 36 15  
 & 19. via 36 15 la somma è 120 p 36 10935. 27. v. 36 15  
 3600 in tutto 17. via 36 15 che è quanto l'13 p 22. però 36 729. v. 36 15  
 38 p 60 tutto 17. via 36 15 si vede esser vero, che la z. fa 36 10935.  
 98 p 36 10935. vale il 3. cioè 36 1719. via 36 15  
 22. è il numero giuntoli fa 36 10935. vale 36 15 p 2.  
 120 p 36 10935. importa l'13 p 22.

129 p 36 140. & il 3. valerà 98 p 36 10935. onde 13 p 22. che fa in somma 120 p 36 10935. farà  
 quāto 62. che importano 114 p 36 8640. giunti a 32. che importano 6 p 36 135. & fanno in soma-  
 ma l'istesso 120 p 36 10935. come bisogna; Et di più si vede, che nella medesima Equatione la z.  
 può valere, o vale 2. poiche valendo il 24. & il 38. l'13 p 22. importerà 8 p 22. cioè 30. Et an-  
 co li 62 p 32. cioè 24 p 6. che fa 30. importeranno, o faranno l'istesso 30. perche qui ancora si  
 vede, che la z. ha due valure, & sono 36 15 p 2. l'vna. Et 2. l'altra; Con che si ponerà fine a que-  
 sto Trattato, ringraziando N. S. D. I o di quanto ci ha concesso.

Soli Deo omnis honor, & gloria.

# PROPOSITIONI, OVERO OPERATIONI.

Nelle quali si vengono à ponere in vso le Equationi, ò Capitoli dell'Algebra, ò Regola della cosa già mostrata.

*Operatione prima. Data la differenza di due quantità, & la somma loro, trouare ciascuna d'esse.*



**S**I A D 40. la differenza delle due quantità, & S 100. la somma loro, Per trouare distintamente ciascuna d'esse, Pono A, minore essere 1 2. perliche B, maggiore sarà 1 2. & 40. di più, cioè sarà 1 2 p 40. onde la soma loro 2 2 p 40. verrà ad essere eguale à 100. somma data, che leuando il 40. da ciascuna banda haueremo 2 2. eguale à 60. perliche partito il 60. per 2. numero delle 2. l'auuenimento 30. sarà il valore della 2. però la minore posta 1 2. è 30. & la maggiore 30 p 40. cioè sarà 70. Regola.

Per estrarre da questa Operatione Algebratica la regola numerale da risolvere questo quesito, ò simili con le semplici operationi numerali, vediamo che essendo peruenuti à 2 2. eguali à 60. il 60. è sempre quel numero, che resta à cauare D 40. differenza data da S 100. somma data, qual 60. si parte sempre per 2. numero delle 2. che è sempre 2. (numero denotante le due quantità) & l'auuenimento 30. è sempre la minor quantità, onde per Regola si potrà dire. Cauisi la differenza data delle due quantità dalla somma loro, che la metà del restante sarà la quantità minore.

Et se ponremo non la minore, ma la quantità maggiore essere 1 2. la minore perciò sarà 40. di manco, cioè 1 2 m 40. & la somma loro verrà ad essere 2 2 m 40. ma ella deuè essere 100. però 2 2 m 40. è eguale à 100. onde per accomodare il m. gionto 40. à ciascuna parte haueremo 2 2. eguale à 140. perliche 1 2. sola valerà 70. onde la quantità maggiore posta 1 2. sarà 70. & però la minore sarà 30. Regola. Da quest'operare vediamo per regola numerale poter si dire. Giungasi la differenza data delle due quantità con la somma loro, che la metà del composto sarà la quantità maggiore.

Et se hauendo posto la maggior quantità essere 1 2. la cauaremo da 100. somma data, il restante 100 m 1 2. verrà ad essere la quantità minore, & questa cauata dalla maggiore, cioè da 1 2. la differenza sarà 2 2 m 100. il che verrà ad essere eguale à 40. differenza data, onde per accomodare il m. gionto 100. à ciascuna banda haueremo 2 2. eguale à 140. come prima, perliche partendo 140. per 2. numero delle 2. l'auuenimento 70. che è il valore della 2. mostrerà la quantità maggiore, però la minore sarà il resto fino à 100. cioè 30.

Quero se come di sopra posta la minore quantità 1 2. la cauaremo da 100. somma data, il restante 100 m 1 2. verrà ad essere la maggiore, onde da questa 100 m 1 2. cauato la minore 1 2. la differenza loro sarà 100 m 1 2. ma deuè essere 40. differenza data, però 100 m 1 2. sarà eguale à 40. onde per accomodare il m. gionto 1 2. à ciascuna banda, si hauerà 100. eguale à 2 2 p 40. & Ane leuato il numero 40. da ciascuna banda, haueremo 60. eguale à 2 2. come alhora, perliche la 2. valerà 30. & questo 30. sarà la quantità minore.

*Operatione seconda. Data la differenza di due quantità, & la proportion loro trouare effe quantita.*

**S**I A D, differenza di due quantità 1 2. & la proportion della maggiore alla minore come da R 3. ad S 2. Pono A, maggiore essere 1 2. che così cautone D 12. differenza loro, il restante 1 2 m 12. sarà la minore; hora fra 1 2. & 1 2 m 12. deuè essere la proportion, che è da 3. à 2. però moltiplicando il primo antecedente 1 2. per il secondo consequente 2. il prodotto, che è 2 2. deuè essere eguale à quello, che si produce moltiplicando il primo consequente 1 2 m 12. con il secondo antecedente 3. qual prodotto è 3 2 m 36. perliche haueremo 2 2. eguale à 3 2 m 36. onde accomodato il m. & leuato 2 2. da ciascuna banda, haueremo 36. eguale ad 1 2. & però 1 2. valerà 36. & questo 36. è la quantità maggiore, posta 1 2. dalla quale cauato 12. differenza data loro, il restante 24. sarà la quantità minore, alla quale 24. la 36. ha bene la proportion di 3. à 2.

di 3. a 2. (denominata da  $1\frac{1}{2}$ .) come si ricerca (che anco a partire 36. antecedente a per 24. conseguente, ne viene  $1\frac{1}{2}$ . denominatore della proportionione, che ha la maggiore 36. alla minore 24.) Regola.

Per estrarne la regola numerale considereremo, che essendo peruenuti a 3. in 36. eguale a 2. cioè a 2. eguale a 2. + p 36. il 3. & il 2. numero delle 2. sono i termini 3. & 2. dati della proportionione, che ha la maggior quantità alla minore, & si caua il minor termine 2. dal maggiore 3. & resta la differenza loro 1. che è 1. eguale al numero 36. qual 36. vediamo essere il prodotto deriuante dal moltiplicare 12. differenza data delle due quantità, con 3. termine maggiore delli dui 3. & 2. della proportionione, che ha la maggiore alla minore, & esso prodotto 36. partito per 1. differenza d'essi dui termini, cioè quello, in che il maggiore supera il minore, l'aumento 36. è anco la quantità maggiore, però per regola si potrà dire. Moltiplicarsi la differenza data delle due quantità con il termine maggiore delli dui dati mostranti la proportionione loro, & il prodotto si parta per la differenza d'essi dui termini, che l'aumento farà la quantità maggiore.

Che se la differenza data di due quantità fusse poniamo 7. & la proportionione della maggiore alla minore tripla super quinq.ue partiens uona, cioè, che ha per denominatore  $3\frac{1}{2}$ . & per termini può hauere 32. & 9. noi per trouare esse due quantità moltiplicheremo 7. differenza data per 32. termine maggiore, & il prodotto 224. si partirà per 23. in che il 32. termine maggiore supera il 9. termine minore, cioè per 23. differenze de' dui termini, & l'aumento  $\frac{224}{23}$ . cioè  $9\frac{1}{23}$ . sarà la maggiore quantità, onde la minore sarà 7. di manco, cioè sarà  $2\frac{1}{23}$ . & ben si vede, che  $9\frac{1}{23}$ . a  $2\frac{1}{23}$ . cioè  $\frac{224}{23}$ . a  $\frac{16}{23}$ . & vogliamo dire (lasciando i denominatori 23. poichè è vn'istesso numero) 226. a 63. ha la proportionione data di 32. a 9. cioè di  $3\frac{1}{2}$ . perchè partendo 224. antecedente per 63. conseguente, ne viene  $3\frac{1}{2}$ . cioè  $3\frac{1}{2}$ . come conuenie, O vogliamo dire, perchè 224. antecedente contiene il 32. antecedente 7. volte, come anco il 63. conseguente contiene le medesime 7. volte il 9. conseguente, & però il prodotto di 224. via 9. è quanto il prodotto di 63. via 32. Non si marauigli lo Studente se mi dilato molto in queste Operationi. & Regole loro (quali anco col semplice giudicio naturale si potranno eseguire) perchè lo fis, acciò gli si facci prauo, & accorto nelli diuersi modi d'opere, & dell'estrarre le diuersi Regole da essi, delle quali Regole potrà anco hauere molto beneficio nelle Operationi occorrenti dell'Algebra, potendosi esse applicare a quasi si voglia sorte di quantità, che per esempio dicendosi, Di due quantità la differenza è 5. & p 6. in 4. & la proportionione della maggiore alla minore è come da 8. a 3. si domanda ciascuna di loro, noi hauendo trouata la particular Regola a simili questi, moltiplicheremo la differenza data delle due quantità, cioè 5. & p 6. in 4. per 8. termine maggiore della proportionione d'8. a 3. & produce 40. & p 48. in 32. qual prodotto partiremo per la differenza d'essi dui termini 8. & 3. cioè p 5. & ne viene 8. & p 9. in 6. & quello aumento è la maggiore delle due quantità cercate, Dalla quale cauando 5. & p 6. in 4. differenza data loro, resterà 3. & p 3. & in 2. il che è la quantità minore, & ben si vede esse due quantità hauere la proportionione data da 8. a 3. perchè moltiplicata la maggiore per 3. termine minore produce 24. & p 28. in 192. come anco è il prodotto, che nasce da moltiplicare la minore per 8. termine maggiore; o vogliamo dire, perchè a partire la maggiore per  $2\frac{1}{2}$ . denominatore della proportionione data di 8. a 3. ne nasce la minore: & perchè a moltiplicare la minore per  $2\frac{1}{2}$ . di nominatore della proportionione data di 8. a 3. ne deriuo la maggiore.

Similmente dicendosi, Sono due monete, l'una delle quali vale lire 1. & soldi 8. più dell'altra, & 16. delle maggiori sono, & valgono quante 23. delle minori, si domanda quanto vale ciascuna di loro, Noi di qui conosciamo, che si hanno due quantità, & valute, la differenza delle quali è soldi 28. & la proportionione loro, cioè della maggiore alla minore è come da 23. a 16. onde per trouare ciascuna valuta da se; Moltiplicheremo 28. soldi differenza loro per 23. termine maggiore della proportionione, che è dalla maggiore alla minore, & il prodotto, che è 644. soldi partiremo per 7. differenza de' dui termini detti 23. & 16. & ne viene 92. soldi, & questo è il valore della moneta maggiore, dal quale cauato i soldi 28. differenza delle due valute, resta soldi 64. che è il valore della moneta minore, perche diremo l'una valere lire 4. & soldi 12. & l'altra lire 2. & soldi 4.

Ancora dicendosi d'un'ordinanza quadrangola di gente, d'un'alleggiamento loro, d'un Campo, orto, o altro sito, la lunghezza è fanti, & piedi, & canale, o braccia 48. più della larghezza, & essa lunghezza è volte 1. & quanto la larghezza, si domanda esse lunghezze, & larghezza distintamente, Noi similmente, perchè i termini della proportionione data sono  $1\frac{1}{2}$ . & 1. ouero ridotti a interi possono essere 9. & 5. moltiplicheremo 48. differenza data via 9. termine maggiore, & il prodotto 432. partiremo per 4. differenza d'essi termini 9. & 5. che l'aumento è 108. sarà la quantità maggiore, cioè la lunghezza, onde la larghezza, che è 48. di manco, verrà ad essere 60.

Et se da principio hauesimo posto non la maggiore delle due quantità, ma la minore essere 2. & a questo giunto 22. differenza data loro, la somma 1. + p 12. sarà la maggiore, fra la quale, & la minore 1. deuue essere la proportionione di 13. ad 52. denominata da  $1\frac{1}{2}$ . però con questo denominatore  $1\frac{1}{2}$ . moltiplicando la minore 1. & il prodotto  $1\frac{1}{2}$ . douerà essere la maggiore, ma ella si vede

6 vede essere 1 & 13. però  $1\frac{1}{2}$  è eguale a 1 & 13. cioè  $\frac{1}{2}$  è eguale a 13, però partito 13. per  $\frac{1}{2}$  numero delle  $z$ . l'auuenimento 24. sarà il valore della  $z$ . Ouero hauendo 1 & per la minore, & 1 & 13. per la maggiore, che deuono hauere la proportion di 3. a 3. (la minore cioè alla maggiore, poiche conuersamente la maggiore alla minore è come di 3. di 2.) moltiplicando la minore per 3. & la maggiore per 2. i dui prodotti 3 & 2. & 2 & 13. faranno egualifra loro, onde leuando 2 & da ciascuna banda, haueremo 1 &. eguale a 24. & però la  $z$  valerà 24. onde la minore quantità posta 1 &. sarà 24. & la maggiore sarà 1 &. di più differenza data loro, cioè sarà 24. & 1 &. che è 36. Hora, perche nell'Equatione di 3 &. eguale a 2 & 13. il 3. & il 2. numeri delle  $z$ . sono li dui termini 3. & 2. della proportion, che ha la maggiore quantità alla minore, & il numero 24. è quel prodotto, che nasce a moltiplicare 1 &. differenza data delle due quantità via 2. termine minore delli dui 3. & 2. qual prodotto 24. si parte sempre per la differenza d'essi termini, che hora è 1. & l'auuenimento 24. mostra la minore delle due quantità, si vede, che da questo operare Algebraico, o Cosmico può deriuare la Regola numerale dicendo.

Moltiplichisi la differenza data delle due quantità via il termine minore delli dui continui, la proportion data delle due quantità, & il prodotto si parta per la differenza d'essi dui termini, che l'auuenimento sarà la quantità minore.

Ancora hauendo posto la minor quantità essere 1 &. la maggiore, che deve essere volte 1 &. quanto la minore (acciò che la proportion della maggiore alla minore sia la data da 3. a 2. il denominatore della quale è  $1\frac{1}{2}$ ) sarà  $1\frac{1}{2}$  &. ma deve anco essere 12. di più della minore, cioè deve essere 1 & 13. però si hauerà  $1\frac{1}{2}$  &. eguale ad 1 & 13. & però  $\frac{1}{2}$  &. eguale a 12. cioè 1 &. eguale a 24. come prima, onde la  $z$  valerà 24. & perciò 24. sarà la quantità minore posta 1 &.

Ma auuertasi, che per schiare numeri rotti, in vece del denominatore della proportion data, che può essere come hora, che non sia intiero, noi potremo nella positione adopare i dui termini intieri continui la proportion data, cioè dicendosi ella essere come da R. 3. ad S. 2. che è quanto il dire, che quando la maggiore sia 3. la minore è 2. noi potremo adoprando gli istessi termini nella positione, ponere che la maggior quantità sia 3 &. & la minore 2 &. la differenza loro è 1 &. però 12. sarà eguale a 12. differenza data, onde parredo 12. per 1. numero delle  $z$ . l'auuenimento 12. sarà il valore della  $z$ . perche le due quantità poste essere 3 &. & 2 &. valeranno 36. volte, & 2. volte il 12. io vogliamo dire, però le 3 &. & 2 &. valeranno 36. & 24. onde le due quantità poste essere 3 &. & 2 &. faranno 36. & 24. Et così, perche il 12. valore della  $z$  è sempre quello, che nasce a partire 12. differenza data delle due quantità per la differenza de' dui termini 3. & 2. della proportion loro, & con l'auuenimento 12. moltiplicando i dui termini istessi 3. & 2. i prodotti 36. & 24. sono le due quantità cercate. Se di qui vorremo cilar here la Regola numerale, potremo dire.

Regola. Partasi la differenza data delle due quantità per la differenza de' dui termini della proportion loro, & con l'auuenimento si moltiplichino essi dui termini, che i dui prodotti faranno le due quantità cercate.

### Terza. Data la somma di due quantità, & la proportion loro trouare esse due quantità.

Si a. la somma delle due quantità 60. & la proportion loro come da P. 3. ad R. 3. Per trouare distintamente le due quantità potremo ponere esse essere A 2 &. & B 3 &. la somma delle quali è 5 &. però è eguale ad 60. somma data, onde la  $z$  valerà 12. perche A 2 &. & B 3 &. valeranno 24. & 36. & perciò 24. & 36. faranno le due quantità poste 2 &. & 3 &.

Qui anco come nella superiore seconda Operatione si potria fare la positione in altri modi, che posta la quantità maggiore essere 1 &. la minore faria il resto fino a 60. somma loro, cioè faria 60. fin 1 &. Ouero posto non la maggiore, ma la minore essere 1 &. la maggiore poi faria pure il resto fino a 60. cioè 60. fin 1 &. Et così seguire peruenendo all'Equatione; Ouero fare la positione in altri modi, & da ciascun d'essi deriuarne la semplice Regola numerale (& anco la lineale come si mostra nella mia Algebra lineale, & in altro mie Opere) ma io per breuità ne lasiarò la cura allo Studente sì per essere facili, hauendogliene mostrato il modo, sì perche egli habbi occasione d'esercitarsi, & farli esperto, & così nelle seguenti Operationi procederò succintamente, per la istessa causa.



*Quarta. Date due quantità scarfe cioè ciascuna d'esse minore d'una vera quantità incognita V, & data la proporzione della scarfità il' esse quantità, cioè la proporzione, che hà la scarfità, ò deficienza dell'una dal vero; alla scarfità, ò deficienza della istessa vero incognito dell'altra, trouare la vera quantità.*

**S**IANO le due quantità scarfe, ò minore del vero incognito A 54. & B 58. & la proporzione della scarfità di A, alla scarfità di B, come S 5. à D 3.

Per trouare la vera quantità incognita, Pono la scarfità di A, essere 1. e, però la scarfità di B, sarà  $\frac{1}{2}$ . accioche da 1. e. à  $\frac{1}{2}$ . e. sia come da S 5. à D 3. ò per schiar rotti Pono la scarfità di A, essere 5. e. che perciò la scarfità di B, sarà 3. e. quali scarfità gionte alle sue quantità deficienti, ò scarfe, cioè ad A 54. le S 4. & à B 58. le 3. e. ciascuna delle due somme douerà essere la vera quantità, & però esse due somme, che sono 54 p 5. e. & 58 p 3. e. doueranno essere eguali fra loro, onde da ciascuna di loro leuato 54. & 3. e. haueremo 1. e. eguale à 4. però la 1. e. valerà 2. & così il defetto, ò scarfità d'A, posto 5. e. farà 10. che giunto ad A 54. la somma 64. verrà ad essere la vera quantità, ò mediant B, il suo defetto, ò scarfità posto 3. e. farà 6. che giunto à B 58. fa pure 64. per la vera quantità.

Considerando mò questa Operatione doue si permiene à 2. e. eguale à 4. & vedendo, che il 4. è sempre la differenza delle due quantità scarfe date A, & B, & il 2. numero delle 2. con il quale si parte esso 4. per trouare dall'auuenimento il valore della 2. è sempre la differenza delli dui termini S, & D, dati, mostranti la proporzione delle due scarfità, col quale auuenimento si moltiplica il termine maggiore S, & il prodotto si giunge alla quantità scarfa minore, che il prodotto è la vera quantità; ouero con il quale auuenimento si moltiplica il termine minore, & il prodotto si giunge alla quantità scarfa maggiore, che il prodotto è la vera quantità; noi potremo estrarne la semplice regola numerale dicendo.

Regola:

Con la differenza dei dui termini mostranti la proporzione della scarfità delle due quantità dalla vera. si parta la differenza delle due quantità scarfe, & con l'auuenimento si moltiplichino i dui termini detti della proporzione della scarfità, che i dui prodotti faranno i dui difetti, ò scarfezze, che giunta la maggiore scarfezza alla minor quantità scarfa delle due date, ò giunto la minore scarfezza alla maggiore quantità scarfa, qual si vogli delle due somme (che faranno eguali) sarà la quantità vera.

Ancora se ponesimo la quantità vera essere 17. cauandone A 34. quantità scarfa minore delle due scarfe date, il restante 1. m 54. verrà ad essere il defetto, ò scarfezza maggiore, & dalla medesima quantità vera 1. e. cauando B 58. quantità scarfa maggiore, il restante 1. m 58. verria ad essere la scarfezza minore, & perche la proporzione delle due scarfezze, cioè dalla maggiore alla minore, deue essere come da S 5. à D 3. sappiamo, che da 1. m 54. ad 1. m 58. è come da 5. à 3. cioè, che 5. 3. 1. m 54. & 1. m 58. sono quattro quantità proporzionali, perliche il prodotto delle due estreme, cioè dalla prima 5. nella quarta 1. m 58. deue essere eguale al prodotto delle due medie, cioè dalla seconda 3. nella terza 1. m 54. ò vogliamo dire, perliche il prodotto dal primo antecedente nel secondo conseguente deue essere eguale al prodotto dal primo conseguente nel secondo antecedente, ò vogliamo dire, perliche il prodotto dal termine maggiore delli dui dati nella minor scarfezza trouata, deue essere eguale al prodotto dal termine minore nella maggior scarfezza trouata, cioè l'v. prodotto 5. m 390. sarà eguale all'altro prodotto 3. m 162, onde accomodati li m, haueremo 5 p 162, eguale à 3 p 390. che bonato 162. & 3. e. da ciascuna banda, si hauerà 2. e. eguale à 128. perliche partendo 128. per 2. numero delle 2. l'auuenimento 64. sarà il valore della 2. & però sarà ancora la quantità vera cercata posta 1. e. Si può mò da questa Operatione dedurre la semplice Regola numerale dicendò. Reg.

Moltiplicasi il termine maggiore delli dui mostrati la proporzione data delle due scarfezze, via la quantità scarfa maggiore, & il prodotto si caui dal prodotto, che nasce à moltiplicare il termine minore via la quantità scarfa minore, & il restante si parta per la differenza de' dui termini detti, che l'auuenimento sarà la quantità vera.

Et perche il duto di 5. via 58. è quanto il duto di 5. via 54. & via 4. componenti il 58. & il duto di 5. via 54. è quanto il duto di 3. & 2. componenti il 5. in 54. cioè il duto di 5. via 54. si compone da tre dutti partiali, che sono di 3. in 54. di 2. in 54. & di 5. in 4. da quelli leuato il duto di 3. in 54. che è il duto del termine minore nella quantità scarfa minore, restaranno i dui dutti di 2. (differenza de' termini 5. & 3.) in 54. (quantità minore) & di 5. (termine maggiore) in 4. (differenza delle due quantità scarfe 54. & 58.) onde si può dire.

Molti-

Moltiplichi la quantità minore per la differenza de i dui termini, & al prodotto si giunga il duto del termine maggiore via la differenza delle due quantità, & la somma si parta per la differenza de i dui termini, che l'aumento sarà la quantità vera.

*Quinta. Date due quantità soprabondanti, cioè ciascuna di loro eccedente, ò maggiore d'una vera quantità incognita, & data la proporzione delli dui eccessi loro, trovare la vera quantità.*

**S** I A N O le due quantità eccedenti A 72. & B 70. & la proporzione delli dui loro eccessi come da E 4. a G 3.

Per trovare la vera quantità, Pono l'eccesso di A 72. maggiore essere 42. che perciò la quantità vera sarà 72 m 42. & l'eccesso di B 70. minore sarà 32. che perciò la quantità vera sarà 70 m 32. onde haueremo 72 m 42. eguale a 70 m 32. che accomodato il m, sarà 72 p 32. eguale a 70 p 42. onde lenato 32. & 70. da ciascuna banda, si hauerà 2. eguale ad 12. per il che la 2. valerà 24. & così l'eccesso di A. posto 42. sarà 8. che cauato da esso A 72. resta 64. che è la vera quantità. Ouero, & così l'eccesso di B. posto 32. sarà 6. che cauato da esso B 70. resta pure 64. che è la vera quantità.

Con la differenza dei dui termini della proporzione delli eccessi si parta la differenza delle due quantità eccedenti, & l'aumento si moltiplichi via il termine maggiore, & il prodotto si cani dalla quantità eccedente maggiore, che il restante sarà la quantità vera. Ouero, & l'aumento si moltiplichi via il termine minore, & il prodotto si cani dalla quantità eccedente minore, che il restante sarà la quantità vera.

Et se ponessimo la quantità vera essere 12. cauandola da 72. quantità maggiore eccedente il restante 72 m 12. sarà l'eccesso d'esso 72. Ancora cauando detta 12. quantità vera dall'altra quantità eccedente 70. il restante 70 m 12. sarà l'eccesso del 70. quali dui eccessi 72 m 12. maggiore, & 70 m 12. minore devono hauer la proporzione data di 4. a 3. però il prodotto di 72 m 12. via 3. deve essere eguale al prodotto di 70 m 12. via 4. cioè 216 m 32. deve essere eguale a 280 m 42. onde accomodato il m, si hauerà 216 p 42. eguale a 280 p 32. (vogliamo dire 216 p 12. eguale a 280.) & lenato 216 p 32. da ciascuna banda, si hauerà 12. eguale a 64. & però la 2. valerà 64. che è la quantità vera posta 12.

Moltiplichi il termine maggiore della proporzione data dell'eccessi via la quantità maggiore delle due date eccedenti, & anco si moltiplichi il termine minore via la quantità maggiore, & la differenza delli dui prodotti si parta per la differenza delli dui termini dati, che l'aumento sarà la quantità vera.

Avuertasi, che quando nell'operare le regole numerali nelli questi, elle non si potessero eseguire, ò eseguendole, ne succedesse qualche absordo, ò impossibilità, questo sarà segno, che *(bauendo però operato bene, cioè non hauendo errato nella regola, ò esecuzione d'essa)* il quesito, o domanda stante come ella si proponesse fusse impossibile a risolvere, che per esempio dicendosi. Di due quantità eccedenti il vero, la maggiore è 96. & la minore 70. & la proporzione delli eccessi è come da 4. a 3. si domanda la vera quantità. Noi operando, secondo che insegna la Regla sopraposta, Moltiplicheremo 4. termine maggiore via 70. quantità eccedente minore, & fa 280. & anco moltiplicheremo 3. termine minore via 96. quantità eccedente maggiore, & fa 288. la differenza di questi dui prodotti 280. & 288. è 8. quale si ha da partire per la differenza de' termini 4. & 3. qual differenza è 1. & ne viene 8. & questo 8. si diria essere la quantità vera, on'e cauata da 96. l'eccesso d'esso 96. sarà 88. & cauata la medesima quantità 8. da 70. l'eccesso d'esso 70. sarà 62. ma questi dui eccessi 88. & 62. non hanno la precisa proporzione data di 4. a 3. (che essendo 88. il maggiore, l'altro doueria essere 66. & non 62. ouero essendo 62. il minore, l'altro doueria essere 86. & non 88.) per il che si vede, che si peruerria a dire, che da 88. a 62. fusse la proporzione, che è da 4. a 3. il che è absordo, ò impossibile. Hor dico, che di qui si vede essere anco impossibile quello, che conduce a questa impossibilità, cioè, che si possono trovare due quantità eccedenti il vero, che essendo l'una 96. & l'altra 70. la proporzione delli eccessi loro sia come da 4. a 3. L'Algebra mò ci fa ben conoscere, & l'impossibilità del quesito, & la causa d'essa impossibilità, che in esso ponendo la quantità vera essere 12. quella cauata da 96. & a 70. quantità dati eccedenti, li restanti 96 m 12. & 70 m 12. sono li eccessi, quali douendo hauer la proporzione data di 4. a 3. ne segue, che il prodotto da 4. termine maggiore in 70 m 12. accesso minore, deve essere eguale al prodotto da 3. termine minore in 96 m 12. eccesso mag-

giore,

giore, cioè, che  $280 \text{ m } 4$ , sia eguale a  $288 \text{ m } 3$ , & onde accommodati li m. si ha uerà a  $280 \text{ p } 3$ , & eguale a  $288 \text{ p } 4$ , & leuato  $280 \text{ p } 3$ , & da ciascuna banda, si ha uerà  $8 \text{ p } 1$ , & eguale a niente, il che è impossibile, poichè quando accou- $1$  r. fusse, ò ualesse niente, il solo  $8$ , accompnagnatoli è qualche cosa, & però non può essere eguale a niente; Dal che si concluderà il quesito essere impossibile, stante come egli si propone il  $1$ , causa di questa impossibilità si uide essere, che nell' hauere  $280 \text{ p } 3$ , & eguale a  $288 \text{ p } 4$ , nel  $280 \text{ p } 3$ , non solo il numero  $280$ , è minore del numero  $288$ , dall'altra banda, ma anco il  $3$ , numero delle  $2$ , è minore del  $4$ , numero delle  $2$ , dall'altra banda istessa, onde da ciascuna banda leuato il minor numero delli due  $280$ , &  $288$ , & anco il minor numero delle  $2$ , delli due  $3$ , &  $4$ , cioè leuando  $280$ , &  $3$ , da ciascuna banda, si viene a leuare ogni cosa dalla prima banda, onde resta solo niente, & dall'altra banda restaria qualche cosa, cioè  $8 \text{ p } 1$ , & al quale doueria essere eguale il niente, il che è inconueniente; Poichè, accio si possa trouare la valuta della  $2$  in questi casi, conuerria, che se da vna banda è solo numero, dall'altra fussero  $2$ , il che, accio possa auenire, conuiene, che nell'Equatione, alla quale si peruiene al numero maggiore, sia accompagnato il minor numero, ò quantità delle  $2$ , & che perciò al numero minore sia accompagnato il maggior numero, ò quantità delle  $2$ , cioè, che non al  $280$ , fusse accompnagnate le  $3$ , ma al  $288$ , & si hauesse  $280 \text{ p } 4$ , & eguale a  $288 \text{ p } 3$ , & accio allhora, ca- uato  $280$ , &  $3$ , da ciascuna banda, dall'vna restasse  $1$ , & dall'altra  $8$ ; che così la  $2$ , ualeria  $8$ , Et per trouare questo donc possa occorrere questa Equatione, cioè di  $288 \text{ p } 4$ , & eguale a  $280 \text{ p } 3$ , & vedendo, che le  $4$ , & le  $3$ , nascono dalla transpositione delle  $2$ , che douetano  $3$ , & le due quantità dell'Equatione, mentre si accommodano li m, sapremo, che auanti si uenisse a d' hauere  $280 \text{ m } 3$ , & eguale a  $288 \text{ m } 4$ , & ancora il  $280 \text{ m } 3$ , deue nascere dal moltiplicare l'vno eccesso per  $3$ , vno de' termini della proportionione data, & onde partendo questo  $280 \text{ m } 3$ , per  $3$ , l'auuenimento  $93 \frac{1}{3}$  m  $1$ , & douerà essere l'vno delli eccessi, & perche egli nasce dal cauare la quantità vera posta  $1$ , dall'vna delle quantità date eccedenti, ella uerrà ad essere la somma d'esso  $93 \frac{1}{3}$  m  $1$ , eccesso, con  $1$ , quantità vera, che fa  $93 \frac{1}{3}$ . Et similmente il  $288 \text{ m } 4$ , deue nascere dal moltiplicare l'altro eccesso per  $4$ , che è l'altro termine della proportionione delli eccessi, & onde partendo  $288 \text{ m } 4$ , per  $4$ , l'auuenimento  $72 \text{ m } 1$ , & douerà essere l'altro eccesso, al quale giunto  $1$ , quantità vera, la somma  $73$ , sarà l'altra quantità eccedente; Et così si procedi. Di due quantità eccedenti il vero, l'vna è  $93 \frac{1}{3}$ , & l'altra  $73$ , & la proportionione delli due eccedenti è come da  $4$ , a  $3$ . Allhora mediante la Regola si trouerà la quantità vera essere  $8$ , & però li due eccessi faranno  $85 \frac{1}{3}$ , &  $64$ , quali hanno bene la proportionione di  $4$ , a  $3$ , come si ricerca.

Si può anco auuertire, che in simili casi possibili conuen, sempre, che a moltiplicare il maggior termine delli due mostranti la proportionione delli eccessi, uia la quantità minore delle due eccedenti, il prodotto sia maggiore di quello, che nasce a moltiplicare il termine minore uia la quantità maggiore delle due eccedenti Et se auuenisse, che essi due prodotti detti fussero eguali fra loro, che perciò il valore della  $2$ , sarebbe niente, come occorrerebbe dicendo, si uide quanto d' eccedenti l'vna è  $80$ , & l'altra è  $60$ , & la proportionione delli eccessi loro è come da  $4$ , a  $3$ , allhora posta la quantità vera essere  $1$ , & li due eccessi faranno  $80 \text{ m } 1$ , &  $60 \text{ m } 1$ , & che moltiplicati il maggiore per  $3$ , termine minore, & il minore per  $4$ , termine maggiore, i due prodotti faranno  $240 \text{ m } 3$ , &  $240 \text{ m } 4$ , faranno eguali fra loro, che accommodati li m, si ha uerà  $240 \text{ p } 4$ , & eguale a  $240 \text{ p } 3$ , & però si ha uerà  $60$ , & niente  $1$ , & eguale a niente, perche la  $2$ , ualena niente; allhora la quantità vera uerrà ad essere niente, & il quesito infruttuoso, onde liij accorto lo studente in consideraze giudiciofamente i questi, che egli desse ad altri, o gli fussero dati da altri, perche l'Arte senza il giudicio, ò il giudicio senza l'Arte, vengono ad essere di poco profito.

**Setta.** Date due quantità l'vna deficiente, ò scarfa, & l'altra eccedente il uero, & la proportionione del defetto, ò scarfezza all'eccesso, trouare la quantità vera.

**S**I A N O le due quantità D, deficiente  $48$ , & E, eccedente  $60$ , & la proportionione della deficienza, ò scarfezza di D, alla eccedenza di E, fra come da  $7$ , a  $5$ .

Per trouare la quantità vera, potremo (seruendoci per commodità delli termini dati) potere, che la scarfezza di D  $48$ , sia  $7$ , & che la eccedenza di E  $60$ , sia  $5$ , & che così a  $48$ , giunto le  $7$ , la somma  $48 \text{ p } 7$ , sarà la quantità vera, & anco da  $60$ , leuato le  $5$ , il restante  $60 \text{ m } 5$ , sarà pure anco la quantità vera, & onde  $48 \text{ p } 7$ , &  $60 \text{ m } 5$ , sarà eguale a  $60 \text{ m } 5$ , & accommodato il m, si ha uerà  $48 \text{ p } 12$ , & eguale a  $60$ , che leuato il minor numero  $48$ , da ciascuna banda, si ha uerà finalmente  $12$ , & eguale a  $12$ , & la  $2$ , ualerà  $2$ , perche la scarfezza di  $48$ , posta essere  $7$ , & sarà  $7$ , che giunto ad essere  $48$ , la somma  $55$ , sarà la vera quantità, Ouero, perche la eccedenza di  $60$ , posta  $5$ , & sarà  $5$ , che ca-

che cauato da esso 60. il restante 55. sarà la vera quantità.

Regola.

Causi la quantità scarfa dalla eccedente, & il restante si parta per la somma de i dui termini mostranti la data proportion, che hà la scarfezza dell'vna quantità alla eccedenza dell'altra, & con l'auuenimento si moltiplichì il termine della scarfezza, ò vogliamo dire il primo termine delli dati, che il prodotto sarà la scarfezza della scarfa, quale si giunga alla quantità scarfa, che la somma sarà la quantità vera, Ouero, & con l'auuenimento si moltiplichì il termine della eccedenza, ò secondo delli dui dati, che il prodotto sarà la eccedenza della quantità eccedente, quale eccedenza si caui dalla quantità eccedente, che il restante sarà la quantità vera.

Et se bene si potrà con manco numero di parole descrivere questa Regola dicendo. Partasi la differenza delle due quantità per la somma de i dui termini, & con l'auuenimento si moltiplichino essi dui termini, & de i prodotti giointo il primo alla quantità deficiente, & il secondo cauato dalla quantità eccedente, ciascuno de i dui risultati (che saranno eguali) mostrerà la quantità vera. Io nondimeno, acciò gli Studenti intendano facilmente quanto bisogna, piglio fatica di scrivere diffusamente quello, che occorre; potranno essi poi, fatta bastevole intelligenza, notarsi succintamente quelle Regole, ò altro, che vorranno.

Et se ci piacerà di ponere, che la quantità vera sia 1. & caudone 48. quantità deficiente, il restante 1. & m 48. sarà il difetto, ma cauato poi essa quantità vera 1. da 60. quantità eccedente, il restante 60 m 1. sarà l'eccesso, & perche il difetto all'eccesso si dice hauere la proportion di 7. à 5. sapremo, che da 1. & m 48. à 60 m 1. è come da 7. à 5. onde moltiplicando 1. & m 48. primo via 5. termine secondo, & 60 m 1. secondo via 7. termine primo, li dui prodotti 5. & m 240. & 420 m 7. faranno eguali fra loro, & accomodati in m. haueremo 12. & eguale à 600. onde partito 600. per 12. numero delle 2. l'auuenimento 55. sarà il valore della 2. & però la quantità vera sarà 55.

Regola.

Moltiplichisi la prima quantità via il secondo termine, & la seconda quantità via il primo termine, & la somma delli dui prodotti si parta per la somma delli dui termini, che l'auuenimento sarà la quantità vera.

Si può notare, che le tre superiori Operationi Quarta, Quinta, & Sesta, doue sono nella Quarta due quantità deficienti, & nella Quinta due quantità eccedenti, & nella Sesta vna quantità deficiente, & vna quantità eccedente, dandosi la proportion della deficienza alla deficienza nella Quarta, & della eccedenza alla eccedenza nella Quinta, & della deficienza alla eccedenza nella Sesta, vengono ad essere alla similitudine della falsa positione doppia Arithmetica, doue si opera con il più, & con il meno, & quello, che per essa doppia positione falsa si troua, si può anco trouare con la positione Algebratica facilmente, ponendo la quantità vera cercata essere 1. & si peruiene sempre ad Equatione semplice di 2. eguale à numero.

*Settima. Data vna quantità di uiderla in dui pezzi tali, che vna proposta parte dell' vn pezzo giunia ad vna proposta parte dell' altro pezzo, facci vna somma prescritta:*

**S**I A Q. 30. da diuidere in due pezzi tali, che l'  $\frac{1}{2}$ . dell'vno giunto all'  $\frac{1}{3}$ . dell'altro facci 9. Pono l'vn pezzo essere 1. & l'altro il resto fino à 30. cioè 30 m 1. & preso l'  $\frac{1}{2}$ . d' 1. & l'  $\frac{1}{3}$ . di 30 m 1. che sono  $\frac{1}{2}$  &  $7\frac{2}{3}$  m  $\frac{1}{3}$  & giunti insieme fanno  $7\frac{2}{3}$  &  $\frac{1}{3}$  il che è eguale à 9. prescittito, onde leuato  $7\frac{2}{3}$  da ciascuna banda, haueremo  $\frac{1}{3}$  & eguale à  $1\frac{1}{2}$ . & però partito  $1\frac{1}{2}$ . per  $\frac{1}{3}$  numero delle 2. che ne viene 18. questo sarà il primo pezzo, cioè quello, di che si piglia l'  $\frac{1}{2}$ . & il resto fino à 30, che è 12. sarà l'altro pezzo, di che si piglia l'  $\frac{1}{3}$ . che così l'  $\frac{1}{2}$ . di 18. & l'  $\frac{1}{3}$ . di 12. cioè 6. & 3. fanno in somma 9. come bisogna.

Notifi, che per schiar parte de i rotti, potressimo, trouare vn numero intiero, che habbi le proposte parti  $\frac{1}{2}$ . &  $\frac{1}{3}$ . in intieri, & potrà essere 60. ò 24. ò il più picciolo 12. (che si troua à moltiplicare fra loro i dui denominatori 3. & 4. delle parti proposte) potressimo dico ponere, che l'vn pezzo del 30. fusse 12. & però l'altro faria 30 m 12. che l'  $\frac{1}{2}$ . del primo, & l'  $\frac{1}{3}$ . del secondo, che sono 4. &  $7\frac{2}{3}$  m 3. fanno in somma 11 &  $\frac{2}{3}$  & questo sarà eguale à 9. cioè 2. farà eguale ad  $1\frac{1}{2}$ . però la 2. valerà  $1\frac{1}{2}$ . onde le 12. poste essere il primo pezzo importaranno 18. che sarà il primo pezzo, & però 12. sarà il secondo.

Et perche vediamo il 30. che non hà l'  $\frac{1}{2}$ . in intieri, ma hà bene l'  $\frac{1}{2}$ . in intieri, & è 10. se ponremo non il secondo pezzo di che si piglia l'  $\frac{1}{2}$ . ma il primo di che si piglia l'  $\frac{1}{3}$ . essere 30 m 12. & però il secondo essere 12. & presi l'  $\frac{1}{2}$ . di 30 m 12. & l'  $\frac{1}{3}$ . di 12. che sono 10 m 4. & 3. & questi giunti insieme fanno 10 m 1. il che è eguale à 9. onde giunto 1. & cauato 9. da ciascuna banda haueremo 1. eguale ad 1. & però la 2. valerà 1. & li pezzi posti 30 m 12. & 12. faranno 30 m

12. & 12.

12. & 12. cioè 18. & 12.

Et se posto l'un pezzo (che sia il primo) essere 12. ò 122. come è la piaccia, poniamo 122. & sapendo, che l'1/2, di questo, cioè 42. con l'1/2, dell'altro pezzo deve fare 9. cauando da questo 9. le 42. il restante 9 m 42. douerà essere l'1/2, dell'altro pezzo, però tutto esso secondo pezzo verria ad essere 36 m 162. & quello giunto al primo pezzo posto 122. la somma 36 m 42. doueria formare la quantità intiera da diuidere, cioè 30. però si haberia 36 m 42. eguale a 30. cioè 6. eguale a 42. però la 2. valeria 12. onde il primo pezzo posto 122. faria 18. & consequentemente 12. faria il secondo.

**Ottaua.** *Data una quantità diuiderla in due pezzi talmente, che una proposta parte del primo cauata da una proposta parte del secondo, il restante sia un restante prescritto.*

**S I A Q 80.** da diuidere in due pezzi talmente, che li 2/3, del primo cauati dalli 1/4, del secondo restiti 24. Pono il primo essere 212. li suoi 2/3, sono 142. che giunte a 24. la somma 142 p 24. douerà essere li 1/4, del secondo, onde partito 142 p 24. per 1/4. (cioè moltiplicando per 4. & partito per 5.) che ne viene 192 p 332. questo faria l'intero secondo pezzo, che giunto al primo 212. deve fare 80 Q. ma fa 402 p 332. però questo è eguale a 80. onde leuato 332. da ciascuna banda, haueremo 402/2. eguale a 462. cioè (ridotte a interi, moltiplicando per 5.) 2012. eguale a 232. perche la 2. valerà 12. onde il primo pezzo posto 212. farà 24. & il secondo il resto fino a 80. cioè 56. Et ponendosi il primo pezzo essere 12. & il secondo il resto dell'80. cioè 80 m 12. li 2/3, d. 12. cauati dalli 1/4, di 80 m 12. cioè cauto 22. da 572 m 12. il restante 572 m 12. faria eguale a 24. cioè haueressimo 332. eguale a 12. cioè 696. eguale a 292. che la 2. valeria 24. però 24. faria il primo pezzo, & per consequenza 56. il secondo.

**Nona.** *Trouare due quantità, la differenza delle quali sia una quantità data, & che la proposta parte dell'una giunta alla proposta parte dell'altra, la somma sia una somma data.*

**S I A D 88.** la differenza delle due quantità, tali che l'2/3, dell'una giunto alli 1/4, dell'altra facci 119. Per trouare esse due quantità, Pono l'una essere 12. onde l'altra sarà 12 p 88. l'1/4, dell'una, ò prima è 12. & li 1/4, dell'altra sono 12 p 33. giunti insieme fanno 122 p 33. & questo è eguale a 119. cioè (leuato 33. da ciascuna banda) 122/2. è eguale a 86. cioè (moltiplicando per 24. denominatore del rotto per ridurlo a intero) 132. eguale a 2064. che la 2. vale 1582. & questa è la prima quantità posta 12. perche la seconda, che è posta 12 p 88. sarà 2462. & ben si vede, che essendo l'1/4, della prima 2062/4. & li 1/4, della seconda 922/4. (che solo 1/4, è 3022/4.) la somma loro è 119. come si propone.

Et se ponesimo la prima quantità essere 12 p 88. & la seconda 12. allhora l'1/4, della prima faria 12 p 142. & li 1/4, della seconda fariano 12. che giunti insieme fanno 122 p 142. & questo è eguale a 119. & però 122/2. a 1042. cioè 132. a 2504. perche la 2. vale 1922. onde la prima quantità posta 12 p 88. sarà 1922 p 88. cioè 2802. & la seconda posta 12. sarà 1922. che così l'1/4, della prima è 462/4. & li 1/4, della seconda sono 922/4. & giunti insieme fanno 119. Et così si vede il questo potere hauere due risposte, proponendosi così largamente, poiche anco in dui modi si può procedere, che sono il supporre, che la prima quantità di che si piglia l'1/4, sia vna volta la minore, & vn'altra volta, che ella sia la maggiore, ma proponendosi strettamente, ò condizionatamente, dicendo. Di due quantità differenti in 88. giunto l'1/4, della minore alli 1/4, della maggiore la somma è 119. domando esse due quantità, allhora elle non potranno essere se non 2582/4. & 2462/4. Et dicendo. Di due quantità differenti in 88. giunto l'1/4, della maggiore alli 1/4, della minore la somma è 119. Allhora elle non potranno essere se non 2802/4. & 1922/4.

Et se nella positione si fusse posto la maggior quantità, di che si pigli l'1/4, essere 12. & la minore 12 m 88. pure si faria trouato elle essere 2802/4. & 1922/4.

Et ponendo, che della minore si pigli l'1/4, & che ella sia 12 m 88. essendo la maggiore 12. pure si faria trouato elle essere 1582/4. & 2462/4.

L'istesso auuerria se ponesimo la maggior quantità essere 12. più la mità di 88. loro differenza, & la minore essere 12. meno l'altra mità dell'88. cioè elle essere 12 p 44. & 12 m 44.

*Decima. Trovare due quantità, la differenza delle quali sia una proposta quantità, & che una data parte della prima cauata da una data parte della seconda, il restante sia una quantità prescritta.*

**S**IA B 12. la differenza delle due quantità tali, che l'  $\frac{1}{2}$  D, dell'una cauato dall'  $\frac{1}{4}$  F, seconda, resti H 9.

Pocho la prima  $12$ . la seconda  $12 \div 2 = 6$ . l'  $\frac{1}{2}$  della prima minore è  $6$ . che cauato dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda maggiore, cioè da  $6 \div 2 = 3$ . resta  $3$ . & questo deue essere 9. cioè è eguale a 9. però (accommodato il m)  $3 \times 3 = 9$ . cioè  $12 \div 2 = 6$ . sarebbe eguale a niente, il che non può stare. Ma se variando la proposta si dirà, Sia B 12. la differenza delle due quantità tali, che cauato l'  $\frac{1}{2}$  della prima dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda resti H 9. Noi posto pure la prima  $12$ . & la seconda  $12 \div 2 = 6$ . cauaremo l'  $\frac{1}{2}$  della prima dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda, cioè  $6 \div 2 = 3$ . che resterà  $12 - 3 = 9$ . & sarà eguale a 9. cioè  $12 \div 2 = 6$ . eguale a 5. però la  $2$ . valerà 50. & sarà la quantità minore posta  $12$ . & però 72. sarà l'altra quantità maggiore, che cauato l'  $\frac{1}{2}$  di 60. da l'  $\frac{1}{4}$  di 72. cioè 15. da 24. resta 9. prescritto.

Et quando senza stringersi nel quesito di cauare l'  $\frac{1}{2}$  della prima quantità dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda, ne meno l'  $\frac{1}{2}$  della prima dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda, egli si propone largamente dicendo.

Trouarsi due quantità differenti in 12. tali, che la differenza dell'  $\frac{1}{2}$  della prima, & l'  $\frac{1}{4}$  della seconda sia 9. allhora se il quesito non fusse solubile, cauando l'  $\frac{1}{2}$  della prima dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda, potria forsi essere, come fusse solubile, cauando l'  $\frac{1}{2}$  della prima dall'  $\frac{1}{4}$  della seconda, & perciò conuerria tentare la operatione in ciascuno de' due modi come s'è fatto di sopra.

Et se ponemo la maggior quantità essere  $12 \div 2 = 6$ . & la minore  $12 \div 4 = 3$ . l'  $\frac{1}{2}$  della maggiore cauato dall'  $\frac{1}{4}$  della minore (che non si può già cauare l'  $\frac{1}{4}$  d'una quantità grande dall'  $\frac{1}{4}$  (minore d'  $\frac{1}{4}$ ) d'una quantità più piccola) cioè  $6 \div 2 = 3$ . da  $3 \div 4 = 0.75$ . che resta  $3 - 0.75 = 2.25$ . questo sarà eguale a 9. cioè  $2.25 \times 4 = 9$ . per il che la  $2$ . vale 150. onde le due quantità saranno 150  $\div 2 = 75$ . & 150  $\div 4 = 37.5$ . cioè 156. & 144.

Che se volessimo pure cauare l'  $\frac{1}{2}$  della minore dell'  $\frac{1}{4}$  della maggiore (il che in alcune quantità si potrà fare) & che restasse 9. conuerria, che la differenza delle due quantità fusse molto maggiore di 12. cioè tale, che l'  $\frac{1}{2}$  d'essa differenza fusse più del 9. H, acciò si potesse venire all'Equatione, cioè, acciò che  $12 \div 2 = 6$ . che si haueua in fine (differenza d'  $\frac{1}{2}$ . &  $\frac{1}{4}$ . parti dette) fusse eguale a qualche numero, acciò la  $2$ . ualesse qualche quantità, & però doueria il B. essere più di 36. che se fusse solo 36. l'  $\frac{1}{2}$  del quale è 9. si haueua  $9 \div 4 = 2.25$ . eguale a 9. & però la  $2$ . ualeria 6. (cioè niente) onde una quantità sarà 0. cioè niente, & l'altra 36. il che non è a proposito. Et se pure B 12. douesse essere la differenza delle due quantità, conuerria poi, che H 9. fusse meno di 3. cioè mancò dell'  $\frac{1}{2}$ . di esso B 12. acciò pure nell'Equatione si hauesse  $9 \div 4 = 2.25$ . eguale a qualche numero, cioè conueniente, che B, & H, siano tali, che del B, presa la parte, dalla quale si ha da cauare l'altra (cioè  $9 \div 4 = 2.25$  di 12 B.) superi l'H.

Et se B, differenza delle due quantità si dica essere 48. il D, parte dell'una da cauarsi sia  $\frac{1}{2}$ . & F, parte dell'altra, dalla quale si ha da fare la sottrazione sia  $\frac{1}{4}$ . & il restante H, sia 10. Posto la quantità minore  $12$ . & la maggiore  $12 \div 2 = 6$ . Cauato  $\frac{1}{2}$  della prima minore da  $\frac{1}{4}$  della seconda maggiore, resta  $12 - 3 = 9$ . & è eguale ad H 10. cioè  $12 \div 2 = 6$ . eguale a  $10 \div 2 = 5$ . cioè  $12 \div 2 = 6$ . eguale a 2. però la  $2$ . vale 14. & la quantità minore, per la quale la minore sarà 72. che l'  $\frac{1}{2}$  di 24. cauato dall'  $\frac{1}{4}$  di 72. cioè 18. da 18. resta 0. & così il quesito ha sempre una soluzione, quando la parte dell'una, che si ha da cauare è maggiore della parte dell'altra quantità, dalla quale si ha da cauare, come occorre hora, che  $\frac{1}{2}$  da cauare è maggiore d'  $\frac{1}{4}$ . da doue si ha da cauare, perche così conuiene sempre esser  $\frac{1}{2}$ . pigliarlo dalla quantità maggiore, acciò che  $\frac{1}{2}$  della minore sia più piccolo dell'  $\frac{1}{4}$  della maggiore, che della maggiore non si potrà pigliare esso  $\frac{1}{2}$ . poiche l'  $\frac{1}{2}$  d'un numero grande non si potrà cauare dall'  $\frac{1}{4}$  d'un altro numero di lui minore; Auuertendo di più, che il 10 H. sia minore dell'  $\frac{1}{2}$  (parte della quale s'è fatta la sottrazione) di 48 B, acciò si possa peruenire ad Equatione solubile.

Ma quando la parte, che si ha da cauare sia minor rotto, che non è la parte, dalla quale si ha da cauare, cioè se hauesimo a cauare l'  $\frac{1}{4}$  dell'una quantità dall'  $\frac{1}{2}$  dell'altra, allhora il quesito potrà hauere due risposte, quando i numeri B, & H, lo concedino; perche essa parte  $\frac{1}{4}$ . non solo si potrà pigliare dalla quantità minore, ma anco dalla quantità maggiore; Che se diremo la differenza delle due quantità essere B 48. & la parte D, dell'una da cauarsi essere  $\frac{1}{4}$ . & la F, parte dell'altra, dalla quale si ha da fare la sottrazione essere  $\frac{1}{2}$ . & il restante douere essere H 10. Posto la

quantità maggiore 12. la minore sarà 12 m 48. che cauato  $\frac{1}{2}$  e. da  $\frac{1}{2}$  m 16. resterà  $\frac{1}{2}$  m 16. il che sarà eguale ad H 10. cioè  $\frac{1}{2}$  e. sarà eguale a 26. però la e. valerà 32. & sarà la quantità maggiore, essendo 264. la minore, che l'  $\frac{1}{2}$  di 32. cauato dall'  $\frac{1}{2}$  di 264. cioè 78. da 88. resta 10. come si propone: Et così il quesito sarà sempre solubile, siano B, & H, che numeri si vogliono.

Ancora posto la quantità maggiore 12. & la minore 12 m 48. Cauato l'  $\frac{1}{2}$  della minore dall'  $\frac{1}{2}$  della maggiore, cioè  $\frac{1}{2}$  m 12. da  $\frac{1}{2}$  e. che resta  $\frac{1}{2}$  m 13. questo sarà eguale a 10. cioè  $\frac{1}{2}$  e. p 2. eguale a niente, onde il quesito è impossibile, perche H 10. è manco di 12. quarta parte di B 48. Come si vede anco ponendo, che la quantità minore sia 12. & la maggiore 12 p 48. che cauato  $\frac{1}{2}$  e. da  $\frac{1}{2}$  p 16. resta  $\frac{1}{2}$  p 16. & è eguale a 10. cioè  $\frac{1}{2}$  p 6. eguale a niente; il che non può stare, perche il 10 H, è minore di 16. terza parte di 48 B. Ma parcaua di sopra, che bastasse, che H fusse maggiore solo della quarta parte di 48. cioè di 12. hauendo  $\frac{1}{2}$  p 13. eguale ad H, che posso io H, poniamo 15. all' hora  $\frac{1}{2}$  e. sarà eguale a 3. & la e. valerà 36. onde le due quantità poste: 12. & 12 m 48. faranno 36. & 36 m 48. che 36 m 48. non è quantità reale; perche ci accorgiamo, che veramente bisogna, che H. sia maggiore della terza parte di 48. cioè della parte, dalla quale si ha da fare la sottrattione, & però stante B 48. conuerrà, che H. sia più di 16. hor sia 17. che posto la quantità maggiore 12. & la minore 12 m 48. haueremo  $\frac{1}{2}$  p 12. eguale a 17. cioè  $\frac{1}{2}$  e. eguale a 5. perche la e. valerà 60. & è la quantità maggiore, essendo poi 60 m 48. cioè 12. la quantità minore.

Et posto la quantità maggiore 12 p 48. & la minore 12. haueremo  $\frac{1}{2}$  p 16. eguale a 17. cioè  $\frac{1}{2}$  e. eguale ad 1. però la e. valerà 12. onde la maggiore sarà 12 p 48. cioè 60. & la minore sarà 12. oome prima, che cauato l'  $\frac{1}{2}$  di 12. dall'  $\frac{1}{2}$  di 60. cioè 3. da 20. resta 17 H. con e si propone.

Et se l'  $\frac{1}{2}$  che si ha da cauare si volesse pigliare dalla quantità maggiore, essendo B 48. & H 17. posto la quantità maggiore 12. & la minore 12 m 48. cauato  $\frac{1}{2}$  e. da  $\frac{1}{2}$  m 16. resterà  $\frac{1}{2}$  m 16. che sarà eguale a 17. cioè  $\frac{1}{2}$  e. eguale a 33. & però la e. valerà 396. onde la maggiore sarà 396. & la minore 348. che cauato l'  $\frac{1}{2}$  di 396. dall'  $\frac{1}{2}$  di 348. cioè 99. da 116. resta 17 come si propone.

Et così essendo B 48. & H 17. & la parte D  $\frac{1}{2}$  da cauarsi, minore della parte F  $\frac{1}{2}$  dalla quale si caua, il quesito potrà hauere due risposte, poiche le due quantità potranno essere 60. & 12. ouero 396. & 348. che cauato l'  $\frac{1}{2}$  dell' vna dall'  $\frac{1}{2}$  dell' altra, resterà 17. cioè nel primo caso cauato l'  $\frac{1}{2}$  della minore dall'  $\frac{1}{2}$  della maggiore, che è cauare 3. da 20. & nel secondo caso cauato l'  $\frac{1}{2}$  della maggiore dall'  $\frac{1}{2}$  della minore, che è cauare 99. da 116. il restante in ciascun modo sarà H 17.

## ALTRE OPERATIONI.

Nelle quali si praticano l'Equationi Algebratiche doue occorrono, oltre le . & numero, ancora li z. & \*.

*Prima.* Dato il rettangolo, o prodotto di due quantità, & la proportion loro trouare esse due quantità.



TA il prodotto 96. & la proportion delle due quantità come da A 8. a B 3. Pono la minore 12. però la maggiore sarà 27. ouero per schiar tutti posto la maggiore 82. la minore sarà 32. il prodotto loro è 242. il che sarà eguale a 96. quale 96. partito per 24. numero delli x. ne viene 4. & però 4. è il valore del x. onde la e. che è la Bz. del x. valerà la Bz. di 4. cioè 3. & le due quantità poste 82. & 32. faranno 116. & 6.

Regola.  
Con il duto de i dui termini della proportion data delle due quantità si parta il prodotto dato d'esse due quantità, & dell' auuenimento presa la Bz. quadra, ella si moltiplichi con i dui termini dati, che i dui resultanti faranno le due quantità cercate.

*Seconda.* Dato il prodotto di due quantità, & la somma de i dui quadrati loro trouare esse due quantità.

TA il prodotto di due quantità 20. & la somma de i dui quadrati loro sia 104. Per trouare esse due quantità, Pono i vna essere 12. che l' altra sarà quello, che nasce a partire 20. prodotto loro

to loro per essa 12, cioè sarà  $\frac{30}{12}$ , il loro quadrati sono 12, &  $\frac{400}{12}$ , che la loro somma, cioè  $12 \frac{100}{12}$ , sarà eguale a 104. & moltiplicando per 12, per leuare il rotto, haueremo 128400, eguale a 1042, che in questa Equatione di 12, & numero eguale a 2, si caua il numero 400, dal quadrato de 12, mita di 104, numero del 12, qual quadrato è 1704, & del restante 204, si piglia la Bz, che è 48, & questa si giunge, & caua a 12, mita detta del 104, numero del 12, & ne risultano 100, & 4, ciascuno delli quali è valuta del 2, dignità minore delle due della Equatione (che questa Equatione di 2, & numero eguale a 2, ha due valute del 2, & però della 2,) onde Bz 100, & Bz 4, cioè 10, & 2, saranno le due valute della 2, cioè le due quantità cercate.

Da questa operatione Algebrica deriuando la semplice regola numerale in simili casi, si potrà dire.

Regola.

Dal quadrato della mita della somma delli dui quadrati delle due quantità si caui il prodotto d'esse due quantità, & la Bz, del restante si giunga, & caui alla mita della somma detta delli loro dui quadrati, & di ciascuno delli dui risultanti si pigli la Bz, che li dui auuenimenti faranno le due quantità cercate.

Ancora considerando, che quando vna quantità è diuisa in due parti come si vogli (cioè si fanno esse eguali fra loro, & ineguali) allhora il quadrato d'essa quantità è quanto la somma delli dui quadrati d'esse due parti, giuntoli il rettangolo, o dutto dell'vna parte in l'altra due volte (che preso per esempio la quantità 12, & diuisa in due parti A 10, & B 2, il quadrato di 12, cioè 144, è eguale alla somma di 100, & 4, quadrati di 10, & 2, giuntoli 20, & 20, che sono dui dotti di 10, in 2, & dui di 2, in 10, si vede, che 100, 4, 20, & 20, giuntti insieme fanno 144,) perché inteso il 12, diuiso nelle due parti dette 10, & 2, si conosce, che il dutto di 12, in 12, è quanto la somma de dotti di esso 12, in 10, & in 2, fue parti totali, & di questi dui dotti il dutto di 12, in 10, (inteso pure il 12, diuiso in 10, & 2,) è quanto li dotti di 10, in 10, & di 2, in 10, & l'altro dutto di 12, in 2, è quanto li dotti di 10, in 2, & di 2, in 2, onde il totale dutto di 12, in 12, cioè il quadrato di 12, è eguale alla somma di questi quattro dotti, cioè di 10, in 10, di 2, in 10, di 10, in 2, & di 2, in 2, quali sono il quadrato di 10, il quadrato di 2, & dui dotti di 10, in 2, cioè li dui quadrati delle due parti giuntoli il doppio del prodotto dall'vna parte nell'altra.) Se immagineremo le due quantità, che si cercano, essere le due parti d'vna totale quantità D, la somma de i dui quadrati, delle quali due parti è 104, & l'vno dutto d'esse parti 20, giungendoli noi vn altro loro dutto, cioè 20, allhora la somma totale di 104, 20, & 20, cioè 144, potrà ad essere il quadrato della totale quantità D, cioè la somma delle due quantità cercate, per il che cōueniente trouare due quantità tali, che la somma loro sia 12, & il loro rettangolo, o prodotto sia 20, cioè diuidere 12, in due parti tali, che il loro prodotto sia 20, & ci potremo pure seruire della Regola della cosa, o Algebra, all'ordinario.

Ma poiche d'vna quantità D 12, diuisa in due parti A 10, & B 2, il quadrato 144, è eguale alla somma de' quadrati delle due parti, & al doppio del dutto d'esse parti, supponendo noi la A 10, maggiore esser'anco diuisa in due parti, delle quali l'vna sia la B 2, parte minore della totale D 12, & l'altra sia la differenza d'esse A, & B, cioè E 8, vedremo similmente, che il quadrato d'esso A 10, maggiore è eguale al quadrato di B 2, al quadrato di E 8, (differenza di A 10, & B 2,) & al dutto di B 2, in E 8, due volte, cioè al dutto della quantità minore B 2, in se stessa, & d'essa B 2, nella differenza 8, d'essa alla A, maggiore due volte, ma il dutto della minore 2, & in se stessa, & nella differenza detta 8, è quanto il dutto d'essa minore 2, nella totale maggiore A 10, onde dui dotti della minore 2, nella differenza detta 8, con dui quadrati d'essa minore 2, sono eguali a dui dotti della minore B 2, nella maggiore A 10, per il che il quadrato della quantità minore B, con il quadrato della maggiore A, cioè la somma 104, d'essi dui quadrati è quanto il quadrato della E 8, differenza di dette due quantità A, B, & giuntoli il doppio del dutto d'esse due quantità A, B, onde il quadrato della quantità maggiore A, supera il quadrato della minore B, nel quadrato di E 8, differenza d'esse due quantità, & nel doppio del rettangolo loro, cioè il quadrato di E 8, differenza delle due quantità A 10, B 2, è sempre quello, che resta a cauare il doppio del loro rettangolo, o prodotto, dalla somma 104, de' quadrati loro, onde cauando il doppio del prodotto delle due quantità A, B, dalla somma de i quadrati loro, la Bz, del restante è la differenza d'esse due quantità, che quando si giungano esso doppio del prodotto loro (cioè 40,) alla somma de' quadrati loro (cioè a 104,) la Bz, della somma (144, come habbiamo veduto) è sempre la somma (12,) d'esse due quantità A 10, B 2. Per il che si vede, che il quadrato della somma di due quantità è sempre diiferente, & maggiore del quadrato della differenza delle istesse due quantità nel quadruplo del rettangolo, o prodotto loro, cioè 144, quadrato di 12, somma di 10, & 2, supera 64, quadrato di 8, differenza delli istessi 10, & 2, in 80, quadruplo di 20, prodotto delli medesimi 10, & 2.

G 2

Onde

Onde dato il prodotto 20. di due quantità, & la somma 104. dei quadrati loro, per trouare esse due quantità si può dire per Regola. Al 104. somma de' quadrati delle due quantità si giunga, & caui 40. doppio del prodotto d'esse due quantità, & deli doi restanti 144. & 64. si pigliino le 32. che sono 12. & 8. & queste faranno la somma, & la differenza delle due quantità, onde cauato la differenza 8. dalla somma 12. che resta 4. la sua metà 2. è la quantità minore, & il restante fino al 12. (o il congiunto d'esso 2. all'8.) che è 10. sarà la quantità maggiore.

Hora si può auuertire, che in quello quesito, che dice, Di due quantità il dutto, & rettangolo. è 20. & la somma de' quadrati loro è 104. si domandano esse due quantità. Noi per trouarle possiamo vna essere 12. & l'altra 20. fino d'12. cioè 20. da partire per 12. che forto infirma di sotto ha 20. per numeratore, & 12. per denominatore) siamo peruenuti ad Equatione d'12. p. 400. eguale à 1042. nella quale mediante l'operazione si conosce, che il 104. numero dell'è sempre la somma delli quadrati d'esse due quantità, & il 400. numero dell'Equatione è sempre il quadrato del 20. prodotto di dette due quantità. Et perche dalla Regola per hora mostrata sappiamo che esse quantità si trouano giungendo, & cauando il doppio del prodotto loro, cioè 40. alla somma de' quadrati loro, cioè à 104. che se risultano 144. & 64. le 32. loro sono 12. & 8. sono la somma, & la differenza d'esse due quantità (essendo perciò il 144. & il 64. il quadrato della somma, & il quadrato della differenza di dette due quantità) perche cauato la differenza dalla somma la metà del restante è la quantità minore, & il rimanente poi della somma è la quantità maggiore, & si può anco dire, Giunta, & cauata la metà della differenza 8. dalla metà della somma 12. cioè 4. & 6. i doi restanti sono le due quantità, che vengono ad essere due valore della 1. nell'Equatione detta d'12. p. 400. eguale à 1042. Di qui veniamo a conoscere, che alla nostra Equatione si può dare anco questa Regola, cioè. Quando 12. & numero sono eguali à 20. Piglisi la 32. quadra del numero dell'Equatione, & essa 32. (che viene sempre ad essere il dutto delle due quantità cercate, & però il dutto delle due valore della 1.) si doppi, qual doppio si giunga, & caui al numero della 1. dell'Equatione, & di ciascuno delli doi restanti (che vengono ad essere l'uno il quadrato de la somma delle due quantità cercate, & vogliamo dire della somma delle due valore della 1. & l'altro il quadrato della differenza delle due istesse quantità) si pigli la 32. (che sono la somma, & la differenza delle due quantità) & cauata la minore dalla maggiore, la metà del restante sarà la valuta minore della 1. (cioè la quantità minore) & quello, che rimane nella maggiore oltre à quella metà del restante detta, sarà la valuta maggiore della 1. (cioè la quantità maggiore) Però in 12. p. 400. eguale à 1042. presa la 32. del numero 400. che è 20. & 20. & il suo doppio 40. giunto, & cauato à 104. numero della 1. ne risultano 144. & 64. le 32. loro sono 12. & 8. la differenza è 4. la metà della quale è 2. che è la valuta minore della 1. & il rimanente del 12. cioè 10. è la valuta maggiore. Et hauendo poniamo 12. p. 88. eguale à 262. Si piglierà la 32. di 88. numero dell'Equatione, & è 32. (e così) appiamo, che questa Equatione può nascere da questo, che dica. Trouasi due quantità, il dutto delle quali sia 32. & la somma dei quadrati loro sia 264. numero della 1. quale si doppij, & fa 32. 32. che si giunga, & caui à 26. numero della 1. & ne risultano 26 p. 32. 32. & 26 m. 32. 32. di ciascuno de' quali si pigli la 32. & sono 32. 2 p. 2. & 32. 2 m. 2. che cauata la 32. 2 m. 2. dalla 32. 2 p. 2. resta 4. che la metà è 2. & è una valuta della 1. & il resto del 32. 2 p. 2. cioè 32. 2. è l'altra valuta della 1. Ma perche queste quantità 32. 2 p. 2. Binomio, & 32. 2 m. 2. Residuo, sono sempre Binomio, & Residuo l'uno dell'altro, & però à cauare il Residuo dal Binomio resta sempre il doppio della parte minore, cioè hora il doppio di 2. del qual restante si piglia poi sempre la metà (per la valuta minore della 1.) questa metà necessaria mēte farà sempre la medesima parte minore 2. & perche ella ficca dal totale Binomio 32. 2 p. 2. di necessità il rimanente sarà sempre la parte maggiore hora 32. 2. quale 32. 2. è la valuta maggiore della 1. essendo la minore il 2. detto; perche breuemente vediamo, che giunto 32. 32. à 26. & della somma 26 p. 32. 32. presa la 32. che è 32. 2 p. 2. queste due parti del Binomio senza l'altra Operatione ci mostrano in loro medesime le due valore della 1. essere 32. 2. & 2. Onde quando si giungere il doppio della 32. del numero dell'Equatione al numero della 1. ne risulta vn Binomio, allhora presa la metà d'esso Binomio, le due parti d'essa sua 32. che è vn'altro Binomio, vengono ad essere le due valore della 1. & quando anco si giungere il doppio della 32. del numero dell'Equatione al numero della 1. non ne risultasse Binomio, cioè che esse si potessero vnire insieme, essendo communicanti fra loro, noi nondimeno piacendoci, potremo giungerle insieme con il segno p. in forma di Binomio, & d'esso Binomio pigliare la 32. al modo delli Binomij, che del Binomio, che ne deriuasse la parte maggiore sarà la valuta maggiore della 1. & la parte minore sarà la valuta minore, onde nell'Equatione d'12. p. 400. eguale à 1042. giunto 40. (doppio di 20. 32. di 400. numero dell'Equatione) à 104. numero de' 2. & à 104 p. 40. & di questo Binomio

prela la  $\frac{1}{2}$ , che è 10 p 2, le due parti di esso Binomio 10 p 2, cioè 10, & 2, sono le due valute della  $x$ .

Di 104 p 40, si piglia la  $\frac{1}{2}$ ,

|       |                          |    |
|-------|--------------------------|----|
| 104   | 52                       | 52 |
| 10816 | 48                       | 48 |
| 1000  | 100                      | 4  |
| 9216  | 10                       | 2  |
| 106   | però di 104              |    |
| 106   | p 40, la $\frac{1}{2}$ è |    |
| 48    | 10 p 2.                  |    |

Ancora hauendo 1 p 100, eguale à 26 x. Prefa la  $\frac{1}{2}$ , di 100, che è 10. (questo 10 sarà il duto delle due valute della  $x$ .) il suo doppio 20, si giunga, & caui al 26, numero delli x. (che hora non ne deriuano binomio, & residuo, ne manco curandoci di usare il p, & m, fuori del bisogno ordinario) & ne risultano 46, & 6, le loro  $\frac{1}{2}$ , sono  $\frac{1}{2}$  46, &  $\frac{1}{2}$  6, che cauata  $\frac{1}{2}$  6, minore da  $\frac{1}{2}$  46, maggiore, il restante è  $\frac{1}{2}$  46 m  $\frac{1}{2}$  6, & di questo la metà è  $\frac{1}{2}$  11  $\frac{1}{2}$  m  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , quale è la valuta minore della  $x$ , che cauata da  $\frac{1}{2}$  46, il rimanente  $\frac{1}{2}$  11  $\frac{1}{2}$  p  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , farà la valuta maggiore.

Et hauendo 1 p 140, eguale à 26 x. Prefa la  $\frac{1}{2}$ , di 140, che è  $\frac{1}{2}$  140. (Et sarà il duto, & restangulo delle due valute della  $x$ .) il suo doppio  $\frac{1}{2}$  560, giunto al 26, numero delli x, fa 26 p  $\frac{1}{2}$  560, del che, perche è Binomio bastarà pigliare la  $\frac{1}{2}$ , (se bene non è Binomio quadrato) nel modo ordinario, che cauato 560, quadrato del nome minore da 676, quadrato del nome maggiore, resta 116, del quale prefa la  $\frac{1}{2}$ , che è  $\frac{1}{2}$  116, la sua metà è  $\frac{1}{2}$  29, che si giunge, & caua à 11, metà di 26, nome maggiore, & delli due risultanti, che sono 13 p  $\frac{1}{2}$  29, & 13 m  $\frac{1}{2}$  29, prefe le  $\frac{1}{2}$ , che sono  $\frac{1}{2}$  13 p  $\frac{1}{2}$  29, &  $\frac{1}{2}$  13 m  $\frac{1}{2}$  29, esse giore insieme fanno  $\frac{1}{2}$  13 p  $\frac{1}{2}$  29 p  $\frac{1}{2}$  13 m  $\frac{1}{2}$  29, & questo è la  $\frac{1}{2}$ , del Binomio detto 26 p  $\frac{1}{2}$  560, per il che esse due parti della  $\frac{1}{2}$ , cioè  $\frac{1}{2}$  13 p  $\frac{1}{2}$  29, &  $\frac{1}{2}$  13 m  $\frac{1}{2}$  29, faranno le due valute della  $x$ .

Et se bene questa Regola ne gl'empj detti appare più lunga, ò di maggiore operatione, che nò faria la Regola ordinaria (che nell'Equatione di 1 p 140, eguale à 26 x, si cauaria il numero 140, da 169, quadrato di 13, metà di 26, numero delli x, & del restante 29, prefa la  $\frac{1}{2}$ , che è  $\frac{1}{2}$  29, ella si giungeria, & cauaria al 13, & di ciascuno delli due risultanti 13 p  $\frac{1}{2}$  29, & 13 m  $\frac{1}{2}$  29, prefa la  $\frac{1}{2}$ , ciascuna d'esse, cioè  $\frac{1}{2}$  13 p  $\frac{1}{2}$  29, &  $\frac{1}{2}$  13 m  $\frac{1}{2}$  29, faria valuta della  $x$ , & nell'altre Equationi superiori pure si operaria nel medesimo modo) nondimeno in alcune Equationi può anco essere più breue, che hauendo 1 p 132  $\frac{1}{2}$ , eguale à 26 x. Prefa la  $\frac{1}{2}$ , del numero 132  $\frac{1}{2}$ , ella è 1  $\frac{1}{2}$ , & il suo doppio 23, giunto, & cauato à 26, numero de' x, fa 49, & 3, le  $\frac{1}{2}$ , de i quali risultanti sono 7, &  $\frac{1}{2}$  3, che la loro differenza è 7 m  $\frac{1}{2}$  3, la metà del che, cioè 3  $\frac{1}{2}$  m  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , è la valuta minore, & il restante fino à 7, cioè 3  $\frac{1}{2}$  p  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , è la valuta maggiore.

Ma operando con la Regola, ò modo ordinario. Da 169, quadrato di 13, metà del numero de' x, si cauaria il numero 132  $\frac{1}{2}$ , che resta 36  $\frac{1}{2}$ , la  $\frac{1}{2}$ , del che si giungeria, & cauaria à 13, metà del numero de' x, & di ciascuno de i due risultanti, che sono 12 p  $\frac{1}{2}$  36  $\frac{1}{2}$ , & 13 m  $\frac{1}{2}$  36  $\frac{1}{2}$ , si pigliaria la  $\frac{1}{2}$ , & elle fariano le due valute della  $x$ , & per pigliare la  $\frac{1}{2}$ , del Binomio 13 p  $\frac{1}{2}$  36  $\frac{1}{2}$ , dal quadrato di 13, si caua il quadrato di  $\frac{1}{2}$  36  $\frac{1}{2}$ , & del restante 132  $\frac{1}{2}$ , si piglia la  $\frac{1}{2}$ , che è 1  $\frac{1}{2}$ , la metà della quale, cioè 5  $\frac{1}{2}$ , si giunge, & caua alla metà del 13, cioè à 6  $\frac{1}{2}$ , & ne restano 13  $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$ , di ciascuno de' quali si piglia la  $\frac{1}{2}$ , & sono 3  $\frac{1}{2}$ , &  $\frac{1}{2}$ , da giungere insieme, & fanno 3  $\frac{1}{2}$  p  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , che è la  $\frac{1}{2}$ , del Binomio detto; Et qsta è la valuta maggiore della  $x$ , Et la  $\frac{1}{2}$ , del Residuo 13 m  $\frac{1}{2}$  36  $\frac{1}{2}$ , farà il Residuo 3  $\frac{1}{2}$  m  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , quale è l'altra valuta minore della  $x$ . Et così si vede questa Operatione essere più lunga della noua sopradetta.

Et se hauesimo 1 p 529, eguale à 104 x, doue operando non occorreriano rotti se non poi in fine, essa Operatione pure faria breue mediante la Regola noua; Che la  $\frac{1}{2}$ , di 529, cioè 23, doppiata fa 46, quale giunto, & cauato à 104, numero delli x, ne restano 150, & 58, le loro  $\frac{1}{2}$ , sono  $\frac{1}{2}$  150, &  $\frac{1}{2}$  58, quali sono la somma, & la differenza delle due valute della  $x$ , che cauato  $\frac{1}{2}$  58, da  $\frac{1}{2}$  150, & del restante prefa la metà ella è  $\frac{1}{2}$  37  $\frac{1}{2}$  m  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , per la valuta minore della  $x$ , quale cauata da  $\frac{1}{2}$  150, il rimanente Binomio  $\frac{1}{2}$  37  $\frac{1}{2}$  p  $\frac{1}{2}$  1  $\frac{1}{2}$ , è l'altra valuta maggiore.

Et perche si è mostrato, che le Equationi d'1 x, x, & numero sono simili alle Equationi d'1 x, x, & numero, mentre che il numero de' x, della superiore è il medesimo, che il numero delle x, della inferiore; & che anco il numero semplice, ò senza denominatione dell'vna è il medesimo, che il numero semplice dell'altra, ma sempre il fine della Operatione della superiore mostra il valore del x, in essa superiore, & il fine della Operatione della inferiore mostra il valore della x, in essa inferiore.



*Terza. Dato il prodotto di due quantità, & la differenza loro trouare esse quantità.*

**S**IA 20. il prodotto di due quantità, & 8. la differenza loro. Già sappiamo (come si è mostrato nella antecedente seconda Operatione) che il quadrato della differenza di due quantità giunto al quadruplo del prodotto loro, forma il quadrato della somma loro, onde a 64 quadrato di 8. differenza data, giunto 80. quadruplo di 20. prodotto dato, il composto 144. è il quadrato della somma delle due quantità, però essa somma sarà la 12. di 144. cioè 12. dalla quale cauato 8. differenza loro, & resta 4. la metà 2. è la quantità min. però la maggiore sarà 8. di più, cioè 10.

Et per Algebra. Posta la quantità minore 1. l'altra maggiore sarà 1 + p 8. il prodotto loro è 1 + p 8. & è eguale a 20. prodotto dato, onde a 16. quadrato di 4. metà d'8. numero delle 2. giunto 20. fa 36. la 12. del quale è 6. che cauato 4. metà d'8. numero delle 2. il restante 2. è il valore della 1. & è la quantità minore posta 1. però 8. di più, cioè 10. sarà la maggiore.

Ma perché sappiamo, che a trouare detto 2. quantità minore, si può con il modo di sopra dato, giungere il quadruplo di 20. con il quadrato di 8. cioè 80. con 64. & della somma 144. presa la 12. che è 12. & di questo 12. cauato l'8. pigliare la metà del restante 4. che è il 2. cercato. Si vede, che a detta Equatione d'1 2. & 2. eguale a numero si potrà anco dare la Regola dicédo.

Al quadrato del numero delle 2. si giunga il quadruplo del numero dell' Equatione, & dalla 12. della somma si caui il numero delle 2. che la metà del restante sarà il valore della 1. Ma questa Regola faria simile all'ordinaria, perché a giungere il quadruplo d'un numero 20. al quadrato d'un numero 8. & della somma pigliare la 12. che è 12. esso 12. è sempre doppio al 6. che è 12. del numero, che nasce a sommare il solo 20. con il solo quadrato della metà dell'8. poiche essendo la somma di 80. & 64. quadrupla alla somma di 20. & 16. la 12. della maggiore viene ad essere solamente doppia alla 12. della minore; poi del 12. a cauare l'8. & del restante 4. pigliarne la metà 2. resulta l'istesso, che a cauare la sola metà d'8. dalla sola metà di 12. cioè 4. da 6. Conosciamo nondimeno, che quando noi non hauesimo cognitione della Regola dell' Equatione d'1 2. & 2. eguale a numero, la potremmo deriuare dal sopradetto modo, & poi anco abbreviarla, riducendola alla breuità del modo ordinario; Et vediamo, che questa Equatione di 1 2. & 2. eguale a numero non può hauere se non vna sola valuta della 2. perché si peruerà ad essa Equatione nel ponere la quantità minore essere 1. 2. qual quantità minore non può essere se non vna sola determinata quantità.

Et ponendosi la quantità maggiore essere 1 + p 8. & la minore 1 + m 8. il prodotto loro 1 + m 8. 2. sarà eguale a 20. & però 1 + p 2. eguale a 8 + p 20. che in questa Equatione pure si giunge 16. quadrato di 4. metà d'8. numero delle 2. con 20. & della somma 36. si piglia la 12. che è 6. ma ad esso 6. si giunge il 4. metà dell'8. & fa 10. valore della 2. che è la quantità maggiore; Quale Operatione può pure anch'ella deriuarsi dal modo sopradetto; Et conoscere, che questa Equatione d'1 2. eguale a 2. & numero, mediante la quale si troua sempre la quantità maggiore, ha sempre vna sola valuta della 2. perché essa quantità maggiore è sempre vna istessa sola determinata quantità. Et ponendosi le due quantità essere 1 + p 4. & 1 + m 4. Il loro prodotto 1 + m 16. sarà eguale a 20. onde giunto 16. a ciascuna banda si hauerà 1 + p 2. eguale a 36. però la 2. valerà la 12. di 36. cioè 6. (che è sempre la metà della somma delle due quantità) al quale 6. giunto, & cauato al 4. ne restano 10. & 2. per le due quantità cercate; Onde di qui si può estrarre la Regola numerale, che dica.

Al quadrato della metà della differenza delle due quantità si giunga il prodotto d'esse due quantità, & della somma si pigli la 12. alla quale si giunga, & caui la metà della differenza delle due quantità, che i dui risultanti saranno le due quantità. Et la medesima Regola si estrarria dall'operare dell'altre due positioni. Et da questa istessa Regola breuemente estraendo la Regola lineale si potrà dire.

### *Problema, ouero Operatione.*



**D**A VNA la grandezza d'un rettangolo, & la differenza de' suoi dui lati contineti vno de' quattro suoi angoli retti, trouare ciascuno d'essi dui lati.

*Regola.*

Alla metà della differenza de' dui lati si accompagni ad angolo retto la potente nella grandezza data. & ad esse due si tiri la subtenta a c, & sia a, il termine estremo della metà della differenza data, & c, il termine estremo della potente nella grandezza data, essendo r, il punto loro angolare retto; poi fatto centro il punto a, & semidiametro la subtenta a c si formi vn cerchio, allungando poi la a r, da ciascuna banda fino alla circonferenza, & sia in g, verso a, & in n, verso r, che allhora le due rette r g & r n, saranno i dui lati cercati.

*Dimo.*

**Dimostrazione.** Imaginato dalli dui termini  $n$ , &  $g$ , del diametro, alla cima, ò punto  $c$ , tirate le due rette  $n$ ,  $c$ , &  $g$ , elle formaranno l'angolo  $n$ ,  $c$ ,  $g$ , retto, perche sarà fatto nel mezzo cerchio, onde nel triangolo rettangolo  $n$ ,  $c$ ,  $g$ , inteso, che ha l'angolo  $c$ , retto sù la oppofiti bafe  $n$ , & tirata la perpendicolare  $c$ ,  $r$ , ella è media proportionale fra le due parti  $n$ ,  $r$ , &  $g$ , della bafe, & però il duto di dette parti  $n$ ,  $r$ , &  $g$ , è eguale al quadrato di detta  $c$ ,r, ma al medefmo quadrato di  $c$ ,  $r$ , (per la costruzione) è eguale il rettangolo da farfi, però il duto di  $n$ ,  $r$ , in  $g$ , sarà eguale al rettangolo cercato, & conseguentemente esse  $n$ ,  $r$ , &  $g$ , faranno i lati d'effo rettangolo; & sono differenti fra loro nella differenza data, perche  $g$ , supera  $r$ ,  $n$ , nel doppio di  $a$ ,  $r$ , presa eguale alla metà della differenza data.

In pratica si potrà applicare dicendo. Si vuol fare vna stanza, Giardino, Tavola, ò altra cosa quadrangolare rettangola, eguale alla superficie  $M$ , ma che i suoi dui lati continenti vno de' quattro angoli retti, cioè la lunghezza, & l'altezza siano differenti fra loro quanto è la linea  $p$ ,  $a$ , si domanda esse lunghezza, & larghezza. Et così si possono accorgere il leguainoli, Archiretti, & altri, che à volere esercitare le loro professioni eccellentemente, conuiene hauere bastevole cognitione delle Scienze de' numeri, & linee.

Ad vn Sergente potrà seruire in questo, che diceffe. Si hanno 2400. fanti da porre in ordinanza quadrangola tale, che nella fronte siano 30. fanti più, che nel fianco, si domanda quanti fanti faranno per fianco, & quanti per fronte. Che qui il rettangolo, ò prodotto de i lati è 2400. & la differenza de i lati è 30. però à 900. quadrato della differenza giunto il quadruplo del 2400. rettangolo de i lati, cioè giunto 9600. la somma 10500. è il quadrato della somma de i dui lati fianco, & fronte, però la sua  $\sqrt{10500}$ , cioè 102. (E non occorre tener conto del resto, essendo queste uniti di fanti infinitissimi) farà la somma d'essi dui lati; da questa cauato il 30. differenza data de' dui lati resta 72. che la sua metà 36. farà il lato minore, cioè il fianco, & perciò il resto del 102. cioè 66. farà la fronte; che multiplicati insieme fanno 2376. che faranno i fanti della ordinanza, perche si auanzaranno fanti 24.

**Quarta. Dato il prodotto di due quantità, & la somma loro trouare esse due quantità.**

**S**i la il prodotto delle due quantità 20. & la somma loro 12. Per trouare esse quantità sappiamo, che dal quadrato della somma di due quantità cauato il quadruplo del prodotto loro, il restante è il quadrato della differenza loro, onde da 144. cauato 80. & del restante 64. presa la  $\sqrt{64}$ , che è 8. questo 8. è la differenza delle due quantità, che cauata dalla somma 12. la metà del restante 4. cioè 2. è la quantità minore, & però 10. è la maggiore.

Per Algebra, posto l'vna 12. & l'altra 12  $\sqrt{12}$ , il prodotto loro 12  $\sqrt{12}$  12. è eguale à 20. però 12  $\sqrt{12}$  sono eguali ad 12  $\sqrt{20}$ , onde da 36. quadrato di 6. metà di 12. numero delle 2. cauato 20. resta 16. che la  $\sqrt{16}$ , è 4. quale giunta, & cauata à 6. i resultanti 10. & 2. sono le due quantità. Et poste le due quantità 6  $\sqrt{12}$  2. & 6  $\sqrt{12}$  12. il prodotto è 36  $\sqrt{12}$  12. eguale à 20. cioè 36. eguale ad 12  $\sqrt{20}$ , che cauato 20. da 36. di hauerà 2. eguale à 16. & la 2. vale 4. però 6  $\sqrt{12}$  4. & 6  $\sqrt{12}$  4. sono le due quantità.

**Quinta. Data la differenza di due quantità, & la somma de i quadrati loro, trouare esse due quantità.**

**S**i la la differenza delle due quantità 8. & la somma de i quadrati 104. Per trouare esse due quantità. Sappiamo già che alla somma de i quadrati loro giunto il doppio del prodotto loro senè forma il quadrato della somma loro, & che ancora dalla medefma somma de i quadrati delle due quantità cauato l'istefso doppio del prodotto loro, il restante è il quadrato della differenza d'esse due quantità, perche il quadrato della somma delle due quantità, & il quadrato della differenza delle istefse due quantità, posti insieme vengono à contenere vna volta la somma delli dui quadrati delle quantità; il doppio del prodotto d'esse quantità; & vn'altra de' quadrati delle due quantità manco il doppio del prodotto d'esse quantità, onde συμπilato il doppio del prodotto d'esse due quantità con il mào il medefmo doppio del prodotto d'esse due quantità (poiche effo doppio del prodotto delle due quantità, che si giange vna volta, si caua poi l'altra volta) si vede, che il quadrato della somma delle due quantità con il quadrato della differenza delle istefse due quantità, sono eguali à due volte, cioè al doppio della somma de' quadrati delle due quantità, onde hora, che la differenza data delle due quantità è 8. & però il suo quadrato è 64. quello deue essere differente dal doppio di 104. somma de' quadrati delle due quantità.

quantità intanto, quāto importa il quadrato della somma delle due quantità, peritche da 208. doppio del 104. canato questo 64. il restante 144. douerà essere il quadrato della somma delle due quantità onde la sua  $\sqrt{144}$  cioè 12. è la somma delle due quantità, & perche la differenza loro è 8. che canata da 12. somma resta 4. la sua metà 2. sarà la quantità minore, & però 10. sarà la maggiore.

Per Algebra posto la quantità minore 12. la maggiore sarà 12 + 8. i loro quadrati sono 12. & 12 + 16 + 64. la somma è 12 + 16 + 64. & è eguale a 104. cioè 12 + 16 + 64. eguale a 40. cioè 12 + 16 + 64. eguale a 10. che giunto il 20. a 16. quadrato di 4. metà del numero delle 2. & della somma 36. prela la 36. che è 6. & da questo cauato 4. metà dell' 8. numero delle 2. il 2. restante è il valore della 2. & però è la quantità minore, essendopoi 10. la maggiore. Ma posto la quantità maggiore 12. la minore sarà 12 - 8. i quadrati loro sono 12. & 12 - 16 + 64. la somma loro è 12 - 16 + 64. & è eguale a 104. però 12. eguale a 16 + 64. cioè 12. eguale ad 8 + 16. & 12 + 16 + 64. la somma loro è 12 + 16 + 64. & è eguale a 104. cioè 12 + 16 + 64. eguale a 40. cioè 12. eguale a 36. che la 2. vale 6. Et di qui la Regola faria, Cauare il quadrato della metà della differenza data dalla metà della somma de' quadrati delle due quantità nota, & alla radice del restante giungere, & cauare la metà della differenza data, che i due risultanti faranno le due quantità. Et lo Studente può sempre per sua esercitatione da ciascuno delli diuersi modi o giudiciali, o Algebratici estrarne le Regole numerali, & le lineali, che io per breuità ne lasso a lui la cura, essendo massime cose facilissime.

**Sesla.** Data la somma di due quantità, & la somma de i dui quadrati loro, trouare esse due quantità.

**Sol.** La somma delle due quantità, & 104. la somma de i dui quadrati loro. Per trouare esse due quantità, sappiamo che il doppio della somma de i quadrati delle due quantità, cioè hora 208. supera il quadrato della somma d'esse due quantità, cioè hora 144. nel quadrato della differenza delle due quantità, però esso quadrato della differenza delle due quantità sarà il 64. che resta cauare 144. da 208. & la 32. del 64. cioè 8. sarà essa differenza delle due quantità, & però esse saranno 12. & 10. ed me più volte s'è detto. Operifimò anco per Algebra, & se ne destinò le Regole al solito.

**Setima.** Data la somma di due quantità, & la somma de i dui quadrati loro, trouare esse due quantità.

**Sol.** La differenza delle due quantità, & 96. la differenza de i dui quadrati loro. Quando la differenza di dui quadrati s'applica alla differenza de i dui lati loro, ne nasce la somma delli dui lati, perche conuersamente multiplicando la differenza de i dui lati via la somma d'essi dui lati, se ne produce la differenza de i dui quadrati loro. Cioè partito la differenza de i quadrati di due quantità per la differenza de i dui lati d'essi quadrati, o vogliamo dire per la differenza delle due quantità, che sono le radici, o lati d'essi dui quadrati, l'aumento è la somma de i dui lati, o quantità dette, però partito 96. per 8. auuenimmo 12. è la somma delle due quantità, differenti nell'8. dato, onde esse sono 2. & 10. Et che il prodotto della somma di due quantità multiplicata via la differenza d'esse quantità, sia eguale alla differenza de i quadrati delle medesime due quantità, si può dimostrare così.

Siano le due quantità A. & B. ma per breuità adoprando i numeri in vece di lettere dell'Alfabetto, daremo il nome di numero alle quantità, alli quadrati loro, &c. (quali nomi di numeri si pigliano come nomi, & non come numeri particolari, & però si possono trasmutar sempre in altri nomi, o di lettere, o di parole, a benplacito) dicendò, siano le due quantità 10. & 2. la loro differenza 8. la somma 12. i quadrati loro 100. & 4. & la differenza d'essi quadrati 96. quale si dice essere eguale al prodotto, che nasce da moltiplicare 12. somma delle due quantità via 8. differenza loro. Dimostrazione. Inteso 10. diuiso in 2. & 8. il duto di 10. in 10. sarà quanto li duti di 8. in 10. & di 2. in 10. Ancora si detto di 2. in 10. è quanto li duti di 8. in 2. & di 2. in 2. che 8. & 2. forma il totale 10. onde il duto di 10. in 10. cioè il quadrato di 10. è quanto questi tre duti, cioè di 8. in 10. di 8. in 2. & di 2. in 2. onde da esser duto l'auento l'ultimo di 2. in 2. cioè il quadrato di 2. quantità minore. Al dui restanti di 8. in 10. & di 8. in 2. vengono a formare la differenza, che è dal quadrato di 10. al quadrato di 2. & vogliamo dire impengono quello, in che il

quadrato della maggior quantità sopra il quadrato della minore) sarà 8. via 10. & 8. via 2. importa-  
no quanto il solo duto di 8. via la somma di 10. & 2. cioè via 12. però 8. via 12. è quanto il 96.  
differenza de' quadrati di 10. & 2. & perche 8. è la differenza delle due quantità di 10. & 2.  
è la somma loro, è chiaro, che il duto della loro somma via la loro differenza è eguale alla diffe-  
renza de' quadrati delle istesse due quantità.

Per Algebra possiamo quantificare minore 12. & la maggiore 18. li quadrati sono 144. & 324.  
162 & 64. la loro differenza è 162. & il che è eguale a 96. onde, cauto 64. da 96. che resta 32.  
questo è eguale a 16. però la 16. vale 12. & la quantità minore. La Regola non che sarà. Ca-  
uti il quadrato della differenza delle due quantità dalla differenza de' quadrati di esse quantità,  
& il restante si parta per il doppio della differenza d'esse due quantità, & il numero restante sarà  
la quantità minore.

Ma posto la quantità maggiore 12. & la minore sarà 18. i quadrati sono 144. & 324. & il  
64. la differenza loro è 162. & è eguale a 96. onde giunto 64. a 96. fa 160. & questo è eg-  
uale a 16. & la 16. vale 12. & è la quantità maggiore. La Regola è. Allo Adia diferen-  
za de' quadrati delle due quantità si giunga il quadrato della differenza d'esse due quantità, &  
la somma si parta per il doppio della differenza d'esse due quantità, che fauenimento farà la  
quantità maggiore.

Et ponendosi la maggiore 14. & la minore 12. i quadrati loro saranno 196. & 144. & il  
& 12. & 16. la differenza loro sarà 16. & questo è eguale a 96. però la 16. vale 12. & le quan-  
tità sono 6. & 12. & 14. cioè 10. & 2.

La Regola sarà. Partita la differenza di due qua-  
drati delle due quantità per il doppio della differenza data d'esse due quantità, & all'auue-  
nimento si giunga, & il numero restante della differenza delle due quantità, che sarà il residuo, fa-  
ranno le due quantità.

**Quarta.** Data la somma di due quantità, & la differenza de' due quadrati loro,  
trovare le due quantità.

Si la somma di due quantità 12. & 96. la differenza de' due quadrati loro. Per trovare le  
due quantità già sappiamo, che il duto della somma di due quantità nella loro differenza  
produce il 96. differenza de' quadrati loro, però partendo il 96. per la somma data 12. fauen-  
imento 8. sarà la differenza delle due quantità, perche le saranno 10. & 2.

**Nota.** Dato il prodotto di due quantità, & la differenza de' due quadrati loro,  
trovare esse due quantità.

Si la 20. B. il prodotto delle due quantità, & 96. B. la differenza de' due quadrati loro. Per tro-  
uare esse quantità, Supposto A. essere la somma de' due quadrati delle due quantità, gioghen-  
do il doppio del prodotto B. cioè di 20. che il prodotto B. chiameremo 20. 50. il suo doppio 40. B.  
la somma cioè A. p. 40. sarà il quadrato della somma delle due quantità (per quella che già è tro-  
vata) & se dal medesimo A. somma de' quadrati delle due quantità, sottraiamo simile ore il  
doppio del prodotto B. cioè 40. il restante A. m. 40. sarà il quadrato della differenza delle due  
quantità. Ancora, la somma delle due quantità moltiplicata via la differenza d'esse due quantità, pro-  
duce la differenza de' quadrati delle istesse due quantità (come si è mostrato nella prima Opera) &  
quali differenza è data, & è pota essere 96. & la chiameremo 12. & nomineremo per 96. po-  
dà A. p. 40. & 96. & A. m. 40. faranno tre quantità continue proporzionali, cioè il quadrato della  
somma delle due quantità, & per commodità chiamasi 144. il 96. differenza de' quadrati delle  
due quantità, & il quadrato della differenza delle dette due quantità, & chiamasi 64. (perche sup-  
posto per commodità, che siano note le due quantità 12. & 20. & per la somma loro 12. & la differenza  
loro 8. sappiamo, che il duto di 12. in 8. cioè 96. è medio proporzionale fra il quadrato di 12. che è 144.  
& il quadrato di 8. che è 64. poiche da 144. a 96. è come da 12. a 8. nascono essi 144. & 96. da medie  
gliare dotti 12. & 8. per un istesso 12. & ancora da 96. a 64. & similmente come è dal medesimo 12. al me-  
desimo 8. nascono essi 96. & 64. da moltiplicare dotti 12. & 8. per un istesso 8. ma da tre quantità  
continue proporzionali il quadrato della media è quanto il prodotto delle due estreme, però il  
quadrato di 96. cioè 9216. sarà eguale al duto di 144. in 64. ma hora, perche essi 144. & 64.  
sono ignoti, chiamamo al duto di A. p. 40. & A. m. 40. che posto A. m. 40. potremo dire al duto di 12.  
p. 40. in 2. m. 40. quale è 12. in il quadrato di esso 20. (doppio di 10. dato) cioè quale è 12. in 1600.  
Sappiamo dunque, che 12. in 1600. è eguale a 9216. & per giogendo 1600. a ciascuna parte  
haueremo

haueremo 12. eguale a 10816. però la 2. valerà 104. onde A. posto 12. farà 104. al quale giunto, & cauato 40. doppio di 20. rettangolo, ò prodotto dato delle due quantità, i due risultanti, 144. & 64. faranno i quadrati della somma, & della differenza delle due quantità, però esse somma, & differenza saranno 12. & 8. onde le due quantità saranno 10. & 2. Et così si vede, che al quadrato della differenza de' quadrati delle due quantità giunto il quadrato del doppio del prodotto delle due quantità, ne risulta il quadrato della somma de' quadrati delle due quantità. Onde la Bz, quadra di questo risultante è la somma de' quadrati delle due quantità. Dato dunque il prodotto di due quantità, & la differenza de' i due quadrati loro, si manifesterà la somma de' i quadrati d'esse due quantità.

Ancora dato la somma de' i quadrati delle due quantità, & la differenza loro, ouero il prodotto delle due quantità, si manifestano esse due quantità. Che la somma 104. de' i quadrati delle due quantità 10. & 2. supera il quadrato della quantità maggiore 10. nel quadrato della minore 2. & la differenza 96. de' i medesimi due quadrati delle due quantità è superata dal quadrato della maggiore nel quadrato della quantità minore detta (cioè 104. è quanto 100 p 4. & 96. è quanto 100 m 4.) onde la somma 104. con la differenza 96. fanno in tutto quanto il doppio del quadrato della quantità maggiore, (che 100 p 4. & 100 m 4. fanno due volte 100. cioè 200.) però data la somma 104. de' i due quadrati delle due quantità, & la differenza loro 96. elle si giungino insieme, & del composto 200. si piglia la metà 100. che questo 100. è il quadrato della quantità maggiore, del quale si piglia la Bz, che è 10. & questo 10. è la quantità maggiore.

Ancora cauato il 100. detto da 104. ouero 96. da esso 100. che resta 4. questo 4. farà il quadrato della quantità minore, però la sua Bz, cioè 2. farà essa quantità minore.

Ancora, perchè la differenza de' i due quadrati delle due quantità è inferiore alla somma de' i due quadrati delle istesse due quantità, in quanto importa due volte, cioè nel doppio del quadrato della quantità minore, Cauato 96. da 104. & del restante 8. presa la metà 4. & di questo 4. presa la Bz, che è 2. esso 2. farà la quantità minore.

Et se fusse dato la somma de' i due quadrati delle due quantità 104. & il prodotto d'esse due quantità 20. Sappiamo, che al 104. giunto, & cauato 40. doppio del prodotto delle due quantità, i due risultanti 144. & 64. sono i quadrati della somma, & della differenza delle due quantità, però le loro radici, cioè 12. & 8. sono la somma, & differenza, onde cauato 8. da 12. la metà del 4. rimanente, cioè 2. è la quantità minore, & però 10. la maggiore.

Si può notare, che essendosi veduto di sopra, che a' giungere 9216. quadrato di 96. differenza de' quadrati delle due quantità (ò dutto della somma delle due quantità, nella differenza loro) con 1600. quadrato di 40. doppio di 20. prodotto delle due quantità, si 10816. che è il quadrato di 104. somma de' i quadrati delle due quantità; Si conolce, che date due quantità, che sono il 2. & 10. & formati i quadrati loro, & esfigionti insieme, & del composto trouato il quadrato, egli è tanto, quanto è quello, che risulta dal giungere al quadrato della differenza di detti due quadrati primi (cioè al quadrato di 96.) ò vogliamo dire al dutto della somma 12. delle due quantità nella differenza loro 8. il quadrato del doppio del dutto d'esse due quantità 100. & 2. fra loro.

Ma volendo soluere il quesito principale per Algebra, cioè, Daro il rettangolo, ò prodotto delle due quantità 20. & la differenza de' i due quadrati loro 96. volendo trouare le due quantità.

Potremo ponere vna delle due quantità, & sia la minore 12. che l'altra maggiore farà  $\frac{20}{12}$ , i quadrati sono 12. &  $\frac{400}{12}$ . che cauato questo minore da 12. maggiore resta 12 m  $\frac{400}{12}$ . il che è eguale a 96. & leuato il rotto, moltiplicando ogni cosa per 12. denominatore, haueremo 12 m 400. eguale a 962. cioè 12. eguale a 962 p 400. nella quale Equatione al numero 400. si giunge 2304. quadrato di 48. metà di 96. numero de' 2. & della somma 2704. si piglia la Bz, che è 52. & ad essa si giunge il 48. metà del 96. numero de' 2. & fa 100. che è il valore del 2. però la 2. che è Bz, del 2. valerà la Bz, di 100. cioè 10. onde 10. farà la quantità maggiore, con il qual 10. partendo il prodotto loro 20. l'auuenimento 2. farà la quantità maggiore.

Et perchè vedessimo, che al quadrato di 96. giunto il quadrato di 40. (doppio del rettangolo, ò prodotto 20.) la somma 10816. è il quadrato di 104. somma de' quadrati delle due quantità, conosciamo, che hora al quadrato di 48. metà del 96. giungendo il quadrato di 20. metà del 40. la somma 2704. verrà ad essere il quadrato della metà della somma de' i due quadrati delle due quantità, cioè la sua Bz, hora 52. farà la metà delli due quadrati delle due quantità, & però giuntoli, & cauaroli solo 20. prodotto delle due quantità, i risultanti 72. & 32. faranno le sole metà de' i quadrati della somma delle due quantità, & della differenza d'esse due quantità, che

perciò le 32, de i loro doppj 144. & 64. che sono 12. & 8. faranno essa somma delle due quantità, & differenza delle medesime quantità. Ouetto, & però le 32, delle loro mità 16. & 16. che sono 6. & 4. faranno la mità della somma, & la mità della differenza delle due quantità, però la loro somma 20. & la loro differenza 2. faranno le due quantità cercate.

La Regola mò derivandoci dalla sopradetta positione Algebratica sarà questa. Dato il rettangolo, & prodotto di due quantità, & la differenza de i due quadrati loro. Per trouare esse

Sia la quantità minore 12

la maggiore  $\frac{20}{12}$   
però 12. cauato da  $\frac{400}{12}$ , re-  
sta  $\frac{400}{12}$  m 12. eguale a 96.

Cioè 400. eguale a 12 p 96

|            |
|------------|
| 48         |
| 48         |
| 336        |
| 400        |
| 2704       |
| 52         |
| fi caua 48 |
| resta 4    |

la 32. è 2. per la quant. min.

**Decima.** Data la somma B, composta, & contenuta dal prodotto di due quantità, & dalli due quadrati d'esse quantità, & anco dato una d'esse due quantità trouar l'altra.

**S**I A B, contenuto dal prodotto delle due quantità, & dalli due quadrati delle due quantità 124. & sia D, una delle due quantità, 2. per trouar l'altra; Fono, che essa quantità, che si cerca, giuntoli la mità della data, sia 12. che così essendo 12. la mità della data, la sola cercata verrà ad essere 12 m 1. il suo quadrato è 12 m 2 p 1. che giunto al quadrato di 2. dato, cioè a 4. & al prodotto delle due quantità, cioè da 24. via 12 m 1. che è 12 m 2. fa 12 p 3. & questo è eguale a 124. dato, onde cauato 3. (qual 3. dall'operare, & dalla consideratione in astratto, si conosce essere sempre il  $\frac{1}{2}$  del quadrato della quantità data) da 124. il restante 121. è eguale ad 12. però la 2. vale 11. onde la quantità ignota posta 12. manco la mità della nota, cioè manco 1. farà 11 m 1. cioè 10.

Et se fusse nota la quantità 10. Posto l'ignota 12 m 5. il suo quadrato sarà 12 m 10 p 25. Il quadrato della nota è 100. Il rettangolo, o prodotto delle due quantità, cioè di 12 m 5, via 10 è 10 m 50. che giunti insieme fanno 12 p 75. & questo è eguale a 124. onde da 124. cauato 75. il restante 49. è eguale ad 12. però la 2. vale 7. onde la quantità cercata sarà 7 m 5. cioè 22. Reg.

Dalla somma data B. si caui li 2. del quadrato della quantità nota, & dalla B. del restante si caui la mità di detta quantità nota, che il rimanente è la quantità ignota.

Ancora si può considerare, che se 124. è la somma de i quadrati di due quantità con il rettangolo d'esse due quantità, & che la quantità nota sia 2. il quadrato della quale è 4. che cauato da 124. dato, il 120. che resta sarà perciò la somma del solo quadrato della quantità ignota, insieme con il prodotto delle due quantità, onde posto la quantità ignota 12 m 1. il suo quadrato 12 m 2 p 1. giunto a 24. m 2. tutto delle due quantità fa 12 m 1. & questo è eguale a 120. cioè 12. è uguale a 121. per il che la 2. vale 11. & la quantità ignota è 11 m 1. cioè 10.

Et se la quantità nota fusse 10. che così il quadrato della ignota con il prodotto delle due quantità faria 24. (onde l'ignota conuen che sia tale, che il duto d'essa in 10. & anco in se stessa facciano 24. & però debbe sia tale, che giunta a 10. & la somma moltiplicata per essa ignota, il prodotto sia 24.) posto l'ignota 12 m 5. il suo quadrato 12 m 10 p 25. giunto a 10 m 50. tutto delle due quantità, fa 12 m 25. il che è eguale a 24. onde giunto 25. (che è sempre il  $\frac{1}{2}$  del quadrato della quantità nota) a ciascuna banda, haueremo 12. eguale a 49. però la 2. vale 7. onde la quantità cercata sarà 7 m 5. cioè 22.

**diò 3.** Et la Regola sarà. Data vna delle due quantità, che formano vn rettangolo, ò prodot-  
to, & data la somma d'effo prodotto con il quadrato della quantità ignota. Per trouare la  
quantità ignota. Alla somma data si giunga l' $\frac{1}{4}$ . del quadrato della quantità nota, ò vogliamo  
dire il quadrato della mità della quantità nota, & dalla 32. della somma si cavi la mità della quan-  
tità nota, che il restante sarà la quantità ignota.

Onde essendo 10. la quantità nota, & 24. la somma del prodotto loro insieme con il quadra-  
to della quantità ignota, noi ad effo 24. giungeremo 25. quadrato di 5. mità della quantità nota,  
& della somma presa la 32. che è 7. ne cauaremo il 5. mità detta del 10. & restarà 2. che è la  
quantità ignota. Se mò operando per Algebra all'ordinario ponessimo la quantità ignota  
effere  $x$ . il suo quadrato sarà  $x^2$ . & il duto d'essa quantità  $x$ . della data 10. è  $10x$ . che con  
 $x^2$ . fa  $x^2 + 10x$ . & è eguale a 24. Et perche il valore della  $x$ . sappiamo donere effere 2. & effo 2.  
habbiamo veduto, che si troua a giungere il 24. dato con il quadrato di 5. mità del 10. quantità  
nota (qual'  $40$ . in questa Equatione d'  $x^2 + 10x$ . eguale a 24. si vede effere sempre il numero delle  $x$ .) & fa  
49. & d'effo presa la 32. che è 7. cauare la mità detta del 10. (cioè la mità del numero delle  $x$ . di que-  
sta Equatione) che il restante 2. è la quantità cercata. Veniamo a conoscere, che nell' Equatione  
d'  $x^2$ . &  $x$ . eguale a numero (quale si può sempre dedurre, ò derivare da questa simile al sopradetto) per  
trouare il valore della  $x$ . la Regola è, che. Al numero dell' Equatione si giunga il quadrato della  
mità del numero delle  $x$ . & dalla 32. della somma si cavi la mità istessa del numero delle  $x$ . che il  
restante sarà il valore della  $x$ .

Si può ancora dire, che ciascuna Equatione d'  $x^2$ . &  $x$ . eguale a numero, poniamo d'  $x^2 + 10x$ .  
eguale a 24. potendosi dedurre da questo, che dica, Trouisi vna quantità D, tale, che al suo  
quadrato giunto il prodotto d'essa in 10. (numero delle  $x$ .) ò tale, che giuntoli 10. & la somma  
moltiplicata per essa quantità (ò vogliamo dire tale, che moltiplicata per vn'altra quantità abbe sia 10.  
di più di se) il prodotto sia 24. ponendosi la quantità D, cercata effere 1.

Si viene anco a poter ridurre, ò trasmutare in Equatione semplice di  $x$ . eguale a numero (e  
per di  $x$ . eguale a numero) con il ponere la quantità D, da trouarsi effere non 1. ma 1. & manco la  
mità del 5. dato, cioè ponendosi, che sia  $x + 5$ . che giuntoli il 10. fa  $x + 5$ . qual somma mol-  
tiplicata per essa  $x + 5$ . produce  $x^2 + 10x$ . & questo è eguale al 24. che però  $x^2$ . è eguale a 49.  
& la  $x$ . vale 7. però la quantità D, posta  $x + 5$ . farà 7 + 5. cioè 2. che moltiplicata via 10. di  
più, cioè via 12. fa 24. Et che la reductione, ò trasmutazione si fa giungendo il quadrato della  
mità del numero delle  $x$ . cioè hora 25. che è sempre il quadrato di 5. mità del 10. numero delle  
 $x$ . al numero della Equatione, che hora è 24. & la somma 49. è sempre numero, che si ha da ag-  
guagliare ad  $x$ . & il valore della  $x$ . in questa Equatione d'  $x$ . eguale a numero, è sempre mag-  
giore del valore della  $x$ . nell' Equatione principale d'  $x^2$ . &  $x$ . eguale a numero, in tanto, quanto  
importa la mità del numero delle  $x$ . d'essa Equatione principale, onde leuato dal valore della  
 $x$ . dell' Equatione semplice, il restante sarà il valore della  $x$ . nell' Equatione principale. Et così  
hauendo  $x^2 + 10x$ . eguale a 24. ella si ridurrà ad  $x$ . eguale a 24. & perche qui il valore della  
 $x$ . è 15. iui egli farà 15. manco 25. cioè 13. & il medesimo auuertà nell'altre.

**Vndecima.** Dato il composto del prodotto di due quantità, insieme con i dui quadrati  
loro, & data la somma delle due quantità, trouare ciascuna d'esse due quantità.

**S**IA B 124. il composto del prodotto di due quantità, con i dui quadrati loro, & G 12. la som-  
ma delle due quantità, & si cerchino esse due quantità. Ponasi il prodotto delle due quantità  
effere A 12. & perche il quadrato della somma di due quantità è eguale alli quadrati d'esse due  
quantità, & al doppio del prodotto delle medesime due quantità (poiche (come s'è veduto) quando  
vna quantità è diuisa in due parti, il quadrato d'essa quantità è eguale alli dui quadrati delle due parti giun-  
toli il doppio del duto dell' vna parte nell' altra) il quadrato di G, cioè 144. sarà eguale al dato B 124.  
che contiene i quadrati delle due quantità, & vn solo prodotto loro) giuntoli A 12. posto effere vn p-  
dotto delle due quantità, cioè 144. farà eguale a 124 + 12. onde cauato 124. da 144. il restante  
20. sarà eguale ad  $x$ . & però la  $x$ . cioè il prodotto delle quantità sarà 20. Il suo quadruplo cau-  
ato dal quadrato della somma delle due quantità, cioè cauato 80. da 144. restarà il quadrato  
della differenza delle due quantità, però egli farà 64. onde essa differenza delle due quantità è  
8. però le due quantità sono 10. & 2. La Regola sarà.

Cauare il B, contenente il prodotto delle due quantità, & li dui quadrati loro dal quadrato  
della somma data delle due quantità (cioè il restante sarà il prodotto delle due quantità) & il quadru-  
plo di quello restante sottrarlo dal quadrato della somma delle due quantità, che il rimanente  
sarà

farà il quadrato della differenza delle due quantità, & però la sua  $3z$ , farà la differenza d'esse quantità, che cauta dalla somma loro, la metà del rimanente è la quantità minore.

Et se per Algebra operando al modo ordinario si ponesse vna delle due quantità essere  $1z$ , & l'altra  $12z$  il loro rettangolo sarà  $12z$  m  $1z$ , & i quadrati  $1z$ , &  $144z$  m  $12z$  p  $1z$ . Il che tutto fa in somma  $12z$  m  $12z$  p  $144z$ . Questo sarà eguale a  $124$ , somma data, & però si ha ueria  $12z$  p  $20$ , eguale a  $124$ , (che il  $12$  numero delle  $z$ , è sempre il  $12$ , somma data delle due quantità, & il  $20$  numero della equazione è sempre quello che resta a canare il  $124$ , composto dato da  $144$ , quadrato di  $12$ , somma delle due quantità) onde da  $96$ , quadrato di  $6$ , metà di  $12$ , numero delle  $z$ , si caua  $20$ , & del restante  $16$ , presa la  $3z$ , ella si giungerà, & anco caua  $2$ , metà del numero delle  $z$ , & la somma  $10$ , & anco il restante  $2$ , sarà il valore della  $z$ , & però ciascuna d'esse due valore sarà vna delle due quantità cercate. Quale Operatione è simile alla superiore, doue si  $144$ , quadrato di  $12$ , si caua  $80$ , quadruplo del  $20$ , & del restante  $64$ , presa la  $3z$ , che è  $8$ , ella si giunge, & caua al  $12$ , che le metà de i due risultanti sono le due quantità. Solo sono differenti nella breuità, che in l'vna s'adopra il  $12$ , totale, & nell'altra s'adopra la sua metà  $6$ , &c.

Et ponendosi vna delle due quantità essere  $6p$  & l'altra  $6m$  il prodotto loro è  $36m$   $1z$ . I quadrati sono  $36p$   $12z$  p  $1z$ , &  $36m$   $12z$  m  $1z$ , & il composto di tutti essi è,  $108p$   $1z$ , il che è eguale a  $124$ , onde cauto  $108$ , (che è sempre il triplo del quadrato della metà del  $12$ , & li  $3$ , del quadrato del  $12$ , somma delle due quantità) dal  $124$ , dato, il restante  $16$ , è sempre eguale ad  $1z$ , però la  $z$ , vale la  $3z$ , di  $16$ , cioè  $4$ , onde  $6p$   $4$ , &  $6m$   $4$ , cioè  $10$ , &  $2$ , sono le due quantità. Però la Regola, che ne deriuaria è. Dal  $36$ , dato caui il triplo del quadrato della metà della somma delle due quantità, & la  $3z$ , del restante si giunga, & caui ad ella metà, che i due risultanti saranno le due quantità.

**Duodecima.** Dato il  $B$ , composto del prodotto di due quantità, insieme con i due quadrati loro, & dato esso prodotto delle due quantità, trouare ciascuna di loro.

Si  $124$ , il  $B$ , &  $20$ , il prodotto delle due quantità, che giuntolo al  $124$ , la somma  $144$ , contenirà i due quadrati delle due quantità, & il prodotto d'esse due quantità, però sarà il quadrato della somma delle due quantità, onde la sua  $3z$ , cioè  $12$ , farà la somma d'esse. Et da esso  $144$ , canato il quadruplo del prodotto delle due quantità, cioè cauto  $80$ , il restante  $64$ , farà il quadrato della differenza delle due quantità, però la  $3z$ , di  $64$ , cioè  $8$ , farà la differenza delle due quantità, onde le due quantità saranno  $6p$   $4$ , &  $6m$   $4$ , o vogliamo dire, onde  $12p$   $8$ , farà il doppio della quantità maggiore, &  $12m$   $8$ , farà il doppio della minore; però esse faranno la metà di  $20$ , & la metà di  $4$ , cioè  $10$ , &  $2$ .

**Decimaterza.** Data la somma, & anco la differenza de' due quadrati di due quantità, trouare esse due quantità.

Si  $104$ , la somma, &  $96$ , la differenza, dunque il doppio del quadrato maggiore sarà  $8p$   $20$ , cioè  $104p$   $96$ , cioè  $200$ . (perche  $104$ , somma de i due quadrati supera il quadrato della quantità maggiore nel quadrato della minore, &  $96$ , differenza de i due quadrati è superata dal quadrato della quantità maggiore in quanto importa il quadrato della minore, onde  $104$ , è il quadrato della maggiore p, il quadrato della minore, &  $96$ , è il quadrato della maggiore m, il quadrato della minore, onde la somma di  $104$ , &  $96$ , è due volte precise il quadrato della quantità maggiore) però la sua metà  $100$ , farà il quadrato della quantità maggiore, & ella farà la  $3z$ , di  $100$ , cioè  $10$ . Ouero, dunque il doppio del quadrato della quantità minore sarà  $8m$   $20$ , cioè  $8$ , però esso quadrato sarà  $4$ , & la quantità minore  $2$ . Che  $104$ , contiene il quadrato della quantità maggiore, & il quadrato della minore, cioè è distante in più dal quadrato della quantità maggiore in vn quadrato della minore, &  $96$ , è distante in meno dal medesimo quadrato della quantità maggiore in vn quadrato della quantità minore istessa, però  $96$ , &  $104$ , sono distanti fra loro in due quadrati della quantità minore, ma essa distanza di  $96$ , &  $104$ , è  $8$ , però  $8$ , contiene due quadrati della quantità minore, la sua metà dunque  $4$ , farà il quadrato della quantità minore, & ella farà  $2$ .







potrà essere la somma de' lati, però il valore del  $x$ . viene ad essere il quadrato della somma de' lati. Perilche è chiaro, che il quadruplo della differenza de' cubi, manco il cubo della differenza de' lati, partico per il triplo della differenza de' lati (che ne viene il valore d'un solo  $x$ . è quadrato della somma de' lati) ne viene il quadrato della somma de' lati.

Dal medesimo discorso si può conoscere, che la differenza di due cubi si troua moltiplicando li  $\frac{2}{3}$  del quadrato della somma de' suoi lati via la differenza d'essi lati, & al prodotto giongere l' $\frac{1}{3}$  del cubo della differenza de' detti lati; Perchè concludendosi già che  $18 \times p \pm 16$ . sono eguali a  $2016$ ; quando il  $2016$ . sia il quadruplo della differenza di due cubi; il cubo della differenza de' lati, de' quali si sia  $24$ . che con li  $18 \times$  che il  $18 \times$  sia il dutto del quadrato della somma de' lati via il triplo della differenza d'essi lati si vede, che l'anco l' $\frac{1}{3}$  dell'vna quantà sarà eguale all' $\frac{2}{3}$  dell'altra, cioè che all' $\frac{2}{3}$  di  $2016$  cioè a  $504$ . che sarà la semplice differenza de' cubi, è eguale l' $\frac{1}{3}$  de la  $16$ . cioè  $5\frac{1}{3}$ . che è l' $\frac{1}{3}$  del cubo della differenza de' lati; giuntoli l' $\frac{1}{3}$  di  $18 \times$ . cioè giuntoli  $4\frac{1}{2} \times$ . quali  $4\frac{1}{2} \times$ . sono il dutto dell' $\frac{2}{3}$  della differenza de' lati moltiplicata via il quadrato della somma de' lati (poiche essendo la somma de' lati  $12$ . il suo quadrato è  $12 \times$ . & essendo la differenza de' lati  $6$ . cioè  $6 \times$ . di li  $8$ . numero de'  $2$ . il  $\frac{2}{3}$ . numero de'  $2$ . detto, che è l' $\frac{1}{3}$  del  $18$ . conuenite il  $6$ . tre volte verrà ad essere tre volte l' $\frac{1}{3}$  del  $6$ . cioè li  $\frac{2}{3}$  del  $6$ . differenza de' lati, onde moltiplicandoli  $\frac{2}{3}$  di  $6$ . cioè  $4\frac{1}{2}$ . che per se è il  $\frac{1}{3}$  della differenza de' lati via  $12 \times$  che è il quadrato della somma de' lati, & se ne produce il  $4\frac{1}{2} \times$ . detto, questo è il dutto dell' $\frac{2}{3}$  della differenza de' lati nel quadrato della somma loro, al qual prodotto gioito il  $\frac{1}{3}$  che è l' $\frac{1}{3}$  del cubo della differenza de' lati, la somma è quanto il  $504$ . differenza de' due cubi)

Questo viene, & posto E, somma de' lati essere  $12$ . ne seguita, che E più B, cioè  $12 \pm 6$ . sarà il doppio del lato maggiore, & E, manco B, cioè  $12 \mp 6$ . sarà il doppio del lato minore. Ma la differenza dei loro cubi è il dutto di B. nel quadrato di E.  $6$ . volte  $\bar{p}$  il cubo di B, due volte, il che tutto è eguale al D. (differenza data dei due cubi) preso D  $4$ . volte, in il cubo di B,  $8$ . volte. Perilche è eguale al quadrato di E, (come si è concluso nel da partecip. il triplo di B. superiore discorso.)

Onde essendo D, differenza de' cubi, dato essere  $504$ . il suo quadruplo è  $2016$ . che cauato ne  $206$ . cubo di B  $6$ . data differenza de' lati, resta  $1800$ . & questo partito per il triplo di B. dato, cioè per  $18$ . ne viene  $100$ . quale  $100$ . è eguale al quadrato di E, ma E, è posto  $12$ . & il suo quadrato è  $144$ . però haueremo  $12$ . eguale a  $100$ . onde la  $2$ . valerà  $18$ . perilche  $10 \pm 6$ . &  $10 \mp 6$ . cioè  $16$ . &  $4$ . saranno li doppi di li due lati, onde essi lati sono  $8$ . &  $2$ .

Data dunque la differenza di due quantità, & la differenza dei due cubi loro, si troua il quadrato della somma d'esse due quantità, & però la somma loro, & consequentemente ciascuna di loro. Regola.

Così il cubo della differenza delle due quantità dal quadruplo della differenza de' due cubi de' due quantità, & il restante si parta per il triplo della differenza delle due quantità, & della somma di che (che è il quadrato della somma delle due quantità) si pigli la Bz. quadra (qual Bz. è la somma de' due quantità) & la metà d'essa si giunga, & caui alla metà data della differenza delle due quantità, che i due risultanti saranno esse due quantità cercate.

Angora in altro modo, Se dato 6. differenza de' lati, &  $504$ . differenza de' cubi loro vorremo trouare essi lati, Potremo ponere l'vno d'essi essere  $12$ . & l'altro sarà  $12 \pm 6$ . se vogliamo, che sia il maggiore, ouero sarà  $12 \mp 6$ . se volessimo, che fusse il minore. Hor sia il maggiore, che il suo cubo sarà  $12 \pm 6 \times 18 \times 108 \times 16$ . dal quale cauato  $12$ . che è il cubo d' $12$ . lato minore, resta  $288 \times 108 \times 216$ . & perciò questo è eguale a  $504$ .

(Qui (quantità che passiamo più oltre) si può considerare, che delli  $18 \times p \pm 108 \times p \pm 16$ . il  $216$ . è sempre il cubo della differenza  $6$ . de' lati; il  $108$ . numero delle  $2$ . è il composto di  $36$ . quadrato di  $6$ . differenza de' lati giunto a  $72$ . dutto del medesimo  $6$ . nel suo doppio, & perciò è il triplo del quadrato di  $6$ . differenza de' lati; & la  $2$ . è il lato minore, cioè il  $108 \times$ . è il dutto d' $12$ . lato minore in  $108$ . triplo del quadrato di  $6$ . differenza de' lati. Et del  $18 \times$ . il numero loro  $18$ . è la somma di  $12$ . doppio della differenza de' lati con  $6$ . differenza stessa; cioè il  $18$ . è il triplo della differenza de' lati, & il  $2$ . è il quadrato d' $12$ . lato minore, cioè il  $18 \times$ . sono il dutto del quadrato del lato minore via il triplo della differenza de' lati; perilche si conosce, che la differenza de' due cubi, cioè hora il  $504$ . è quanto risulta a giungere il dutto del quadrato del lato minore via il triplo della differenza loro, con il dutto del lato minore nel triplo del quadrato della differenza de' lati; Et con il cubo della differenza de' lati; Et pongasi ben cura a questa sorte di Dottrina, perchè da essa si potranno estrarre, & derivare molte, & molte Propositioni da nostro piacere; & trouare la causa d'erratione d'altre, che ci fusse incognita.) In questa Equatione dunque di  $18 \times p \pm 108 \times p \pm 16$ . eguale a  $504$ . quando il  $216$ . da ciascuna banda, haueremo  $18 \times p \pm 108 \times$ . eguale a  $288$ . & riducendo la Equatione ad  $1 \times$ . partendo per  $18$ . haueremo  $1 \times p \pm 6 \times$ . eguale a  $16$ . Perilche a  $2$ . quadrato

Sia 13, il lato maggiore. Il suo cubo è 2197  
Et 5, il lato minore. Il suo cubo è 125

8, è la differenza della differenza de' cubi è 2072  
ferenza de' lati.

Poslo il lato min. 5. Il maggiore è 18

$$\begin{array}{r} 18 \\ 18 \\ 18 \times 16 = 288 \\ 18 \times 8 = 144 \\ \hline 288 \\ 144 \\ \hline 432 \end{array}$$

Tuo cubo 13 p 24 2 p 192 2 p 512  
fi caua 19 cubo del lato minore.

resta 24 2 p 192 2 p 512

differenza de' dui cubi, eg. a 2072

Cioè 24 2 p 192 2 eguale a 1560

Cioè 12 2 p 8 2 eguale a 65

4

4

16

si giunge 65

somma 81 la 32 è 9

fi caua 4

resta 5 però 5

vale la 2. & è il lato minore poslo 12

Ouero

Poslo il lato magg. 12. Il minore è 18

$$\begin{array}{r} 18 \\ 18 \\ 18 \times 16 = 288 \\ 18 \times 8 = 144 \\ \hline 288 \\ 144 \\ \hline 432 \end{array}$$

Tuo cubo 13 p 24 2 p 192 2 p 512

fi caua da 19 cubo del lato magg.

resta 24 2 p 192 2 p 512, eguale a 2072

Cioè 24 2 eguale a 192 2 p 512

Cioè 12 2 eguale a 8 p 65

4

4

16

si giunge 65

fa 81 la 32, è 9, che 65

4, fa 13, p il valore della 2, & è il lato magg.

drato di 3, mita di 6, numero delle 2, giunto 164  
& della somma 25, presa la 32, che è 9, & da effo  
5, cauato 3, mita detta, il restante 2, sarà il valo  
re della 2, & però il lato minore, essendo poi il  
maggiore 12 p 6, cioè 18, che è 8.

Considerando mò la derivazione dell' 12, che  
è il quadrato del lato minore, & delle 6 2, che il 6  
è sempre la differenza de' lati (perchè nella Equa  
zione di 18 2 p 108 2, eguale a 288, il 18, è il triplo  
della differenza de' lati, & il 108, è il triplo del qua  
drato d'essa differenza de' lati, onde partitolo per il 18,  
per ridurre la Equazione ad 1, gine verrà la 32, del qua  
drato d'essa differenza, cioè la differenza detta de' lati)  
& del 16, (al quale 1 2 p 6 2 sono eguali) che è quel  
lo, che nasce a partire per il triplo della differen  
za de' lati, il restante della differenza de' cubi, ca  
uato il cubo della differenza de' lati, si potrà de  
rriuare quella Regola.

Data la differenza di due quantità, & la  
differenza de' dui cubi loro per trouare essi dui  
lati. Cauisi il cubo della differenza de' lati dalla  
differenza data de' cubi, & il restante si parta per  
il triplo della differenza de' lati, & l'aumentimen  
to si giunga al quadrato della mita della diferen  
za de' lati, & della somma si pigli la 32, & fia M,  
dalla quale si caui la mita della differenza de' lati,  
che il restante sarà il lato minore, onde si conosca  
che detta 32 M, viene ad essere la mita della som  
ma de' lati, & che però a' giongerli la detta mita  
della differenza loro, la somma sarà il lato magg.

Et ponendosi non il lato minore, ma il maggio  
re essere 12, & però il minore 18, si peruerria  
ad Equazione di 18 2 p 108, eguale a 108 2 p 504,  
cioè di 18 2, eguale a 108 2 p 288, cioè di 12, egua  
le 26 2 p 16, & siccome di 9, quadrato di 3, mita del  
6, numero delle 2, giunto 16, & la 32, della somma  
25, che è 5 M, giunta a 3, mita detta del 6, & fa 8,  
questo 8, è il valore della 2, & è il lato maggiore.

Dal quale operato derivaria pure la Regola i  
stessa, che trouata la 32 M, (quale è sempre la mita  
della somma de' lati) giuntoli la mita della diferen  
za de' lati, ne resterà il lato maggiore, & però ca  
uatala dalla medesima 32 M, ne resterà il lato  
minore.

**Decimaottaua.** Data la somma di due quantità, & la somma de' dui cubi di dette  
quantità, trouare ciaschda di loro.

**S**IA B 10, la somma di due quantità, & D 370, la somma de' dui cubi loro. Per trouare le  
due quantità. Sappiassi che il quadruplo della somma di dui cubi, manco il cubo della som  
ma de' suoi dui lati, applicandosi al triplo della somma de' dui suoi lati, o vogliamo dire, par  
tendosi per il triplo della somma de' suoi dui lati, ne nasce il quadrato della differenza de' essi  
suoi lati, cioè se dal quadruplo della somma de' cubi si caua il cubo della somma de' lati, & il  
restante si parta per il triplo della somma de' lati, ne nascerà il quadrato della differenza de' la  
ti, il che potremo dedurre dall' Algebra con il seguente discorso.

Essendo B 10, la somma di dui lati, & 370 D, la somma de' dui cubi loro. Ponendo la dif  
ferenza de' essi dui lati 12 Equale Aggiunta, & cauata al 10 B, somma de' lati ne resterà 10 p 12,  
che sarà

che sarà il doppio del lato maggiore, & 10 m 1 x. che sarà il doppio del lato minore, & onde essi lati fariano  $5 \frac{1}{2} x$ . &  $5 \frac{1}{2} x$ . ma per schiuar rotte ci feruiremo delli doppj detti loro, & trouarfi i cubi d'essi 10 p 1 x. & 10 m 1 x. che sono 1000 p 300 x p 30 x p 1 x. & 1000 m 300 r p 30 x m 1 x. li sommaremo insieme, & fanno 2000 p 60 x. qual somma peró verrà ad essere o. tripla alla somma de' cubi di  $5 \frac{1}{2} x$ . &  $5 \frac{1}{2} x$ . che sono i veri simplici lati (perche ne i cubi se il lato è doppio al lato, cioè se il lato contiene il lato due volte, il cubo contenirà il cubo, per il cubo d'esse due volte, che è otto volte, & se il lato contiene il lato tre volte, & quattro volte, & 2. volte, il cubo contenirà il cubo, per il cubo d'esse 3. & 4. & 27. volte, cioè lo cubo contenirà 27. volte d'esse 2. volte, & 54. volte d'esse 3. volte.) Questo 2000 p 60 x.

10 p 1 x  
10 p 1 x  
100 p 10 p 1 x  
10 p 1 x  
1000 p 300 x p 30 x p 1 x  
10 m 1 x  
10 m 1 x  
1000 m 300 r p 30 x m 1 x  
1000 p 300 x p 30 x p 1 x  
2000 p 60 x  
eguale a 370. otto volte.  
Cioè 1000 p 30 x. eguale a 1480  
Cioè 30 x. eguale a 480  
1 x. eguale a 16  
1 x. vale 4  
peró E, differenza de' lati è 4

ponerà la quantità ignota, che è 30 x. (che non sappiamo quanto sia, & vaglia il x. perche ci è ignoto il valore della x.) nel modo, che ricerca la dottrina Algebratica, giorgendo cioè, & canadò egualmente quantità eguali da ambedue le parti, acciò in esse parti resti sempre la propoitione della egualità, o voglia mo dire, acciò che di continuo una parte sia sempre eguale all'altra; che per ciò hora, acciò che li 30 x. restino da se, si douerà cauare il 1000. (che gli è accompagnate) da ciascuna delle due bande (come anco si farà, quando bene non hauesimo questo fine di far restare li x. da se; poiche l'arte ricerca, che hauendo numero, & quantitati d'una medesima sorte, & denominatione da ciascuna banda, si teli la minore da ciascuna banda, acciò che resti detta sorte di quantità da una banda sola) & così haueremo 30 x. eguale a 1480 m 1000. cioè 30 x. eguale a 480. Et così hora sapiamo, che il dutto del quadrato di E, nel triplo di B, (che sono li 30 x.) è eguale al quadruplo di D m il cubo di B, (che è il 480.)

Ancora per ridurre la Equatione ad 1 x. partiremo ciascuna delle due quantità per 30. numero de' x. qual 30. come habbiamo veduto, è sempre il triplo di B, somma de' lati, & ne resulterà 1 x. eguale a 16. cioè il quadrato di E; farà eguale a 16. & questo 16. è nato a partire 480. (cioè quello, che resta da cauare 1000. cubo di B da 1480. che è D 370. preso 4. volte) per 30. che è il 10 B, tre volte; perliche sia mo chiaro esser vero, & conosciamo, perche D 4 volte m il cubo di B  
eguale al quadrato di E, (alla quale Equatione si perherà dicendo, Posto E 1 x. essere la differenza de' lati, non segue, che B p E; cioè 10 p 1 x. & il doppio di detto maggiore, & che B m E cioè 10 m 1 x. & il doppio del lato minore, onde la somma de' cubi di B p E, & di B m E; sarà ottupla alla somma de' veri cubi delle due quantità cercate; Perliche (come si è concluso di sopra) solo il cubo di B, con il dutto di B, nel quadrato di E, tre volte, è eguale a D, quattro volte, onde da ciascuna banda li cubo di B, sapremo, che il dutto di B; nel quadrato di E, tre volte, & peró (& resulta l'ist. ssd) che il triplo di B, nel quadrato di B; viene ad essere eguale al D, quattro volte meno il cubo di B, & partendo ciascuna quantità per il triplo di B, non segue, che il semplice quadrato di E, sia eguale a quello, che nasce a partire D, quattro volte meno il cubo di B, per il triplo di B.) ma D, è noto essere 370. peró il suo quadruplo sarà 1480. & B, è noto essere 10. peró il suo cubo, che è 1000. quale cauato da 1480. resta 480. onde qsto 480.

contiene D, quattro volte in il cubo di B, il che douendosi partire per il triplo di B, qual triplo è 30, l'auuenimento è 16, che è la quantità conclusa essere eguale al quadrato di E, cioè ad 16, essendosi posto E, essere 4, perche il 2 vale 16, onde la 2 valerà 4, & la 4 valerà 16, & questa 4, sarà E, cioè la differenza de' lati, perche essi lati saranno la metà di B & la metà di B in la metà di E, cioè 5 & 2, & 5 in 2, che fanno 7, & 3. Dal che si conosce poterli dire per Regola. Data la somma di due quantità, & la somma de' dui cubi loro, per trouare esse due quantità. Cauisi il cubo della somma delle due quantità dal quadruplo della somma de' dui cubi loro, & il restante si parta per il triplo della somma delle due quantità, & dell'auuenimento (che sarà il quadrato della differenza delle due quantità) si pigli la 32, (qual 32, sarà la differenza delle due quantità) & la metà d'essa si giunga, & caui alla metà della somma delle due quantità, che i dui resultanti faranno le due quantità.

Ancora in altro modo. Dato 10. somma delle due quantità, & 370. somma de' dui cubi loro. Per trouare ciascuna d'esse due quantità, si potrà ponere l'vna d'esse, & sia la minore essere 12, però la maggiore sarà 10 in 12, ouero la maggiore essere 12, & la minore 10 in 12, cioè l'vna essere 12, & l'altra il resto del 10, che è 10 in 12, (ue importa hora far distinzione di maggiore & minore, poiche hauendo a sommare insieme i cubi loro, la somma è sempre la stessa) i cubi loro sono 12, & 1000 in 300 & 302 in 12, perche la somma loro è 1000 in 300 & 302, & è eguale a 370, dato, che accomodate le parti, si hauerà 30 & 630, eguale a 300 & ridotto ad 12, sarà 12 & 51, eguale a 102, onde hora da 25, quadrato di 5, metà di 10, numero delle 2, cauato il numero 21, & del restante 4, presa la 32, che è 2, esso 2, giunto, & cauato a 5, metà del 10, numero delle 2, ne restano 7, & 3, che sono le due valore delle 2, & mostrano le due quantità essere 12, & 3.

Considerando mò le quantità, che occorrono in questa Equatione, vedremo, che il 30, numero de' 2, è sempre il triplo di 10, somma de' lati; il 300, numero delle 2, è sempre il triplo del quadrato del medesimo 10, somma de' lati, onde a partire il triplo d'esso quadrato di 10, cioè il duto di 10, via 10, via 3, per il triplo del medesimo 10, cioè per il duto di 10, via 3, dui delli producenti il 300, ne resterà il restante produttore, cioè 10, che è il 10, medesimo somma de' lati; & però quando la Equatione sarà ridotta ad 12, il numero delle 2, hora 10, sarà la somma data de' lati; Quanto al 21, egli deriua a partire 630, restante di 1000, cubo di 10, somma de' lati, cauato 370, somma data de' cubi loro, per 70 triplo del 10, somma de' lati; E' esso 21, poi si caua dal quadrato della metà del 10, somma de' lati, numero delle 2, & la 32, del restante si giunge, & caua ad essa metà del 10, & li dui resultanti sono i dui lati. Perche si può diuinarne la Regola dicendo. Data la somma di due quantità, & la somma de' dui cubi loro, per trouare esse due quantità. Cauisi la somma data de' cubi, dal cubo della somma delle due quantità, & il restante si parta per il triplo della somma delle due quantità, & l'auuenimento si caui dal quadrato della metà della somma delle due quantità, & la 32, del rimanente si giunga, & caui alla metà detta della somma delle due quantità, che i dui resultanti faranno le due quantità.

**Decimanona.** Data la differenza di due quantità, & la differenza de' dui cubi loro, per trouare di nuovo le due quantità.

**S**IA B 4, la differenza di due quantità, & D 3 16, la differenza de' dui cubi loro, per trouare esse due quantità. Poniamo il rettangolo, o duto delle due quantità, cioè dell'vna moltiplicata nell'altra essere A, Et notisi, che dalla generatione, o auuenimento, o uolgarmente dire formazione del cubo, si vede, che se dalla differenza di dui cubi si caua il cubo della differenza de' loro dui lati, resta il triplo del prodotto, che resterà a moltiplicare la differenza de' dui lati, nel rettangolo de' dui lati. Et così il D 3 16, differenza de' dui cubi meno il cubo di B, cioè meno, & cauato 64, cubo di 4, differenza data de' lati, & resta 25, sarà eguale al prodotto, che nasce a moltiplicare A, rettangolo de' dui lati via B 4, differenza de' dui lati tre volte, (cioè via il triplo di B) onde diuisa, o partita ciascuna parte per 3, cioè così il 25, come il triplo di A, in B, l'auuenimento da vna banda, che è 84, sarà eguale all'auuenimento dall'altra banda, che è il semplice prodotto di A, rettangolo de' dui lati, in B 4, differenza de' dui lati, cioè il duto del rettangolo de' dui lati nel 4, differenza de' dui lati sarà 84. Perche partito questo 84, per 4, differenza de' dui lati, l'auuenimento 21, sarà il rettangolo de' dui lati, onde hauendo noto il rettangolo di due quantità, o lati essere 21, & la differenza delle due stesse quantità, & la 32, si troueranno esse due quantità, mediante la terza Operatione, & saranno 3, & 5. Perche dato il rettangolo di due quantità, & la differenza delle stesse due quantità, si danno esse due quantità. Dunque data la differenza di due quantità, & la differenza de' dui cubi loro, si trouano

si trouano esse due quantità, & la Regola è. Dalla differenza de' i cubi delle due quantità, si caui il cubo della differenza d'esse due quantità. & il restante si paria per il triplo della differenza detta delle due quantità, che l'aumento non sarà il rettangolo d'esse due quantità; & poi Al quadruplo d'esso rettangolo delle due quantità si giunga il quadrato della differenza d'esse due quantità, & della somma si pigli la  $\frac{1}{2}$  quadrata, che ella sarà la somma delle due quantità, alla quale si giunga; & caui la differenza di dette due quantità, che le mità de' i due risultanti faranno le due quantità. Ouero: Et poi ad esso rettangolo delle due quantità si giunga il quadrato della mità della differenza d'esse due quantità, & della somma si pigli la  $\frac{1}{2}$ , alla quale si giunga, & caui la mità della differenza delle due quantità, che i due risultanti faranno le due quantità.

Che se mediante la differenza de' i cubi di due quantità, & il prodotto, o rettangolo di esse quantità si cercasse sapere la differenza delle istesse due quantità. Come se il rettangolo di due quantità fusse A 21. & la differenza de' i due cubi loro D 316, & si cercasse la differenza delle due quantità, & chiamasi G. Allhora si procederà alla equalità così; Il cubo di G, differenza de' i lati, o quantità, più il duto di A 21. rettangolo d'essi lati; in G, tre volte sarà eguale a D, cioè, Il cubo della differenza de' i lati, più, o vogliamo dire insieme con il triplo del duto del rettangolo de' i lati nella differenza de' i lati sarà eguale alla differenza de' i cubi, il che è da notare, & è chiaro dall'hauer detto, che se dalla differenza de' cubi si leua il cubo della differenza de' i lati, il restante è il triplo del prodotto della differenza de' i lati, moltiplicata nel rettangolo d'essi lati; Perilche se da 316. differenza de' cubi vorremo leuare il triplo del duto della differenza de' i lati nel rettangolo de' i lati; cioè il triplo del duto di 4. in 21. cioè il triplo di 84. che è 252. il restante 64. conuerà, che sia il cubo di 4. differenza de' i lati. Onde se haueremo noto la differenza de' i lati 4. & la differenza de' cubi 316. potremo trovare il rettangolo de' i lati, mediante quello, che si è detto, cioè. Cauando 64. cubo di 4. differenza de' i lati da 316. differenza de' cubi, il restante 252. sapremo essere il prodotto dal triplo della differenza de' i lati (cioè il duto di 12.) nel rettangolo de' i lati, però particiemo 252. per 12. & ne verrà 21. & questo 21. sarà il rettangolo de' i lati, quali poi si potranno trovare distintamente nel modo mostrato nella terza Operatione. Ma se haueremo noto il rettangolo de' i lati 21. & la differenza de' cubi 316. non habbiamo già regola da trovare la differenza de' i lati. Onde se volessimo trouarla mediante l'Algebra, potressimo ponere essa differenza de' i lati essere 1. il suo cubo sarà 1. & detta differenza de' i lati 1. moltiplicata via il triplo del rettangolo de' i lati, cioè via 63. fa 63. che con 1. forma 64. & questo sarà eguale a 316. differenza de' cubi, onde mediante la Regola che si hauesse dell'Equatione di 3. & 4. eguale a numero, si trouaria il valore della 1. che sarà la differenza de' i lati. Bene è vero, che dato il rettangolo de' i lati, & il 316. differenza de' cubi loro, potressimo trovare la differenza de' i lati, ancora con Equatione Algebrica nota, se volessimo prima trouare i due lati distintamente; che posso l'vno d'essi, & sia hora il minore essere 1. & l'altro maggiore sarà 21. efimo, o da partire per 1. il suo cubo è 9261. efimo d'1. dal quale cauato 1. cubo del lato minore, resta  $\frac{9260}{13}$  in 1. 3. & questa è la differenza de' i cubi, & però è eguale a 316. & leuato il rot-

to, moltiplicando ogni cosa per il denominatore 13. haueremo 9261 in 1. 6. eguale a 3169. cioè 9261. eguale ad 1. 63 3169. la quale Equatione è nota; perche essendo il 6. dignità maggiore, il quadrato del 3. che è l'altra dignità minore, questa Equatione è simile alla Equatione di 2. & 2. eguale a numero, onde al quadrato di 158. mità di 316. numero de' 3. & a 2496. giunto 9261. numero della Equatione, & della somma 3525. presa la  $\frac{1}{2}$  quadrata, che è 185. & da questo 185. cauato 158. mità del 316. numero de' cubi, il restante 27. sarà il valore del 3. per ilche la 2. che è  $\frac{1}{2}$  cuba del 3. valerà la  $\frac{1}{2}$  cuba di 27. cioè 3. onde il lato minore. posso 1. & la 3. & il maggiore perciò sarà 1. efimo di 3. o vogliamo dire da partire per 3. & però sarà 7. & hora hauendo noti i due lati, o quantità essere 3. & 7. verremo anco a conoscere la loro differenza, che nasce al cauare il 3. minore dal 7. maggiore, & che perciò è 4.

Et se haueremo posto non il lato minore, ma il maggiore essere 1. & però il minore essere 2. efimo d'1. che allhora il cubo di questo, & è 9261. efimo d'1. 3. cauato dal cubo di quello, cioè da 1. resta 1. in il detto 9261. efimo d'1. 3. questo restante sarà la differenza de' cubi, & però eguale a 316. & leuato il rotto, haueremo 1. 63 in 9261. eguale a 3169. cioè 6. eguale a 3169 9261. quale Equatione è simile all'Equatione d'1. 2. eguale a 3169 9261. & in questa inferiore la 1. valerà 343. quale 343. è mò il valore del 3. nella nostra superiore, onde il lato maggiore postoui essere 1. & che è la  $\frac{1}{2}$  cuba di 19. verrà anco ad essere la  $\frac{1}{2}$  cuba del 343. cioè sarà 7.

Et se data la differenza de' i lati 4. & la differenza de' cubi 316. volessimo trovare i lati mediante l'Algebra, potressimo ponere l'vno essere 1. & l'altro 1. in 2. il cubo del maggiore

giore è  $136 \times 8$  dal quale cauato il cubo del minore, che è  $12 \times 8$  resta  $12 \times 16$ . & quello sarà eguale a  $3 \times 16$ . differenza de cubi data, onde cauato il  $16$ . da ciascuna banda (che è il doppio del cubo di  $2$ . mita di  $4$ . differenza data de' lati) resta  $300$ . eguale a  $12 \times 2$ . (che il  $12$ . numero de'  $2$ . è il triplo di  $4$ . differenza data de' lati) perche partito  $300$ . per  $12$ . numero de'  $2$ . ne viene  $25$ . che è il valore del  $2$ . & la  $2$ . valerà  $25$ . cioè  $5$ . però i lati faranno  $5 \times 2$ . &  $5 \times 2$ . cioè  $7$ . &  $3$ . Dalla quale Operatione si può dedurre questa Regola. Cauisi il doppio del cubo della mita della differenza de' lati, dalla differenza de' cubi data, & il restante si parta per il triplo della differenza de' lati, & dell'aumentamento si pigli la  $25$ . alla quale si giunga, & caui la mita della differenza de' lati, che i due risultanti faranno i due lati.

Et quando si ponesse il lato minore essere  $12$ . & il maggiore  $18$ . pure dalla Operatione si potrà dedurre la Regola di trovare il lato minore, come aco si trouaria la Regola da conoscere il lato maggiore, quando egli si ponesse  $12$ . & il minore  $18$ . Per conoscere chiaramente, che (come si puo da principio) a cauare il cubo della differenza de' lati, dalla differenza de' cubi, resti il triplo del duto della differenza de' lati nel rettangolo d'essi lati, cioè, che il triplo della differenza de' lati moltiplicato nel rettangolo d'essi lati, & al prodotto giunto il cubo della differenza de' lati, sene formi la differenza de' cubi; Si può considerare, che essendo i lati  $12$  &  $18$ . cioè  $12$ . più, &  $12$ . meno la mita della differenza de' lati; il loro duto sarà  $12$  m il

| Differenza de' lati    | Differenza de' cubi    |
|------------------------|------------------------|
| lato maggiore $18$     | lato minore $12$       |
| $18 \times 2$          | $12 \times 2$          |
| $12 \times 4 \times 8$ | $12 \times 4 \times 8$ |
| $18 \times 2$          | $12 \times 2$          |
| $136 \times 8$         | $12 \times 8$          |
| $136 \times 8$         | $12 \times 8$          |

resta  $12 \times 2$  p  $16$  eguale a  $3 \times 16$

$12 \times 2$

$300$

$12$

$25$

la  $2$ . vale  $5$

$12 \times 16$  è la differenza.

cauato  $64$ . cubo della differenza de' lati.

$12 \times 48$ . restante è il triplo del duto della differenza de' lati nel rettangolo de' lati.

lati  $12 \times 2$

&  $12 \times 2$

$12 \times 4$ . rettangolo de' lati

via  $12$ . triplo della differenza de' lati

fa  $12 \times 48$

$48$ . sono  $12 \times 2$ . manco li  $2$ . del cubo di  $4$ . (perche è composto di  $8 \times 8$ . cubi di  $2$ ). onde sarà solo li  $2$ . del cubo di  $4$ . Per il che se da  $12 \times 2$ . del cubo di  $4$ . cauaremo il totale ( $64$ ) cubo di  $4$ . conuenie, che resti  $12 \times 2$ . & più  $2$ . cioè  $2$ . del cubo di  $4$ . ma il triplo della differenza de' lati, nel rettangolo de' lati, anch'egli, si è concluso anch'esso essere  $12 \times 2$ . del cubo di  $4$ . differenza de' lati, però si conosce, che a cauare il cubo di  $4$ . differenza de' lati, dalla differenza de' cubi, è necessario, che resti quello, che si produce dal moltiplicare il rettangolo de' lati nel triplo della differenza de' lati, o vogliamo dire, perche al detto  $12 \times 2$ . cioè  $12 \times 2$ . del cubo di  $4$ . giunto il cubo di  $4$ . (che è la mita del  $1$ . rispetto al  $2$ .) ne nasce  $12 \times 2$ . del cubo di  $4$ . & questo è appunto il valore del  $12 \times 2$ . differenza de' cubi, si conosce, che la differenza de' cubi è sempre eguale a quella somma, che nasce a sommare il cubo della differenza de' lati con il duto del triplo d'essa differenza de' lati, nel rettangolo de' medesimi lati.

*Vigesima. Data la somma di due quantità, & la somma de' cubi loro, dimo-  
strare le due quantità.*

**S**IA G 10. la somma di due quantità, & D 370. la somma de' i due cubi loro, & si vogliano tro-  
uare le due quantità. Poniamo A, essere il prodotto delle due quantità, ò vogliamo dire il  
rettangolo de' lati; Et perche appare dalla compositione, fabrica, ò formatione del cubo, che

Sia vn lato 12. & l'altro 7

la somma loro sarà 12 p 7

12 p 7

12 p 14 p 49

12 p 7

12 p 12 p 147 p 343

A B C D

12 p 14 p 49

che contiene il 7 p 49 2. volte 3.)

(partendo ciascuna delle quantità dette per il triplo della somma de' lati, cioè per il triplo di G) che

il cubo di G, meno D

è eguale ad A, rettangolo de' lati, onde essendò G, somma de' lati 10. il suo

partito p il triplo di G

cubo è 1000. la somma de' cubi de' lati è D 370. che cauata da 1000. resta 670. & questo par-

tito per il triplo di G 10. somma de' lati, cioè partito per 30. ne viene 22.3: quale è il rettangolo

de' lati; Et hora hauendo noto il rettangolo de' lati, & la somma de' lati, si haueranno notii la-

ti, mediante la quarta Operatione. Perilche data la somma de' lati, ò delle due quantità; & la

somma de' due cubi loro si trouaranno le due quantità, ò lati. Et la Regola è. Dal cubo del-

la somma delle due quantità si caui la somma de' cubi d'esse due quantità, & il restante si par-

ti per il triplo della somma data delle due quantità, che l'auuenimento sarà il prodotto, ò rettan-

golo delle due quantità, quale si caui dal quadrato della metà dell' somma delle due quantità,

& del restante presa la 3a. ella si giunga, & caui alla metà detta della somma delle due quantità,

che i due risultanti faranno le due quantità.

Et se dalla notizia della somma de' cubi delle due quantità, & dal rettangolo d'esse si volesse

conoscere la somma delle due quantità, come se B 21. fosse il rettangolo delle due quantità, &

D 370. fosse la somma de' due cubi d'esse, & si cercasse G, somma delle due quantità, allhora il

cubo di B, somma delle due quantità, ò lati; meno il duto di G, nel triplo del rettangolo d'esse

due quantità faria eguale alla somma de' cubi di dette due quantità. Che posto G, somma de'

lati essere 12. il suo cubo faria 12. & il triplo del rettangolo de' lati, cioè 63. multiplicato in ef-

fice G 12. fa 63. & che cauato da 12. resta 12. m 63. & questo è eguale a D 370. somma de'

lati, & accomodato il 12. haueremo 12. eguale a 63. & la 2. valerà 10. & questo 10.

è G, somma de' lati, posta 12. onde hora diuiso esso 10. induc partituali, che il prodotto loro sia

21. esse parlaranno i due lati ò quantità; & si fa cauando il 21. da 25. quadrato di 5. metà del

10. & del restante 4. presa la 3a. che è 2. ella si giunge, & caua al 5. che i due risultanti 7. & 3.

sono le due par ricercate, & ci mostrano i due lati, ò quantità essere 7. & 3.

Et per la 2a. & 3a. passando auanti con quest'ordine si peruerria ad Equar. Algebriche, doue ofe-

re 12. & numero. v'entrariano ancora 12. & altre. Le speculationi; & inuentioni, delle quali

ricercano molta scrittura, & intelletto riposato; & libero dalle molestie, le riserbarò ad altro

tempo à proposito, & solo aggiungendo qui alcuni questi piaceuoli per recreatione, & diletto

de gl'amoreuoli, & benigni Lettori, farò fine.

I V N Principe ha speso scudi 128000. in affollare per vn mese 7000. Caualli, & 7000.

Fanti, & per ogni centenaro di scudi si sono hauuti 18. Fanti di più, che non sono stati i Caualli

(cioè se per scudi 100. si sono hauuti poniamo 12. Caualli, si faranno per scudi 100. pure, hauuti 30. Fan-

ti, che è 18. più del 12.) si domanda al medesimo modo volendo affollare pure per vn mese 100.

Caualli, & 300. Fanti, quanti scudi bisogneranno.

Pono, che il numero de' Caualli, che si ha per 100. scudi sia 12. che perciò il numero de' Fan-

ti, che si hauesse similmente per 100. scudi faria 18. di più, cioè 12. p 18.

Hor veggasi quanti scudi verriano ad importare li 7000. Caualli, & 7000. Fanti, dicendo per

i Caualli. Se Caualli 12. importano scudi 100. li Caualli 7000. quanto importaranno? & si ve-

Caualli Scudi Caualli Fanti Scudi Fanti  
12—100—7000 12 p 18—100—7000

scudi 700000

scudi 700000

12 p 18

700000 p 12600000

700000 p 12600000

1400000 p 12600000

somma scudi

12 p 18

eguale a scudi 128000

Cioè 1400000 p 12600000

12600000 p 128000

12600000 p 128000

12600000 p 128000

12600000 p 128000

Per scudi 100. si hanno 7. Caualli,  
Et per altri 100. scudi 25. Fanti.

Caualli 7000. scudi 100000  
Fanti 7000. scudi 28000

però scudi 128000. im-  
portano in tutto li Caualli, & Fanti.

C7. S 100. C 100

30000

Scudi 28577. li Caualli.

Fanti 25. S 100. Fanti 300

Scudi 1300. li Fanti.

Scudi 40577. li Caualli.

Scudi 40577. in tutto.

II. Tre soldati facendo il conto de' loro denari, trouorno che il primo, & secondo in-  
sieme haueuano scudi 40. di più, che non erano i denari del terzo; Ma che il secondo, & terzo  
insieme haueuano scudi 50. di più, che non erano i denari del primo; Et che il primo, & terzo  
insieme haueuano scudi 60. di più, che non erano i denari del secondo; Et domanda quanti scu-  
di venia ad haueue ciascuno d'essi tre soldati.

Poppo, che i denari, & scudi del primo, & che haueua il primo, & che quelli del secondo si  
no 12. di più, & che chiamaremo 1. quant. perche essi due insieme haueuano 12. di più, & per  
che si dice, che loro due insieme haueuano 40. di più, & che il terzo, questo terzo dunque venia  
ad haueue 40. meno di detta somma, & però haueua 12. p 1. quantà in 40. & così concludi-  
mo, che quando il primo habbia 12. il secondo haueua 1. quantà, & il terzo 1. quantà  
in 40. perche il primo, & terzo insieme haueuano 22. p 1. quantà in 40. Et perche si dice, che  
questi due insieme haueuano 60. di più, che il secondo, ne segue che da essa somma di denari del  
primo, & terzo, cioè da 22. p 1. quantà in 40. cauandone detto 60. il restante 22. p 1. quantà  
in 100. deue esser quello, che ha il secondo; ma si è concluso, che ha 1. quantà, però questo  
1. quantà è eguale a detto 22. p 1. quantà in 100. onde accomodato in 100. haueuemo 22. p 1.  
quantà eguale a 100 p 1. quantà, & leuato 1. quant. da ciascuna banda si haueua 22. eguale a  
100. perche la 2. valerà 50. & questo 50. farà il numero delli scudi, che haueua il primo, per-  
che egli fu posto esser 12. Hora conosciuto, che il primo haueua 50. per trouare quanto haue-  
ua ciascuno de' gli altri due, potremo ponere, che il secondo haueua 12. & così fra il primo, & se-  
condo haueuano 50. p 1. & vogliamo dire 12. p 50. & perche questo deu' esser 40. di più di quel-  
lo, che haueua il terzo, cauandone questo 40. il restante 12. p 10. verria ad esser quello, che ha-  
ueua il terzo, & così concludiamo, che il primo ha 50. il secondo 12. & il terzo 12. p 10. per-  
che il secondo, & terzo insieme haueuano 22. p 10. & perche si dice, che essi due insieme, & terzo in-  
sieme hanno 50. di più, che il primo, leuandone questo 50. il restante 22. in 40. douerà esser  
quello, che ha il primo, ma già sappiamo, che esso primo ha 50. però a questo 50. viene ad es-  
ser eguale detto 22. in 40. onde accomodato il 40. si haueua 22. eguale a 50. & la 2. valerà 44.  
però

22. che importano scudi  
700000. etimo d' 12. Et per li  
Fanti si dirà, Se Fanti 12 p 18.  
importano scudi 100. li Fanti  
7000. quando importano  
& si accadrà che importano scu-  
di 28000. etimo d' 12. p 18.  
vogliamo dire scudi 700000.  
da partire per 12. p 18. & quidi  
due importano di sommo in-  
sieme, & fanno 1400000 p  
12600000. da partire per 12  
p 18. & qsto deue esser scu-  
di 128000. perche è eguale  
a 128000. Onde leuaremo il  
rocto, multiplicando esse quan-  
tita per il depognatore 12 p  
18. & seguedo come si vede:  
finalmente si detta la Equatione  
ad 12. haueuemo 22. p 12.  
eguale a 28000. & la 2. valerà 7.  
& questo 7. farà il numero de'  
Caualli, che si hanno per 100.  
scudi (poche esser 12. p 18.) perche  
con 100. scudi pure si haueu-  
no 25. Fanti. Onde hora po-  
tremo vedere, che li 200. Cau-  
alli, propoli importano  
scudi 28577. & li 300. Fanti  
scudi 40577. che in tutto fanno  
sc. 40577. che bisognaranno.

però li scudi del secondo, che si posero essere 12, sono 45. Hora sapendo, che il primo ha 40, & il secondo 45, essi insieme hauerauno 95. & perche il terzo ha 40, di manco, che questi doi insieme, egli hauerà 95. manco 40. cioè 55. & così si dirà, che il primo, hauera scudi 50. il secondo 45. & il terzo 55. che ben si vede il primo, & terzo insieme hauere 105. che è 80. di più, che il primo, del secondo; & il secondo, & terzo insieme hauere 100. che è 50. di più che il 50. del primo.

Ma se fondistare anco a chi desidera sapere la semplice Regola numerale di simili questi, eccola; Giongasi quello, in che la somma del primo, & secondo supera il terzo; con quello, in che la somma del primo, & terzo supera il secondo; & del composto si piglia la metà, che ella sarà quello,

primo, & secondo 30. più del terzo  
secondo, & terzo 28. più del primo  
terzo, & primo 46. più del secondo

primo 12. secondo 2. quantità  
però il terzo 12 p. 1. quantità m 30

primo 12  
terzo 12 p. 1. quantità m 30

somma 2 p. 1. quantità m 30  
si caua 46

però il secondo 2 p. 1. quan. m 76  
& è eguale ad 1. quantità posta, che  
habbi esso secondo,  
però 22. sono eguali a 76. & la 2. va-  
le 38. però il primo posto hauere 12.  
ha 38.

il primo ha 38  
il secondo habbi 12

somma 12 p. 38 A  
si caua 30 B

però il terzo 12 p. 8 C  
il secondo 12

somma 2 p. 8 C  
si caua 28 D

resta 2 m 20 E  
che hauerà il primo,  
ma esso primo ha 38 A  
però 22 m 28. sono e-  
guali a 38. cioè 22. e-  
guali a 58; però la 2. va-  
le 29. onde il secondo  
posto hauere 12. ha 29.

il primo ha 38. Poi si giunga  
al secon. ha 29 quello, in che

somma 67  
si caua 90

resta 37  
però il terzo  
ha 37

primo 38  
secondo 29

terzo 37  
& del compo-

sto si piglia la metà, che ella sarà  
quello, che ha il secondo, onde  
dalla somma del primo, & se-  
condo nota, cauato quello, in che  
ella supera il terzo, il restate sa-  
rà quello, che ha il terzo; Però  
dicendosi, Delli tre soldati il pri-

mo, & secondo hanno 30. più del terzo: Ma il secondo, & terzo hanno 28. più del primo, & il terzo, & primo, hanno 46. più del secondo, operando con la regola si trouarà, che il primo ha 38. il secondo 29. & il terzo 37. qual regola facilmente si fa derivare dalla operatione Algebrica posta in margine; Auuertendo, che in essa da 12 p. 38. somma del primo, & secondo, ma diciamo dal solo 38 A, cauare il B 30. & dal restante c 8. cauare anco D 28. che resta E, cioè m 20. queste due sottrattioni risultano l'istesso, che nasce in vna sola sottrattione a cauare la somma delli doi B 30. & D 28. cioè 58. dal detto A 38. che pure resta m 20 E, & perche questo m 20 E, essendo m. si deve poi aggiungere, o sommare con il medesimo A 38. si vede, che la somma ritornarà ad essere il 58. che si cauò da esso A, cioè cauare 58 da A, che resta E, & ad E giungere poi A, se ne ritorna a formare il 58. (che esso 58. è composto da A. & E) ma il 58. è composto dal 30. in che il primo, & secondo superano il terzo, & dal 28. in che il secondo, & terzo superano il primo (il qual 58. viene sempre ad essere eguale a 22. che però la 1. posta essere quello, che ha il secondo, vale sempre la metà d'esso 58.) però di questo composto si è detto, che si piglia la metà, che ella sarà quello, che ha il secondo.

Si sogliono alle volte fra virtuosa conuersatione d'amici, per loro intertenimento piaceuole, proporre alcune domande, di questi simili al seguente, quali se bene ordinariamente si sogliono risolvere col giudicio; con l'andare cercando numeri, che possono seruire a ciò; io nondimeno mostrerò come artificiosamente si possa peruenire alla facile solutione loro.

III. Vno ha lire 300. con le quali vuole comprare 300. animali uini, & altri, da tre forte, la prima da lire 5. al vno, la seconda da lire 2. al vno, & la terza da soldi 8. cioè da lire  $\frac{2}{3}$  al vno, si domanda quanti animali haberà di ciascuna forte.

Pono, che della prima forte ne pigli 12. della seconda 12. di 4. ma diremo 1. quantità, & della terza il resto fino al totale numero di 300. cioè 300 m. 12 m. 1. quantità, che perciò è lire 3. & lire 2. & 2. lire 5. valeranno lire 5. & 2. quantità, & 120 m. 7. quantità, per lo che valeranno in tutto 120 p. 47 p. 12. quantità, onde questo sarà eguale a 300. numero delle lire, che hanno da valere essi 300. animali; & perciò haneremo 47 p. 12. quantità eguale a 120. & per trouare il valore della quantità la lassaremo da se, & haueremo 12. quantità eguale a 180 m. 47 p. 12. però la quantità vale 11 2 m. 12 p. 1. onde li tre numeri d'animali posti 12. & 12. quantità, & 300 m. 19. m. 1. quantità faranno 12. & 112 m. 2 p. 1. & 187 p. 12 p. 1. Per trouar mo il valore della quantità intero (perche gl'animali devono essere interi, che sono uniti) Arimmetiche indistibili per il nome

della 2<sup>a</sup> da moltiplicare il numero de gl' animali della prima forte posso essere 12) conviene, che egli sia tale, che (considerato 8. r. 12. m. 2. 4.) moltiplicato per 2. il prodotto cauato da 12. il restan- te sia numero intero; accioche 12. m. 2. 4. che hà da essere il numero de gl' animali della se- conda forte sia intero, ma 1. moltiplicato per 2. fa 2. & 2. via 1. fa 1. & 3. via 2. fa 6. ciafieno de' quali ha rotto diuerso da 2. rotto accompagnato al 12. perche cauato da esso 12. non può restare intero, onde preso 4. egli via 2. ouero via il solo rotto 2. che basta, farà 24. cioè 32. che hà per rotto 2. come hà il 12. però 4. farà il proposito che via 2. fa 8. & 32. cioè 12. però potremo ponere, che la 2. vagli 4. & questo 4. farà il numero della prima forte posto essere 12. onde il num. della seconda forte, che deue essere 12. m. 2. 4. farà 12. m. 12. cioè 101. & il numero della terza forte farà il resto fino a 300. cioè 199.

Ma notifi, che ancora la 2. in interi potrà hauere altre vature; & tante, quante volte si potrà formare il duto di 2. in alcun numero intero tale, che il prodotto habbi per rotto 2. accioche cauato da 12. il restante sia intero; Ma 2. via 8. via 16. via 24. & via 32. produce intero, che con 12. duto del 2.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 4   | 5   | 30  | 12  | 60  | 30  | 100 | 28  | 140 | 36  | 180 | via 4. farà numero com-  |
| 301 | 3   | 202 | 78  | 156 | 55  | 110 | 32  | 64  | 9   | 18  | posto da intero, & da 2. |
| 191 | 2   | 78  | 210 | 84  | 225 | 90  | 240 | 96  | 255 | 102 | & però cauato da 12.     |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | restarà intero; Onde il  |

valore della 2. non solo po- trà essere 4. ma 8. di più, & anco 16. di più, & anco 24. di più, & anco 32. di più; cioè potrà ef- sere 4. o 12. o 20. o 28. o 36. & così della prima forte si potrà hauere, o 4. o 12. o 20. o 28. o 36. però della seconda forte, o 101. o 78. (cioè 23. di meno, perche 8. volte 2. che si giunge all' 112. del 12. m. 12. fa 13. & però il m. 12. douenta m. 34. & così il 12. m. 12. douenta 112. m. 34. cioè 78.) o 55. o 32. o 9. & il resto della terza forte, come si vede in margine.

Per deriuare mò la Regola semplice numerale, a simili questi, mediante la Operazione Alge- bratica; considereremo il nascimento del 100. del 4. 2. dell' 1. quantita (che compengano 120. & 4. & 1. quantita, valore totale dell' 100. animali trouato da principio) & de gl'altri; Quàto al 120. egli deriua a moltiplicare 5. prezzo minore per il 300. numero de gl' animali, che fa 120. Il 4. & l'1. deriuaano dal cauare detto 5. prezzo minore inferiore all' unita, dal 5. & v. prezzi ma- giori, superiori all' unita; Dipoi il 120. si caua dal totale 300. numero de gl' animali & resta 180. quale si parte per l' 1. restante minore dell' dui detti 4. & 1. & ne viene il 112. & anco con l'istesso 1. si parte 4. restante maggiore, & ne viene 2. il quale 2. si piglia poi tante volte, che cauato da 112. resti numero intero. Onde noi per chiudere rotte, potremo moltiplicare questi numeri per il denominatore 8. che contiene anco il 3. denominatore dell' 1. del 112. & ne risultano 23. 8. & 900. Et così hora cauando il 23. da 500. tante volte, che il restante sia di- uisibile, precise per 8. il numero delle volte, che lo cauaremo farà il numero de gl' uccelli, o animali del maggior prezzo, & quel numero, che verrà il partire il restante del 500. per l'8. farà il numero de gl' animali del prezzo mezzano. Onde, perche il 23. si può cauare 4. volte, & 1. volte, & 20. volte, & 28. volte, & 36. volte dal 500. restando sempre numeri diuisibili per 8. ipotesi; essendo essi restanti 308. 824. 440. 256. & 72. quali partiti per 8. gl'auuenimenti sòno 101. 78. 55. 32. & 9. sapremo, che della prima forte se ne potranno hauere 4. o 12. o 20. o 28. o 36. & della seconda 101. o 78. o 55. o 32. o 9. & però il restante della terza forte, cioè 199. o 110. o 84. o 54. o 25. Ma la Regola in astratto potrà essere questa.

Moltiplicasi il numero de gl' animali per il rotto, o parte d' unita, che è il prezzo minimo, & lo chiamaremo terzo, chiamando primo il prezzo maggiore, & secondo il prezzo mezzano; & il prodotto (120.) si caui dal numero totale (300.) delle lire del prezzo totale, & il restante (180.) che chiamaremo R. si ferbi; Ancora si caui il terzo prezzo (4.) dal primo (5.) & dal secondo (1.) & siano li dui restati a. (4.) & c. (1.) Dipoi R. (180.) serbatosi parte per c. (1.) & sia l'au- uenimento d. (112.) & con l'istesso c. (1.) si parta a. (4.) & sia l'auuenimento e. (28.) il qua- le si pigli tante volte u. che il prodotto, o composto cauato dal d. (112.) il restante sia numero intero; & esso numero di volte u. farà il numero de gl' animali della prima forte, & il restante e. farà il numero de gl' animali della seconda forte; onde cauato la somma d' essi u. & e. dal tota- le numero de gl' animali, il rimanente verrà ad essere il numero de gl' animali della terza forte.

Et per esemplificare essa Regola, accio tanto più facilmente si facci familiare agli Rudiosi Let- tori; supponasi quest' altro questo. Si vogliono spendere lire 100. in 100. animali di tre sorti, che ciafuno di quelli della prima forte vale lire 3. della seconda lire 1. & soldi 35. cioè lire 1. 7. & della terza soldi 13. & quadranti 3. cioè lire 1. 7. Per trouare quanti se ne doueranno pigliare

di ciascuna forte. Moltiplicheremo 100. numero de gl'animali via  $\frac{2}{3}$ . prezzo minimo; o terzo, & il prodotto 66  $\frac{2}{3}$ . si cauarà dal totale 100. numero delle lire del totale prezzo, & il restante 33  $\frac{1}{3}$ . R. si serbà. Ancora si caui il terzo prezzo  $\frac{2}{3}$ . dal primo 3. & resti 2  $\frac{1}{3}$  a, & anco detto terzo prezzo  $\frac{2}{3}$ . si caui dal secondo 1  $\frac{1}{2}$ . & resti 1  $\frac{1}{4}$  c. Dipoi R. 2  $\frac{1}{3}$  si parta per c. 1  $\frac{1}{4}$ . che ne viene 30  $\frac{1}{12}$  d. & anco con esso c. 1  $\frac{1}{4}$ . si parta a 2  $\frac{1}{3}$ . che ne viene 2  $\frac{1}{6}$  g. Questo g. mò si pigli tante volte u, che il prodotto canandolo da d. 30  $\frac{1}{12}$ . resti numero intero. & perche il  $\frac{2}{3}$ . tutto del g. in 3  $\frac{1}{6}$ . tutto del d. 30  $\frac{1}{12}$ . entra 5. volte intero; vediamo, che g. peso 5. volte u, il prodotto 10  $\frac{1}{6}$  c. cauandolo da d. 30  $\frac{1}{12}$ . il restante sarà intero, & è 20 c. però u 5. sarà il numero de gl'animali del primo prezzo, & 20. del secondo; quale t. 20. con u 5. fa 25. & questo 25. cauato dal totale numero 100. de gl'animali, il rimanente 75. sarà della terza forte, o terzo prezzo. Et se bene il g. 2  $\frac{1}{6}$ . si potria anco pigliare volte 13. di più (quale 13. è mostrato hora dal t. 3. denominatore comune della votti.  $\frac{2}{3}$ . &  $\frac{1}{2}$ . di g. & d.) & però in tutto volte 18. con la conditione necessaria detta; che 18. volte  $\frac{2}{3}$ . fa 12. che ha il rotto  $\frac{2}{3}$ . quale è l'istesso, che è il rotto  $\frac{2}{3}$ . del d. 30  $\frac{1}{12}$ . nondimeno, perche 18. volte 2  $\frac{1}{6}$ . fa 38  $\frac{1}{3}$  c. che supera il d. 30  $\frac{1}{12}$ . & però non si può canare da esso d. si vede, che il quesito non può hauere altra risposta, che quella sola data li.

A d'altro tempo più commodò si potrà anco mostrare come si operi, quando con le lire 100. (o altra quantà) si volessero comprare 100. animali (o altra quantà) di 4. o 5. o 6. o più forte, o prezzi dati. Et come anco si operi quando il numero de gl'animali non fusse l'istesso, ma maggiore, o minore del numero delle lire, o monete da spendere in essi. III. V. n. Or se vuole fare tre Tazze d'argento di tre diuerse forti, che fra tutte tre pesino 100. oncie, & che l'argento della prima Tazza vagli lire 3  $\frac{1}{2}$ . l'oncia, quello della seconda Tazza vagli lire 2. l'oncia, & quello della terza Tazza vagli lire 3  $\frac{1}{4}$ . l'oncia, & che siano tali i pesi di ciascuna di loro, che il valore dell'argento dell'vna sia precise eguale al valore dell'argento che sarà in ciascuna dell'altre due si domanda il peso di ciascuna di loro, & il valore dell'argento, che vi farà.

Questo quesito in astratto importa quanto il dire, Diuidasi 100. in tre parti tali, che la prima moltiplicata per 3  $\frac{1}{2}$ . la seconda per 2. & la terza per 3  $\frac{1}{4}$ . i tre prodotti siano eguali fra loro.

|                     |       |                     |     |     |
|---------------------|-------|---------------------|-----|-----|
| 1185                | 392   | 448                 | 385 | 100 |
| 35200               | 44800 | 38500               |     |     |
| 29                  | 37    | 32                  |     |     |
| 11500               | 9250  | 3950                |     |     |
| 835                 | 95    | 380                 |     |     |
| 167                 | 191   | 116                 |     |     |
| 337                 | 37    | 32                  |     |     |
| 337                 | 237   | 337                 |     |     |
| via 3 $\frac{1}{2}$ | via 2 | via 3 $\frac{1}{4}$ |     |     |
| 6502                | 382   | 348                 |     |     |
| 87                  | 74    | 96                  |     |     |
| 202                 | 214   | 118                 |     |     |
| 14                  | 18    | 6                   |     |     |
| 703                 | 107   | 466                 |     |     |
| 120                 | 0     | 180                 |     |     |
| fa 103              | 703   | 337                 |     |     |
| 237                 | 239   |                     |     |     |
|                     | 103   | 237                 |     |     |

Onde posto la prima parte essere 12. moltiplicata per 3  $\frac{1}{2}$ . fa 18. & di questo 3  $\frac{1}{2}$ . donerà essere il prodotto della seconda moltiplicata per 2. & anco della terza moltiplicata per 3  $\frac{1}{4}$ . onde partendo 3  $\frac{1}{2}$  x. per 2. & per 3  $\frac{1}{4}$ . che ne viene 1  $\frac{1}{2}$ . & 1  $\frac{1}{4}$  x. la seconda sarà 1  $\frac{1}{2}$  x. & la terza 1  $\frac{1}{4}$  x. quando la prima sia 12. & per in altri (moltiplicando esse numeri misti per 352. che è prodotto della denominatori 24. & 32. della loro votti) quando la prima sia 352. la seconda sarà 448. & la terza 385. però la somma loro sarà 1185. ma se di 1185. le tre parti sono 852. 448. & 385. di 100. elle faranno 29  $\frac{2}{3}$ . & 37  $\frac{1}{3}$ . & 32  $\frac{1}{4}$ . quali moltiplicate per 3  $\frac{1}{2}$ . la prima, per 2. la seconda, & per 3  $\frac{1}{4}$ . la terza, producono vn istesso 103  $\frac{1}{3}$ . Per il che si dirà, che la prima Tazza douerà pesare oncie 29  $\frac{2}{3}$ . la seconda oncie 37  $\frac{1}{3}$ . & la terza oncie 32  $\frac{1}{4}$ . (e questi rotti d'oncia si possono ridurre di carati, & grani) & che l'argento di ciascuna di loro valerà lire 103  $\frac{1}{3}$ . cioè quasi lire 104.

V. V. n. Sargente ha 6000. Fanti, de' quali vuol fare tre ordinanze, mà che habbino vn medesimo fianco per poterle vnire tutte tre insieme, o due di loro a sua voglia; & che siano tali, che la prima habbi per fronte volte 2. Fanti Fanti, quanto farà il fianco (che così sarà quadra di terreno) la seconda habbi il numero de' Fanti della fronte volte 1. quanto il numero del fianco, & la terza habbi il numero de' Fanti della fronte doppio a quello del fianco, si domanda il fianco; & la fronte di ciascuna d'esse ordinanze. Pono il numero de' Fanti del fianco essere 1. però li numeri

li numeri delle fronti delle tre ordinanze saranno  $2\frac{1}{2}$  &  $1\frac{1}{2}$  &  $1\frac{1}{2}$  che giunti insieme fanno 3 & moltiplicato per il fianco 1. produce 3. per il numero della grandezza totale, & però è eguale à 6000. onde (levando il retto) 35.2. sono eguali à 36000. & i 3. à 10260. però la 1. vale 32. 10137. cioè 32. (Or alquanto più mò trattando di Fanti, quali hanno la vita indivisibile, non conviene adoprare rotti in essi) onde 32. sarà il numero de' Fanti del fianco commune; & quanto alle fronti moltiplicandolo per  $2\frac{1}{2}$ . che fa 747. ma diremo 75. questo 75. sarà il numero de' Fanti della fronte della prima ordinanza: Ancora esso 34. moltiplicato per 16. & per 1. che produce 18. & 64. essi mostrano la fronte della seconda ordinanza essere di 48. Fanti, & della terza di 64. Fanti; perliche moltiplicando queste fronti per il loro fianco 32. i prodotti 1400. 1536. & 2048. mostrano, che la prima ordinanza contiene Fanti à 400. la seconda il 596. & la terza il 648. che in tutto importano Fanti 5984. perliche s'io al numero delli 6000. vi s'annano Fanti 16.

La Regola farà questa. Somminisi insieme i numeri, che sono de' denominatori delle proportioni, che hanno d'hauere le diuerse fronti al commune fianco; & con la somma si parta il numero dato de' Fanti, & dell'auuementio si pigli la radice quadra, quale sarà il numero de' Fanti, che haueà il fianco di ciascuna ordinanza. & questo moltiplicato per i denominatori detti, i prodotti faranno i numeri de' Fanti delle fronti. Qual Regola è vniuersale, & si può le ordinanze molte, o sia vna sola. Et questo basti per hora.

**P**ARE, che il fine della persona sia il soddisfare al suo desio, sia egli qual si voglia, in esso pone il pensiero, & opera, & in esso si contenta, poiche si vede alcun attendere à d. vna cosa, & altri à vn'altra, o vtile, o nò, che sia; consistendo il contento nel diletto, & non nel particolare vtile dell'opera; ne altro pare à molti, che si can da questa parte Elementare, che il compiacersi in particolare; parendo à loro ogni cosa essere transitoria, & vana; onde felici pare, che si chiamino quelli, à i quali occorrono le cose secondo il loro desio, massime se essi desij sono honorati, & catolici, che quando fussero altrimenti, i desij sensuali nelle persone ragioneuoli che pure si accorgono essi essere lontani dalla strada dell'honore, & della salute, & però repugnare al bene, vengono ad essere di continua molestia; poiche la parte sensuale, quando è molto potente, di continuo contrasta alla ragione, che pure nella persona ragioneuole cerca & deuè preualere, onde se nella persona ragioneuole si abbatte, o per la effeminata, & spensierata, o otiosa educatione, essere donata potente la parte sensuale si viene à sentire continua guerra in se stesso, però auuertasi bene à procurare buona educatione alli putti, & giouani; che sarà senza austerità, ma accompagnando il necessario con l'honesto, & indirizzarli alle dottrine proficue, & alle dilettuoli insieme (Or le Mathematiche in particolare, cioè Aritmetica, & Geometria, & le dependenti, & subalterne Musica, Perpectua, Astronomia, Cosmografia, & derivanti da queste, sono & proficue, & dilettuoli insieme, oltre che esse acuiscono, & illustrano mirabilmente l'intelletto; apportando di più molto utile, & ornamento à tutte le Dottrine, Arti, & Negotij) non gli lassando mai stare otiosi; che così la parte ragioneuole facilmente potrà dominare la sensitiua; Che s'io abbatteſse à dominare la sensitiua, non potrà diuina vita inhonestà, vitiosa, & infame; & forſi indurria la persona à disperatione, quando non potesse adempiere i suoi desij; o almeno ad infamia, & ad operationi empie, come spesso occorre ne i strenuati desij libidinosi, nel giuoco, & altri; Preghiamo dunque N. S. Di o pietosissimo, che ci conceda gratia di pensar sempre, & operare nella via della salute à gloria di Sua Diuina Maestà, con beneficio vniuersale, & ornamento del Mondo.

**Laus Deo, & Beatæ Virgini Mariæ.**